

6-13-05

1625

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Applicants: Ulrich Jordis et al.

Attorney Docket: SAN1003US

Serial No.: 09/980,025

Group Art Unit: 1625

Filed: March 18, 2002

Examiner: Amelia A. Owens

For: DERIVATIVES AND ANALOGS OF GALANTHAMINE

**TRANSMITTAL OF CERTIFIED COPIES OF PRIORITY DOCUMENTS**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

On page eight of the June 3, 2005 Amendment and Response in this application, Applicants indicated that they would obtain and submit certified copies of the priority documents. Enclosed are certified copies of the two priority documents, Austrian Application No. A 546/2000, filed March 31, 2000, and Austrian Application No. A 238/2001, filed February 15, 2001.

Respectfully submitted,

Date:

June 10, 2005

By

Patrick J. O'Connell

Customer No. 009561

Patrick J. O'Connell (33,984)

POPOVICH, WILES & O'CONNELL, P.A.

650 Third Avenue South, Suite 600

Minneapolis, MN 55402

Telephone: (612) 334-8989

Attorney for Applicants

**Certificate of Express Mailing (37 C.F.R. § 1.10)**

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service as "Express Mail Post Office to Addressee" Mailing Label No. EV 730709835 US in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date indicated below.

Date:

June 10, 2005

Signature:

Jodi Jung

Name: Jodi Jung

BEST AVAILABLE COPY

This page blank (uspro)

Zentrale Dienste  
Verwaltungsstellendirektion



österreichisches  
patentamt

Dresdner Straße 87  
1200 Wien  
Austria

[www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)

Kanzleigebühr € 269,00  
Schriftengebühr € 884,00

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

Aktenzeichen A 238/2001

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

die Firma Sanochemia Pharmazeutika Aktiengesellschaft  
in A-1090 Wien, Boltzmannngasse 11,

am 15. Feber 2001 eine Patentanmeldung betreffend

"Neue Derivate und Analoga von Galanthamin",

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung mit der ursprünglichen, zugleich mit  
dieser Patentanmeldung überreichten Beschreibung übereinstimmt.

Für diese Anmeldung wurde die innere Priorität der Anmeldung in Österreich vom 31. März  
2000, A 546/2000, in Anspruch genommen.

Es wurde beantragt, Ulrich Jordis in Wien, Johannes Fröhlich in Dornbach im Wienerwald  
(Niederösterreich), Matthias Treu in Wien, Manfred Hirnschall in Wien, Laszlo Czollner in  
Ebenfurth (Niederösterreich), Beate Kälz in Steinbrunn (Burgenland) und Stefan Welzig in  
Wien, als Erfinder zu nennen.


Österreichisches Patentamt

Wien, am 30. Mai 2005

Der Präsident:



HRNCIR



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



A 238 / 2001

/ BEER & PARTNER  
PATENTANWÄLTE NEG  
1070 Wien, Lindengasse 8

[51] Int. Cl.:

W5-127000A P-Af  
S/A

Urtext

AT PATENTSCHRIFT

[11] Nr.

[73] Patentinhaber: Sanochemia Pharmazeutika Aktiengesellschaft  
Wien (AT)

[54] Gegenstand: Neue Derivate und Analoga von Galanthamin

[61] Zusatz zu Patent Nr.:

[62] Ausscheidung aus:

[22] [21] Angemeldet am: 2001 02 15 ,

[33] [32] [31] Unionspriorität:  
Innere Priorität: 2000 03 31, A 546/2000

[42] Beginn der Patentdauer:

Längste mögliche Dauer:

[45] Ausgegeben am:

[72] Erfinder:  
Jordis Ulrich  
Wien (AT)  
Fröhlich Johannes  
Dornbach im Wienerwald (AT)  
Treu Matthias  
Wien (AT)  
Hirnschall Manfred  
Wien (AT)  
Czollner Laszlo  
Ebenfurth (AT)  
Kälz Beate  
Steinbrunn (AT)  
Welzig Stefan  
Wien (AT)

[60] Abhängigkeit:


[56] Entgegenhaltungen, die für die Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen wurden:

11

a) Behandlung der Alzheimer'schen Krankheit,

- m) Behandlung des Diabetes mellitus, insbesondere, wenn die Krankheit mit Amyloiddegeneration der Inselzellen einhergeht.


Die erfindungsgemäßen, neuen Verbindungen sind solche der allgemeinen Formel I



worin die Substituenten die nachstehend erläuterten Bedeutungen haben:

$R_1$  und  $R_2$  sind gleich oder verschieden und bedeuten:

- a) Wasserstoff, F, Cl, Br, J, CN, NC, OH, SH, NO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub>H, PO<sub>3</sub>H, NH<sub>2</sub>, CF<sub>3</sub>, OSO<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CF<sub>3</sub>,  
worin n gleich 0, 1 oder 2 ist), OSO<sub>2</sub>-Aryl-, -Vinyl- oder -Ethynyl;  
b) eine niedrige (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>), gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls substituierte  
(Ar)Alkyl-, (Ar)Alkoxygruppe, Cycloalkyl- oder Cycloalkoxygruppe;  
c) eine Aminogruppe, die gegebenenfalls durch eine oder zwei gleiche oder  
unterschiedliche niedrige (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>), gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls substituierte  
(Ar)Alkyl- oder (Ar)Alkylcarbonyl- oder (Ar)Alkoxy-carbonylgruppen substituiert ist oder eine



Aminogruppe in welcher eine cyclische Substitution in Form eines allenfalls substituierten Pyrrolidin-, Piperidin-, Morpholin-, Thiomorpholin-, Piperazin-, Homopiperazinrestes aufweist

d) eine COOH, COO(Ar)Alkyl, CO-amino, mit der Definition der Aminogruppe wie im letzten Absatz unter c), oder eine CHOH(Ar)Alkylgruppe;

e) eine  $-(CH_2)_nX$  (worin  $X = Br, Cl, F$  oder  $J$ ),  $-(CH_2)_nOH$ ,  $-(CH_2)_nCHO$ ,  $-(CH_2)_nCOOH$ ,  $-(CH_2)_nCN$ ,  $-(CH_2)_nNC$ ,  $-(CH_2)_nCOAlkyl$ ,  $-(CH_2)_nCOAr$ -Gruppe, worin  $n$  1-4 bedeutet;

f) eine  $-(CH_2)_nVinyl$ ,  $(CH_2)_nEthinyl$ gruppe, oder  $(CH_2)_nCycloalkyl$ gruppe worin  $n$  0, 1 oder 2 und cycloalkyl einen aliphatischen Ring der Ringgröße von 3-7 beschreibt

g) eine  $C_3-C_6$  substituierte Alkenylgruppe (gegebenenfalls substituiert mit  $H, F, Br, Cl, CN, CO_2Alkyl, COAlkyl, COAr$ );

h) eine  $C_3-C_6$  substituierte Alkylgruppe (gegebenenfalls substituiert mit  $H, F, Br, Cl, CN, CO_2Alkyl, COAlkyl, COAr$ ); oder

i)  $R_1$  und  $R_2$  bedeuten gemeinsam  $-CH=CH-CH=CH-$ ,  $-O(CH_2)_nO-$  ( $n = 1$  bis 3),  $-CH=CH-A1$  oder  $-CH_2-CH_2-A1-$  wobei für  $A1$   $NH, O$  oder  $S$  stehen kann;

$R_3$  dieselbe Bedeutung hat wie  $R_1$ , insbesondere  $OH$  und  $OCH_3$  und weiters

$R_2$  und  $R_3$  gemeinsam  $-A_2(CH_2)_nA_2-$  bedeuten, worin  $n$  1 bis 3 ist und  $A_2$  zwei gleiche oder verschiedene Reste ausgewählt von  $NH, O$  oder  $S$  bedeutet;

$R_4$  und  $R_5$  sind entweder


a) beide Wasserstoff, oder

b) eine Kombination von Wasserstoff oder einer (Ar)Alkyl-, (Ar)Alkenyl-, oder (Ar)Alkylgruppe mit


i)  $OR_6$ , worin  $R_6$  Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1-C_{10}$ , gegebenenfalls verzweigte oder substituierte) Alkylgruppe oder Cycloalkylgruppe, eine  $C_3-C_{10}$  substituierte Silylgruppe (beispielsweise Triethylsilyl, Trimethylsilyl, t-Butyldimethylsilyl oder Dimethylphenylsilyl), eine  $C_2-C_{10}$   $\alpha$ -Alkoxyalkyl-Gruppe, beispielsweise Tetrahydropyranyl, Tetrahydrofuranyl, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, (2-Methoxypropyl), Ethoxyethyl, Phenoxyethyl oder (1-Phenoxyethyl);

ii)  $O-CS-NHR_6$  (Thiourethane), worin  $R_6$  die oben genannte Bedeutung hat

iii)  $O-CO-NHR_7$  mit der nachstehenden Bedeutung:



iv)  $O-CO-HR_6$ , worin  $R_6$  die oben genannte Bedeutung hat, insbesondere Ester mit dem Substitutionsmuster von Aminosäuren (beide Enantiomeren), wie



115

v)  $\text{NR}_7\text{R}_7$ , worin die beiden Substituenten  $\text{R}_7$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_4$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische Alkylgruppe bedeuten oder die beiden Substituenten  $\text{R}_7$  sind gemeinsam  $-(\text{CH}_2)_n-$ , worin  $n$  3 bis 5 ist;

vi)  $\text{NH-COR}_6$  (Amid), worin  $\text{R}_6$  die oben genannte Bedeutung hat;

120

vii)  $\text{S-R}_6$ , worin  $\text{R}_6$  Wasserstoff oder eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ ), gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkylgruppe ist, und worin  $\text{R}_6$  die oben genannte Bedeutung hat;

viii)  $\text{SO}_n\text{R}_8$ , worin  $n$  0, 1 oder 2 ist, worin  $\text{R}_8$  eine ( $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkylgruppe ist.

125

Wenn  $\text{R}_4$  Wasserstoff ist, kann  $\text{R}_5$  OH, CN,  $\text{CO}_2\text{-Alkyl}$ ,  $\text{CONR}_a\text{R}_b$ , worin  $\text{R}_a$  Wasserstoff, eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ ), gegebenenfalls verzweigte, cyclische, allenfalls substituierte Alkylgruppe und  $\text{R}_b$  Wasserstoff, eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ ), gegebenenfalls verzweigte, oder substituierte Alkylgruppe ist, oder  $\text{R}_a+\text{R}_b$  sind gemeinsam  $-(\text{CH}_2)_n-$ , worin  $n$  2 bis 6 bedeutet, oder  $-(\text{CH}_2)_n\text{E}(\text{CH}_2)_n-$ , worin E gleich NH, N-Alkyl, O, oder S und  $n$  0 bis 5 ist, Aryl (Phenyl oder Naphthyl), 6- $\pi$  Heterozyklus, (wie beispielsweise Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Triazolyl, Tetrazolyl, Oxadiazolyl, Thiadiazolyl, Pyridazinyl, Pyrimidinyl, Pyrazinyl und substituierte Varianten derselben), oder Imidazolinyll, Thiazolinyll oder Oxazolinyll sein.

130



Für den Fall, daß  $\text{R}_5$  nicht Wasserstoff ist, kann  $\text{R}_4$  auch OH sein.

135

$\text{R}_4$  und  $\text{R}_5$  können gemeinsam Carbonyl ( $=\text{O}$ ), Hydrazone ( $=\text{N-NH-R}_9$ ,  $=\text{N-NR}_9\text{R}_{10}$  oder Oxim ( $=\text{N-OR}_{10}$ ) sein, worin  $\text{R}_9$  Wasserstoff, eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl- oder (Ar)Alkylcarbonyl- (Ar)Alkylcarbonyloxygruppe oder eine Sulfonsäuregruppe, wie Tosyl oder Mesyl ist, und  $\text{R}_{10}$  Wasserstoff, eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl- oder (Ar)Alkylcarbonylgruppe, eine Sulfonsäuregruppe, wie eine Tosyl- oder Mesylgruppe ist.

140

$\text{R}_4$  und  $\text{R}_5$  können gemeinsam Substituenten der Art



145

sein, worin  $\text{Y}_1$ ,  $\text{Y}_2$  gleich oder verschieden sind und O, S, NH oder  $\text{N-R}_9$  (freie Valenzen sind in jedem Fall Wasserstoff) bedeuten, oder für den Fall, daß  $\text{Y}_1$  NH und  $\text{Y}_2$   $\text{N-R}_9$  ist, können  $\text{R}_4$  und  $\text{R}_5$  durch  $-(\text{CH}_2)_n-$  ( $n = 2, 3$  oder  $4$ ) verbunden sein.


$\text{G}_1$ :  $-(\text{CH}_2)_x-$ , worin  $x$  1 oder 2 ist;

$\text{G}_2$ :  $-(\text{CH}_2)_y-$ , worin  $y$  0 bis 2 ist;

$\text{G}_3$ :  $-(\text{CH}_2)_z-$ , worin  $z$  0 bis 3 ist, Carbonyl oder Thiocarbonyl ist, mit der Maßgabe, daß


150

$x+y+z$  gemeinsam wenigstens 2 und höchstens 4 sind oder worin  $\text{G}_3$   $-\text{CH}(\text{OH})-$  oder  $-\text{C}(\text{OH})-$  bedeutet



G<sub>1</sub> und G<sub>2</sub> können gemeinsam oder getrennt auch bedeuten:

-C(R<sub>11</sub> R<sub>12</sub>)-, worin R<sub>11</sub> und R<sub>12</sub> Wasserstoff, OH, eine niedrige, gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar) Alkyl-, Aryl-, (Ar) Alkyloxy- oder Aryloxygruppe oder gemeinsam eine Alkylspirogruppe (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Spiroring) oder G<sub>1</sub> und G<sub>2</sub> bedeuten gemeinsam




160 worin m 1 bis 7 ist.

W kann die folgenden Bedeutungen haben:

a) CR<sub>13</sub>R<sub>14</sub>, worin R<sub>13</sub> Wasserstoff und R<sub>14</sub> die Reste -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>NR<sub>7</sub>R<sub>7</sub> oder -CO-NR<sub>7</sub>R<sub>7</sub> oder -COOR<sub>7</sub> bedeuten, wobei n die Werte 0 bis 2 annehmen kann und R<sub>7</sub> wie oben definiert ist, oder R<sub>7</sub>R<sub>7</sub> durch -(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>- (worin n 3 bis 5 ist) einen Ring bilden, wobei die Substituenten R<sub>13</sub> und R<sub>14</sub> vertauscht sein können.




b) N-Phenyl (wobei der Phenylrest gegebenenfalls mit Fluor, Brom, Chlor, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>) Alkyl, CO<sub>2</sub>Alkyl, CN, CONH<sub>2</sub>, oder Alkoxy substituiert ist), oder N-Thien-2 oder 3-yl, oder N-Fur-2 oder 3-yl oder einen N-1,3,5-Triazinyl bedeutet, wobei der Triazinrest weiter mit Cl, OR<sub>6</sub> oder NR<sub>7</sub>R<sub>7</sub> substituiert sein kann, und R<sub>6</sub> bzw. R<sub>7</sub> die oben angeführte Bedeutung haben;

c) einen der nachstehend wiedergegebenen Substituenten



175 worin J keine Bindung oder  $-(CH_2)_n-$ , mit  $n = 0$  bis 3, Carbonyl, Thiocarbonyl, O, S,  $-SO-$  oder  $SO_2$  bedeutet,  $R_6$  die oben abgegebene Bedeutung hat, und weiters Q als  $-(CH_2)_n-M^*-(CH_2)_m-$  definiert ist, wobei  $n = 0$  bis 4 und  $m = 0$  bis 4 und  $M^*$  Alkynyl, Alkenyl, disubstituiertes Phenyl, disubstituiertes Thiophen, disubstituiertes Furan, disubstituiertes Pyrazin, disubstituiertes Pyridazin, einen Peptidspacer L oder einen heterocyclischen Spacer HS darstellt, wobei diese Definition des Spacers weiters durch folgende Formelbilder

180



P = CH oder N  
T = CH oder N  
X =  $\text{NR}_6$ , O oder S  
Z = CH oder N

185 definiert ist, in denen  $R_{15}$  die Seitenkette von D-, L-, D,L-Aminosäuren oder unnatürlichen Aminosäuren bedeutet, und für den Fall von  $n > 1$   $R_{15}$  in den einzelnen Resten jeweils eine gleiche oder verschiedene Seitenkette von D-, L-, D,L-Aminosäuren oder unnatürlichen Aminosäuren bedeutet, wobei diese Formeln so zu verstehen sind, daß das Atom N neben Q jeweils mit G2 und G3 der Formel I verbunden ist;

190 d) W kann über den Spacer Q auch mit einem tricyclischen Substituenten (Tr) verbunden sein, wobei die tricyclischen Substituenten durch folgende Formelbilder definiert werden,



Pyrolidin, Piperidin, Hexamethylenimin, Tetrahydrofuran, Piperazin, Morpholin und Thiomorpholin,


Heterodotomie haben können, bevorzugt sind.

Ringe mit einem Stickstoffatom und einem weiteren Heteroatom, das Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel ist, sein.

220 "5 bis 8-gliedrige Ringe B oder C" sind 5 bis 8-gliedrige heterocyclische oder alicyclische Ringe, oder Kohlenstoffringe, die wenigstens einfach substituiert sind. Diese 5 bis 8-gliedrigen Kohlenstoff-Ringe können sein ein Benzolring oder ein gesättigter oder ungesättigter Ring, beispielsweise Benzol, Cyclopentan, Cyclopenten, Cyclohexan, Cyclohexen, Cyclohexadien, Cycloheptan, Cyclohepten und Cycloheptadien.

225 Wenn die Ringe B oder C wenigstens ein Heteroatom enthalten, (z.B. 1-3 Heteroatome, wie Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel usw.), d.h., wenn der Ring B oder C ein heterocyclischer Ring ist, kann er aromatisch sein oder nicht. Solche aromatischen, heterocyclischen Ringe sind beispielsweise Pyridin, Furan, Thiophen. Bevorzugte nichtaromatische, heterocyclische Ringe sind die oben angegebenen Beispiele für die Ringe B oder C.

Demnach kann der tricyclische Substituent Tr ein kondensierter Benzolring der allgemeinen Formel



230


sein. Beispiele hierfür sind

- 235 Carbazol,  
1,2,3,4-4a,9a-Hexahydrocarbazol,  
9,10-Dihydroacridin,  
1,2,3,4-Tetrahydroacridin,  
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin,  
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,g]azocin,  
240 6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azepin,  
6,7-Dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin,  
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin,  
Dibenzofuran,  
9H-Xanthen,  
245 1-O-11-Dihydrobenz[b,f]oxepin,  
6,11-Dihydrobenz[b,e]oxepin,  
6,7-Dihydro-5H-dibenz[b,g]oxacin,  
Dibenzothiophen,  
9H-Thioxanthen,  
250 10,11-Dihydrodibenzo[b,f]thiepin,  
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin,  
6,7-Dihydro-5H-dibenzo[b,g]thiocin,  
10H-Phenothiazin,  
10H-Phenoxazin,



- 255 5,10-Dihydrophenazin,  
10,11-Dibenzo[b,f]-[1,4]thiazepin,  
2,3,5,6,11,11a-Hexahydro-1H-pyrrolo[2,1-b][3]benzazepin,  
1-O,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin,  
5,11-Dihydrodibenz[b,e][1,4]oxazepin,  
260 5,11-Dihydrodibenzo[b,f][1,4]thiazepin,  
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin,  
1,2,3,3a,8,8a-Hexahydropyrrolo[2,3b]indol.


Der tricyclische Substituent Tr kann ein kondensierter Benzolring der allgemeinen Formel



sein und beispielsweise bedeuten:

- 1H,3H-Naphth[1,8-cd][1,2]oxazin,  
Naphth[1,8-de]-1,3-oxazin,  
270 Naphth[1,8-de]-1,2,-oxazin,  
1,2,2a,3,4,5-Hexahydrobenz[cd]indol,  
2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-1H-benzo[de]chinolin,  
4H-Pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin,  
1,2,5,6-Tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin,  
275 5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin,  
1H,5H-Benzo[ij]chinolizin,  
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]chinolizin,  
Azepino[3,2,1-hi]indol,  
1,2,4,5,6,7-Hexahydroazepino[3,2,1-hi]indol,  
280 1H-Pyrido[3,2,1-jk][1]benzazepin,  
5,6,7,8-Tetrahydro-1H-pyrido[3,2,1-jk][1]benzazepin,  
1,2,5,6,7,8-Hexahydro-5H-pyrido[3,2,1-jk][1]benzazepin,  
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isochinolin,  
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydronaphth[1,8-bc]azepin,  
285 2,3,5,6,7,8-hexahydro-1H-pyrido[3,2,1-jk][1]benzazepin.

Der tricyclische Substituent Tr kann ein kondensierter Benzolring der allgemeinen Formel




290 sein. Beispiele für diese Verbindungen sind :

- 1,2,3,5,6,7-Hexahydrobenzo[1,2-b:4,5b']dipyrrol,
- 1,2,3,5,6,7-Hexahydrocyclopent[f]indol,
- 1,2,3,6,7,8-Hexahydrocyclopentan[e]indol oder

295 2,3,4,7,8-Hexahydro-1H-cyclopenta[f]chinolin.

Der tricyclische Substituent Tr kann ein kondensierter Benzolring der allgemeinen Formel





300 sein. Beispiele hierfür sind:

- 1,2,3,6,7,8-Hexahydrocyclopent[e]indol oder
- 2,3,4,7,8,9-Hexahydro-1H-cyclopenta[f]chinolin.


Weitere Beispiele für den tricyclischen Substituenten Tr sind kondensierte Benzolringe der folgenden Formeln wobei die Bindungsstelle zu Q den Platz eines beliebigen Wasserstoffatoms einnehmen kann:

305






- 310 Weiters kann Tr ein cyclischer oder bicyclischer Kohlenwasserstoff sein der durch folgende Formel bezeichnet wird:



- 315 Jeder Substituent Tr kann weiters durch einen oder mehrere Substituenten  $R_1$  substituiert sein, wobei die Definition des Substituenten  $R_1$  dieselbe wie bei Formel I ist.


e) W kann weiters  $-NH-$ ,  $-S-$ ,  $-SO-$  oder  $-SO_2-$  bedeuten.

- 320 Die Erfindung betrifft weiters Verbindungen der allgemeinen Formel II




- 325 worin D für NH, N-Alkyl, N-Acyl, Sauerstoff oder Schwefel steht und worin die Substituenten  $R_1$  bis  $R_5$ ,  $G_1$  bis  $G_3$  sowie W die oben bei der allgemeinen Formel I angegebenen Bedeutungen haben können.

Weiters betrifft die Erfindung Verbindungen der allgemeinen Formel III



335 worin  $X-R_{16}$  ein Substituent ist, in dem X Sauerstoff oder Schwefel und  $R_{16}$  Wasserstoff oder eine niedrige ( $C_1-C_{10}$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar) Alkyl-Gruppe ist, und worin die Substituenten  $R_1$  bis  $R_5$ ,  $G_1$  bis  $G_3$  sowie W die oben bei der allgemeinen Formel I angegebenen Bedeutungen haben können.

Die Erfindung erstreckt sich auf Verbindungen der allgemeinen Formel IV



345 worin W CH oder N darstellt und  $R_{18}$  und  $R_{19}$  Wasserstoff, Alkyl-, Aryl- oder Aralkyl bedeutet und in der die die Substituenten  $R_{18}$  und  $R_{19}$  tragenden C-Atome miteinander über eine Einfach- oder eine Doppelbindung verknüpft sind und in der die Substituenten  $R_1$  bis  $R_5$  sowie  $G_1$  und  $G_3$  die bei der allgemeinen Formel I oben angegebenen Bedeutungen haben.

350 Bevorzugt ist es, wenn in der Verbindung der allgemeinen Formel IV der Substituent W Stickstoff ist und/oder der Substituent  $G_1-(CH_2)_x$ , worin x gleich 1 oder 2 ist und  $G_2-(CH_2)_y$ , worin y gleich 0 bis 2 ist, mit der Maßgabe, daß  $x+y$  gemeinsam wenigstens 2 und höchstens 4 bedeuten.

### Trennung der optischen Isomeren von rac. Norgalanthamin:

Die Erfindung beinhaltet außerdem ein Verfahren zur chiralen Trennung von (6R)-3-Methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2benzazepin-6-ol (Norgalanthamin) (4)

Die Trennung der (+) und (-) Isomeren erfolgt durch fraktionierte Kristallisation in der Weise, daß

- eine Lösung oder Suspension des optischen Isomerengemisches in der 3 bis 50 fachen Menge
- eines Lösungsmittels, wie Wasser, Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Aceton oder Mischungen dieser Lösungsmittel, vorwiegend Methanol
- mit der äquimolaren Menge oder einem Überschuß einer chiralen Säure (unsubstituierte, einfach oder mehrfach substituierte (+) oder (-) Weinsäure, Zitronensäure, Milchsäure, vorzugsweise (+)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure, die in einem der oben genannten Lösungsmittel gelöst ist, zugegeben oder vorgelegt - und die Lösung oder Suspension des optischen Isomerengemisches zugegeben wird,






- daß die Lösung mit aus dem natürlichen (-) Galanthaminderivaten und chiralen org. Säuren, wie (+)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure, hergestellten Kristallen eingimpft wird
- und bei - 40 bis +20 Grad, vorzugsweise 0 Grad 2-24 Stunden oder länger stehen gelassen wird.
- daß die gebildeten Kristalle filtriert und getrocknet werden,
- anschließend mit Überschuss  $\text{NH}_4\text{OH}$  versetzt und mit organischem Lösungsmittel, wie Chloroform, Methylenchlorid, Ethylacetat, Butylacetat, Diethylether, t-Butylmethylether, Dibutylether, Petrolether, Xylol, Benzol, Toluol oder ähnlichen Lösungsmitteln extrahiert und durch Destillation des Lösungsmittels das entsprechenden (-) Norgalanthamin isoliert wird.







In diesem Verfahren ergibt Einengen der Mutterlauge, Aufnehmen im Überschuss  $\text{NH}_4\text{OH}$ , Extraktion mit einem organischen Lösungsmittel (wie oben angegeben) und Eindampfen weitere Fraktionen von Norgalanthamin, aus dem in gleicher Weise wie oben kann mit chiralen organischen Säuren, wie (-)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure das (+) Norgalanthamin hergestellt werden.






Die, nach der Erfindung erhaltenen Produkte können durch ein geeignetes Verfahren gereinigt werden, beispielsweise Sublimation, fraktionierte Kristallisation oder Chromatographie.

Unter den erfindungsgemäßen Verbindungen sind insbesondere die nachstehend genannten Verbindungen in Betracht gezogen:

In der nachstehenden Übersicht bedeutet "AChE": Acetylcholinesterase, "BChE": Butyrylcholinesterase, „hr“: human rekombinant, "mE": Vorinkubation des Enzyms mit Hemmstoff und "IC<sub>50</sub>": Konzentration, bei der eine 50%ige Hemmung eintritt.







Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1118		100	200	Ro 22	77
SPH-1146		1,2	3,6	TK 66/1	136
SPH-1149		0,2	0,21	HM 104	137
SPH-1162		200		CI 2-1, CB 19	138
SPH-1184		0,2	0,6	LCz 225/1	139







Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1191		0,35	4,4	LCz 205	140
SPH-1196		5,2	5	TK 36-2	30
SPH-1163		200	0,47	MH 7-1-1	35
SPH-1199		200	2,3	MH 25-1	102
SPH-1200		200	17	MH 30-1	88
SPH-1201		46	0,6	MH-29-1	105







Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1202		200	5,2	MH-28-1	104
SPH-1203				MH-26-1	103
SPH-1204		200	200	MH 31-2	89
SPH-1205		70	2,4	MH 33	90
SPH-1206		78	2,5	MH 38-1	91
















Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1214		4,2	200	CB 34, CB 34-2	19
SPH-1215		70	200	CB 33	23
SPH-1216		90	200	CB 35	44
SPH-1217		9,5	17	CB 28	40
SPH-1218		25	0,54	CB 30	8
SPH-1219		28,5	200	CB 36	31






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1220		7,2	21	CB 41	45
SPH-1221		4,8	200	CB 45	20
SPH-1222		6,7	200	CB 46	22
SPH-1227		40	6	HM 38	144
SPH-1228		200	200	CB 43	15
SPH-1229		38	30	CB 52	9

Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1230				CB 53	13
SPH-1231		33	200	CB 49	21
SPH-1232		36	200	CB 50	26
SPH-1233		200	200	CB 51	16
SPH-1234		66	200	CB 56	10
SPH-1235		3,4	11	CB 42	46













Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1246		17,5	20	MR 16	18
SPH-1247		2,4	4	MR 17	48-Stufe 1
SPH-1248		40	90	MR 7	34
SPH-1249		45	26	MR 13	43
SPH-1250		200	95	MH-66	94
SPH-1251		59	45	MH-71	95






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1252		200	52	MH-72	96
SPH-1253		60	5,4	MH-75	97
SPH-1254		200	3	MH-76	98
SPH-1255		200	200	MH-81	99
SPH-1256		200	14	MH-83	93







Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1259		140	80	HM 60	29
SPH-1262		54,5	36	MR 14	42
SPH-1263		200	200	Ap 74	1
SPH-1264		50	200	HM 58	33
SPH-1266		30	200	CB 75	59














Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1267		30	200	CB 73	25
SPH-1268		44	200	CB 78	55
SPH-1269		2,6	10	CB 85	57
SPH-1270		2,5	7	CB 86	58
SPH-1271		15	4	CB 87	69

Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1272		6,7	30	CB 81	60
SPH-1273		21	3,4	CB 99, BK 10	145
SPH-1276		42	40	CB 89	68
SPH-1277		33	7,3	HM 57	41
SPH-1278		100	32	HM 60	32






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1280		0,5	0,24	CB 98	48
SPH-1282		4	0,54	CB 100, BK 11	49
SPH-1283		93	100	DD 9	76
SPH-1284		8	90	DD 10	75
SPH-1286	 * 1,5 C4H8O8 * 0,5 H2O	0,3	1,5	BK-32-1-3, AH 8	72

Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1287		18,5	63	HM 109	56
SPH-1288		6,3	60	HM 112, DD 13	146
SPH-1289		0,7	1,2	HM 117	61
SPH-1290		1,2	100	MH 123-3, AH 11	110
SPH-1291		0,8	200	MH 123-3, TT 33	110b
SPH-1292		40	100	CB 112	53







Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1293		4.2	25	MH 122-3, Pi-4	114
SPH-1295		15	32	BM 1	63
SPH-1296		46	200	CB 147, DD 16	51
SPH-1298		200	70	MH-117	106
SPH-1302		23	200	HM 203	147






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1309		200	200	MT 176	128d
SPH-1310		5,3	200	MT 141	83
SPH-1311		1,3	2,1	BM 4	65
SPH-1312		3	2,4	DD 24	73
SPH-1314		8,4	2,4	DD 18	64
SPH-1315		2,8	5		70







Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1317		80	200	PI 12	111
SPH-1318		200	200	PI 14	112
SPH-1319		200	200	PI 19	113
SPH-1320		83	30	PI 21	116
SPH-1326		8,4	2,6	CB 171	54






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1327		24	3	WO 2	50
SPH-1328		7,2	200	CB 161	52
SPH-1329		2,9	0,85	DD 26	67
SPH-1330		64	67	RMA 15	78
SPH-1331		50	200	MH 142	119















Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1332		200	200	MH 145	120
SPH-1333		9	23	RMA 14, DD 7	79
SPH-1335		0,02	0,8	CB 177, BK 6	6-Stufe 3
SPH-1339		0,3	1,5	HM 264-1	149
SPH-1340		32	30	HM 265-1	150
SPH-1345		200	200	MH 143	119






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1346		200	200	MH 146	121
SPH-1357		0,022	0,8	MF 8	151
SPH-1359		0,0052	0,24	MF 19	7-Stufe3
SPH-1362		3	200	MF-3, CK-21-3	181
SPH-1363		3,6	20	MF-17, CK-24-2	180






Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1369		0,022	1,5	MT 273	3
SPH-1371		0,36		BK-32-2, BK-32-1-3	170
SPH-1372		0,022		UJ-1682-2	4
SPH-1373		0,043		UJ-1685	5
SPH-1374		0,027		UJ-1686	3
SPH-1375		0,023		UJ-1683	7

Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1376		0,02		UJ-1684	6
SPH-1377		0,024		BK-34-2	155
SPH-1490				MB-8	171
SPH-1491				MB-1	172
SPH-1492				MB-7	173



Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent- Beispiel- Nummer
SPH-1493				MB-10	174
SPH-1494				MB-15	175
SPH-1515				ML-7	157
SPH-1521					176
SPH-1522				CK-52-6	158
SPH-1523				CK-58-2	159

Substanz- Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor- Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1524				CK-65-1	160
SPH-1525				CK-63	161
SPH-1526				CK-63	162
SPH-1528				CK-49-1- IPP-3-1	163
SPH-1529				CK-59- AcPP-3-1	164
SPH-1530				CK-59-ISS- 4-1	165

Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1531				CK-59-IPP-2-1	166
SPH-1532				CK-59-MSS-5-1	167
SPH-1534				CK-9-2	182
SPH-1535				CK-10	183
SPH-1536				CK-32	184

Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1537				CK-17	185
SPH-1538				CK-17-1	186
SPH-1539				CK-36	187
SPH-1540				CK-41	188
SPH-1541				CK-48	189




Substanz-Code	Struktur	IC50 (AChE, mE, hr)	IC50 (BChE, mE, hr)	Labor-Code	Patent Beispiel- Nummer
SPH-1542				CK-43-5	190
SPH-1193		1,5	0,8		

Im Rahmen der Erfindung ist unter anderem besonders in Betracht gezogen die Verbindung (6R)-3-Methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (Norgalanthamin), und zwar racemisches Norgalanthamin, (-)Norgalanthamin und (+)Norgalanthamin. Sowohl racemisches Norgalanthamin als auch seine (+)- und (-)-Isomeren können in Arzneimitteln zur Behandlung der eingangs unter a) bis m) genannten Krankheiten als Wirkstoff für sich oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen verwendet werden.

CONFIDENTIAL

**FORTSETZUNG AUF SEITE 51**



360  
360

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können unter sinngemäßer Anwendung der in der WO 96/12692 und in der WO 97/40049 beschriebenen Verfahren und Arbeitsweisen zum Herstellen von Galanthamin und Galanthamin-Derivaten synthetisiert werden.

365        Zusätzlich zu den vorgenannten Synthesewegen können einige der erfindungsgemäßen Verbindungen unter Anwendung der kombinatorischen (oder Parallel-)Synthesetechnologie hergestellt werden. Bei dieser Synthesemethode wird das interessierende Grundgerüst (oder Kernmolekül) auf einer festen Phase (z.B. Glaskügelchen, Polymerkügelchen oder einem anderen inerten Träger) immobilisiert, der das Abtrennen von überschüssigen Reaktionspartnern vom modifizierten Grundgerüst erleichtert. Die jeweils eingesetzte Festphase hängt von der Beladungskapazität, den eingesetzten Reaktanten und den Reaktionslösungsmitteln ab. Insbesondere in Betracht gezogen sind Polymerkügelchen, wie beispielsweise Merrielfield-Harz, Wang-Harz oder TentaGel (Rapp)-Harz.

375        Das Immobilisieren des Grundgerüsts erfolgt durch eine funktionelle Gruppe, die unter geeigneten Reaktionsbedingungen in den letzten Schritten der Synthese wiedergewonnen werden kann. Der letzte Schritt besteht in der Spaltung des gewünschten Produktes von der Festphase. Die Wahl der Linkereinheit, welche das Grundmolekül an der Festphase kuppelt, hängt von der Kombination und/oder der Folge von Reaktanten und den Reaktionsbedingungen ab, die erforderlich sind, um maximale Ausbeuten und/oder Reinheit zu erzielen. Überdies können mit unterschiedlichen Linkern die Produkte von der gleichen Festphase unter unterschiedlichen Bedingungen abgespalten werden. Diese Technologie erlaubt eine rasche Synthese einschließlich automatisierter Synthesen von Verbindungen gemäß der Erfindung.

385        Bezüglich der kombinatorischen und/oder Parallelsynthese wird auf die nachstehenden Literaturstellen verwiesen, in denen allgemeine Verfahrensbeschreibungen enthalten sind:


- 390        1) Abelson, J.N., Combinatorial Chemistry. Academic Press, San Diego (1996).  
2) Epton, R., Innovation and Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, Mayflower Scientific Limited, Birmingham (1996).  
3) Wilson, S.R. and Czarnik, A.W., Combinatorial Chemistry. Synthesis and Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York (1997).  
4) Gordon, E.M. and Kerwin, J.F.J., Combinatorial Chemistry and Molecular Diversity in Drug Discovery. John Wiley and Sons, Inc., New York (1998).  
5) Thompson, L.A., Ellman, J.A. Chem. Rev. 96, 555 (1996).  
6) Special issue on combinatorial chemistry, cf., Acc. Chem. Res., 29, 111 (1996).  
395        7) Fruchtel, J.S.; Jung, G. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 35, 17 (1996).  
8) Cheng, S.; Comer, D.D.; Williams, J.P.; Myers, P.L.; Boger, D.L. J. Am. Chem. Soc., 118, 2567 (1996).

9) Für weitere Information zu diesem sich rasch entwickelnden Gebiet siehe: A dynamic database of references in molecular diversity at <http://www.5z.com>.


- 400 10) Bayer E.; Angew Chem. Int. Ed., 30, 113-129 (1991).  
11) Mayer, J.P.; Zhang, J.; Bjergarde, K.; Lentz, D.M.; Gaudino, J.J.; Tetrahedron Letters,  
37, 8081 (1996).  
12) Bayer, E.; Angew.Chem.Int.Ed., 30, 113-129 (1991).  
13) DE 19745628 A1.



## N-Linker Transformationen eines Molekülgerüsts des Norgalanthamin-Typs



### C-Linker Transformationen eines Gerüstes des Norgalanthamin-Typs



### C-Linker Transformationen des „Homogalanthamingerüst“

Die Verbindungen gemäß der Erfindung, sowie von pharmazeutisch annehmbaren Säureadditionssalzen derselben können als Wirkstoffe in Arzneimitteln beispielsweise zum

- Primär degenerative Demenzen (vor allem die Alzheimer'sche Krankheit),
- Zerebrale und spinale Lähmungen (amyotrophe laterale Sklerose, multiple Sklerose),
- Zentral bedingte Bewegungsstörungen (Parkinson'sche und Huntington'sche Krankheit) und
- Erkrankungen des epileptischen Formenkreises.

- Ischämischer Schlaganfall (Verschluß einer das Gehirn versorgenden Arterie),
- Haemorrhagischer Schlaganfall (innere Hirnblutung),
- Schädel-Hirn-Trauma und
- Hirnschäden nach Herzversagen bzw. Atemstillstand (Hypoxie/Anoxie).


- a) zur Behandlung der Alzheimer'schen Krankheit,
- b) zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit,
- c) — zur Behandlung der Huntington'schen Krankheit (Chorea),
- d) zur Behandlung der Multiplen Sklerose,
- e) zur Behandlung der Amyotrophen Lateralsklerose,
- f) zur Behandlung der Epilepsie,
- g) zur Behandlung der Folgen des Schlaganfalles,
- h) zur Behandlung der Folgen des Schädel-Hirn-Traumas,

- i) zur Behandlung und Prophylaxe der Folgen diffusen Sauerstoff- und Nährstoffmangels im Gehirn, wie sie nach Hypoxie, Anoxie, Asphyxie, Herzstillstand, Vergiftungen, sowie bei Komplikationen bei schweren Geburten am Säugling oder bei Narkosen beobachtet werden,
- j) zur insbesondere auch prophylaktischen Behandlung apoptotischer Degeneration in Neuronen, die durch lokale Radio- oder Chemotherapie von Gehirntumoren geschädigt wurden bzw. werden, und
- k) zur Behandlung der bakteriellen Meningitis und
- l) zur Behandlung von Erkrankungen mit apoptotischer Komponente, besonders im Gefolge von amyloid-assoziiierter Zelldegeneration
- m) zur Behandlung des Diabetes mellitus, insbesondere, wenn er mit Amyloiddegeneration der Inselzellen einhergeht.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen oder deren pharmazeutisch annehmbare Säureadditionssalze, z.B. Hydrobromid, Hydrochlorid, Methylsulfat, Methiodid, Tartrat, Fumarat, Oxalat etc. (siehe nachstehende Tabelle), können Patienten oral, rektal oder durch subkutane, intramuskuläre, intravenöse oder intrathekale Injektion oder Infusion, oder intracerebroventrikulär, z.B. mittels eines implantierten Behälters verabreicht werden.

englisch	Säure	Salz
Sulfamic	Sulfaminsäure Amidosulfonsäure	Amidosulfonat
1,2-ethanedisulfonic	1,2-Ethandisulfonsäure	1,2-Ethandisulfonat
2-Ethylsuccinic	2-Ethylbernsteinsäure	2-Ethylsuccinat
2-hydroxyethanesulfonic = isethionic	2-Hydroxyethansulfonsäure	2-Hydroxyethansulfonat
3-Hydroxynaphthoic	3-Hydroxynaphthoesäure	3-Hydroxynaphthoat
acetic	Essigsäure	Acetat
benzoic	Benzoessäure	Benzoat
benzenesulfonic	Benzolsulfonsäure	Benzolsulfonat
calcium dihydrogenedetetic	Calciumdihydrogenethylendi amintetraessigsäure	Calciumethylendiamintetra acetat
camphorsulfonic	Camphersulfonsäure	Camphersulfonat
carbonic	Kohlensäure	Carbonat
citric	Zitronensäure	Citrat
Dodecylsulfonic	Dodecylsulfonsäure	Dodecylsulfonat
ethanesulfonic	Ethansulfonsäure	Ethansulfonat
edetetic	Ethylendiamintetraessigsäure	Ethylendiamintetraacetat
fumaric	Fumarsäure	Fumarat
Glubionic	Glubionsäure	Glubionat
glucoheptonic	Glucoheptonsäure	Glucoheptonat
gluconic	Gluconsäure	Gluconat
glutamic	Glutaminsäure	Glutamat
hexylresorcinic	Hexylresorcylsäure	Hexylresorcyilat
HBr	Bromwasserstoffsäure	Hydrobromid
HCl	Salzsäure	Hydrochlorid
bicarbonic	Kohlensäure	Hydrogencarbonat
bitartaric	Weinsäure	Hydrogentartrat
hydriodic	Iodwasserstoffsäure	Hydroiodid





englisch	Säure	Salz
lactic	Milchsäure	Lactat
lactobionic	Lactobionsäure	Lactobionat
Levulinic	Laevulinsäure	Laevulinat
estolic (laurylsulfuric)	Laurylschwefelsäure	Laurylsulfat
LIPIC-(ALPHA) ACID	Liponsäure	Liponat
malic	Äpfelsäure	Malat
maleic	Maleinsäure	Maleinat
Malonic	Malonsäure	Malonat
methanesulfonic	Methansulfonsäure	Methansulfonat
naphthalenesulfonic	Napthalinsulfonsäure	Napthalinsulfonat
nitric	Salpetersäure	Nitrat
pantothenic	Pantothensäure	Pantothenat
phosphoric	Phosphorsäure	Phosphat
polygalacturonic	Polygalacturonsäure Pectinsäure	Polygalacturonat
Propionic	Propionsäure	Propionat
salicylic	Salicylsäure	Salicylat
succinic	Bernsteinsäure	Succinat
sulfuric	Schwefelsäure	Sulfat
tartaric	Weinsäure	Tartrat

Typische Dosierungsraten bei Verabreichung dieser Wirkstoffe hängen von der Natur der verwendeten Verbindung ab und liegen bei intravenöser Applikation im Bereich von 0,01 bis 2,0 mg pro Tag und Kilogramm Körpergewicht in Abhängigkeit vom physischen Zustand und sonstiger Medikation des Patienten.

Die folgenden spezifischen Formulierungen können Anwendung finden:

Tabletten und Kapseln enthaltend 0,5 bis 50 mg

Lösung zur parenteralen Verabreichung enthaltend 0,1 bis 30 mg Wirkstoff/ml

flüssige Formulierungen zur oralen Verabreichung in einer Konzentration von 0,1 bis 15 mg/ml

flüssige Formulierungen zur intracerebroventrikulären Verabreichung, in einer Konzentration von 1 oder 5 mg Wirkstoff/ml.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können auch ein transdermales System sein, in welchem 0,1 bis 10 mg/Tag freigesetzt werden.

Ein transdermales Dosiersystem besteht aus einer Vorratsschicht, welche 0,1 bis 30 mg der Wirksubstanz als freie Base oder Salz allenfalls zusammen mit einem Penetrationsbeschleuniger, z.B. Dimethylsulfoxid oder einer Carbonsäure, z.B. Octansäure, und einem hautnahen-Polyacrylat, z.B. Hexylacrylat/Vinylacetat/Acrylsäure Copolymer samt Weichmacher, z.B. Isopropylmyristat enthält. Als Abdeckung dient eine wirkstoffundurchlässige Außenschicht, z.B. ein metallbeschichtetes, siliconisiertes Polyethylenpflaster mit einer Dicke von beispielsweise 0,35 mm. Zur Erzeugung einer klebenden Schicht dient z.B. ein Dimethylaminomethacrylat/Methacrylat Copolymer in einem organischen Lösungsmittel.

Die Erfindung bezieht sich auch auf pharmazeutische Zusammensetzungen, die in einem pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoff eine therapeutisch wirksame Menge wenigstens einer der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verbindungen enthält.

Die Erfindung erstreckt sich auch auf die Verwendung dieser Verbindungen zum Herstellen von Arzneimitteln und Verfahren zum Herstellen solcher Verbindungen.

Insbesondere sind die erfindungsgemäßen Verbindungen, die vielfach eine die Cholinesterasen hemmende Wirkung zeigen, als therapeutische und/oder prophylaktische Wirkstoffe für die senile Demenz, Alzheimer-Krankheit, usw. geeignet. Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verbindungen sind neue tetrazyklische, kondensierte, heterocyclische Verbindungen.

Zusätzlich zu den therapeutischen und/oder prophylaktischen Eigenschaften können die erfindungsgemäßen Verbindungen und Zusammensetzungen auch bei der Diagnose von Krankheitszuständen der eingangs genannten Art verwendet werden.

Literatur:

- 1) Kawahara, M.; Kuroda, Y.; Arispe, N.; Rojas, E.; „Alzheimer's beta-amyloid, human islet amylin, and prion protein fragment evoke intracellular free calcium elevations by a common mechanism in a hypothalamic BnRH neuronal cell line." *J Biol Chem* 2000 May 12; 275 (19): 14077-83
- 2) Ma, Z.; Westermark, P.; Westermark, GT; „Amyloid in human islets of Langerhans: immunologic evidence that islet amyloid polypeptide is modified in amyloidogenesis." *Pancreas* 2000 Aug; 21 (2): 212-8
- 3) Rhoades, E.; Agarwal, J.; Gafni, A.; „Aggregation of an amyloidogenic fragment of human islet amyloid polypeptide." *Biochim Biophys Acta* 2000 Feb 9; 1476(2): 230-8

Nachstehend werden Arbeitsvorschriften und Beispiele zum Herstellen erfindungsgemäßer Verbindungen angegeben.

Allgemeine Bemerkungen


„Konzentrieren“ oder „Konzentration“ bezeichnet das Entfernen von Lösungsmitteln unter vermindertem Druck mittels eines Rotationsverdampfers.

„MPLC“ bezeichnet eine chromatographische Reinigung an Kieselgel 20-60 µm unter Verwendung von Büchi-Chromatographiesäulen, einer Shimadzu LC-8A Pumpe und einem Shimadzu 6AV UV-Detektor.

5

# Beispiel 1 :

Stufe 1: 4-Brom-2-methoxy-5-(2-nitroethenyl)-phenol




10

40.0 g (173 mmol) 2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd und 13.3 g (173 mmol) Ammoniumacetat werden in 400 mL Nitromethan 15 Min. auf Rückfluß erhitzt. Das Reaktionsgemisch wird zur Trockene eingedampft, der Rückstand in etwa 70 mL Methanol digeriert und anschließend abgesaugt. Um eine zweite Fraktion des Produkts zu gewinnen wird die Methanol-Lösung auf ca. 30 mL eingengt und sodann auf 500 mL Wasser gegossen. Der ausgefallene Feststoff wird abgenutscht, mit ca. 100 mL Wasser gewaschen und gemeinsam mit der ersten Fraktion bei 50°C/50 mbar getrocknet, wodurch insgesamt 43.6 g (92 % d. Th.) gelbe Kristalle vom Schmp. 152 - 154°C an 4-Brom-2-methoxy-5-(2-nitroethenyl)-phenol erhalten werden.

20 DC:  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  : MeOH = 9:1  
 $^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ;  $\delta$  (ppm)): 3.85 (s, 3H,  $\text{OCH}_3$ ); 7.30 (s, 1H, H-6); 7.38 (s, 1H, H-3); 8.03 (d,  $^3J_{\text{HH}} = 13.41$  Hz, 1H,  $\text{ArCH=}$ ); 8.16 (d,  $^3J_{\text{HH}} = 13.41$  Hz, 1H,  $=\text{CHNO}_2$ )  
 $^{13}\text{C-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ;  $\delta$  (ppm)): 56.3 (q,  $\text{OCH}_3$ ); 114.7 (d, C-6); 116.1 (d, C-3); 116.6 (s, C-2); 121.4 (s, C-1); 136.8 (d,  $\text{ArCH=}$ ); 137.6 (d,  $=\text{CHNO}_2$ ); 146.5 (s, C-5); 152.2 (s, C-4)

25


Stufe 2: 4-Brom-2-methoxy-5-(2-aminoethyl)-phenol



30 Methode A:

Zu 168 mL (148 mmol) einer 0.88 N Lithiumaluminiumhydridlösung in Diethylether werden bei 0°C unter Stickstoff-Atmosphäre 7.2 g (74 mmol) konzentrierte Schwefelsäure zugetropft. 10.0 g (36.5 mmol) 4-Brom-2-methoxy-5-(2-nitroethenyl)-phenol werden in einem Liter absolutem Diethylether in der Siedehitze teilweise gelöst und anschließend die überstehende Lösung mit einer Transfernadel und trockenem Stickstoff der Aluminiumhydridlösung bei Raumtemperatur zugegeben. Nach der vollständigen Zugabe werden 700 mL Diethylether aus dem Reaktionsgemisch zum ungelösten 4-Brom-2-methoxy-5-(2-nitroethenyl)-phenol in den Vorlagekolben destilliert. Durch Erhitzen auf Rückfluß wird eine gesättigte Lösung hergestellt, die

35



wie oben dem Reaktionsgemisch zugeführt wird. Dieser Vorgang wird bis zur vollständigen

40 Zugabe von 4-Brom-2-methoxy-5-(2-nitroethyl)-phenol wiederholt (drei- bis viermal).  
Anschließend wird mit Wasser bei 0°C hydrolysiert und die etherische Phase zweimal mit je 300  
mL 4N Salzsäure extrahiert. Die saure Lösung wird mit 22.2 g (148 mmol) L-(+)-Weinsäure versetzt,  
mit konzentriertem wäßrigen Ammoniak basisch gemacht und erschöpfend mit Chloroform  
extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter wäßriger


45 Natriumchloridlösung gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), filtriert und eingedampft, wodurch 2.20  
g (24 % d. Th.) farblose Kristalle vom Schmp. 170 - 172°C an 4-Brom-2-methoxy-5-(2-aminoethyl)-  
phenol erhalten werden.

Methode B:

50 Zu einer auf Rückfluß erhitzten Lösung von 15.0 g (394.2 mmol) Lithiumaluminiumhydrid in  
1 l absolutem Tetrahydrofuran wird im Laufe von 2 Stdn. unter Stickstoff eine Lösung von 18.0 g  
(65.7 mmol) 4-Brom-2-methoxy-5-(2-nitroethyl)-phenol in 200 mL absolutem Tetrahydrofuran  
zugetropft. Anschließend wird das Reaktionsgemisch unter Eiskühlung mit ca. 20 mL Wasser  
hydrolysiert und zur Trockene eingedampft. Der Rückstand wird in 500 mL 2 N Salzsäure  
55 aufgenommen und mit 500 mL Essigsäureethylester gewaschen. Die Waschphase wird mit 200  
mL 2 N Salzsäure rückgeschüttelt, die vereinigten wäßrigen Phasen mit 70 g (467 mmol) L-(+)-  
Weinsäure versetzt, mit konzentriertem wäßrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je  
800 mL Chloroform extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Natriumsulfat  
getrocknet, filtriert und eingedampft, wodurch 9.92 g (61 % d. Th.) farblose Kristalle an 4-Brom-2-  
methoxy-5-(2-aminoethyl)-phenol vom Schmp. 170 - 172°C erhalten werden.

60

Stufe 3: 4-Brom-5-{N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-aminoethyl}-2-methoxyphenol



65 6.4 g (26.0 mmol) 4-Brom-2-methoxy-5-(2-aminoethyl)-phenol und 3.2 g (26.0 mmol) p-  
Hydroxybenzaldehyd werden in 150 mL absolutem Ethanol 2 Stdn. auf Rückfluß erhitzt.  
Anschließend werden unter Eiskühlung 5.0 g (132.0 mmol) Natriumborhydrid zugegeben und  
eine weitere halbe Stunde auf Rückfluß erhitzt, das überschüssige Natriumborhydrid durch  
Zugabe von etwa 1 mL Eisessig sowie 50 mL Wasser unter Eiskühlung zerstört und die Lösung

70 eingedampft. Der Rückstand wird mit 2 N Salzsäure angesäuert, und mit 50 mL Chloroform  
gewaschen. Bei der Hydrolyse können sich eventuell größere Feststoffbrocken bilden, welche  
vor der Extraktion zermahlen werden müssen, da sie große Mengen Produkt einschließen  
können. Die Waschphase wird mit 30 mL 2 N Salzsäure rückgeschüttelt, die vereinigten wäßrigen  
Phasen mit konzentriertem wäßrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 80 mL  
75 Essigsäureethylester extrahiert. Die organischen Phasen werden vereinigt, über Natriumsulfat


getrocknet, filtriert und eingedampft, wodurch 8.9 g (97 % d. Th.) farblose Kristalle vom Schmp. 69-72°C an 4-Brom-5-{N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-aminoethyl}-2-methoxyphenol erhalten werden.

DC:  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1 + 2\% \text{ NH}_3$

80  $^1\text{H-NMR}$  (DMSO;  $\delta$  (ppm)): 2.55 - 2.78 (m, 4H,  $\text{ArCH}_2\text{CH}_2\text{NH}$ ); 3.58 (s, 2H,  $\text{NHCH}_2\text{Ph}$ ); 3.73 (s, 3H,  $\text{OCH}_3$ ); 6.60 - 6.76; 7.02 - 7.14 (2\* m, 6H, 2\* Ph)  
 $^{13}\text{C-NMR}$  (DMSO;  $\delta$  (ppm)): 35.2 (t,  $\text{ArCH}_2$ ); 48.7 (t,  $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}$ ); 52.2 (t,  $\text{NHCH}_2\text{Ph}$ ); 55.9 (q,  $\text{OCH}_3$ ); 111.3 (s, C-4); 114.8 (d, C-3'); 115.9 (d, C-6); 117.3 (d, C-3); 129.1 (d, C-2'); 130.7 (s, C-5); 131.4 (s, C-1'); 146.0 (s, C-2); 146.8 (s, C-1); 156.0 (s, C-4')

85

Stufe 4: N-[2-(2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethyl]-N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]formamid:




90

8.5 g (24.1 mmol) 4-Brom-5-{N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-aminoethyl}-2-methoxyphenol und 10 mL (123.8 mmol) Ameisensäureethylester werden mit 2.5 mL Ameisensäure, 10 mL N,N-Dimethylformamid sowie einer Spatelspitze Dimethylaminopyridin in 150 mL absolutem Dioxan 24 Stdn. auf Rückfluß erhitzt. Gegen Ende der Reaktion klärt sich die anfangs weiße Suspension und die Mischung wird mit 50 mL Wasser versetzt. Das Dioxan wird abdestilliert, der entstandene weiße Niederschlag abgenutscht und mit Wasser gewaschen, wodurch die erste Fraktion Produkt erhalten wird. Das Filtrat wird dreimal mit je 50 mL Essigsäureethylester extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft. Durch anschließende Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Laufmittel:  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 97:3$ ) wird eine weitere Fraktion erhalten. Beide Fraktionen werden bei 50°C/50 mbar bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, wodurch insgesamt 6.6 g (72% d. Th.) farblose Kristalle vom Schmp. 104 - 106°C an N-[2-(2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethyl]-N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-formamid erhalten werden.

DC:  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$

105  $^1\text{H-NMR}$  (DMSO;  $\delta$  (ppm)): 2.56 - 2.78 (m, 2H,  $\text{ArCH}_2$ ); 3.43 - 3.53 (m, 2H,  $\text{CH}_2\text{N}$ ); 3.72 (s, 3H,  $\text{OCH}_3$ ); 4.14 (dd, 2H,  $\text{NCH}_2\text{Ph}$ ); 6.67 - 6.80; 7.00-7.11 (2\* m, 6H, Ar, Ph); 9.30, 9.48 (2\* s, 1H, CHO)




<sup>13</sup>C-NMR (DMSO; δ (ppm)):

32.6, 34.2 (2\* t, ArCH<sub>2</sub>); 41.5, 44.3 (2\* t, CH<sub>2</sub>N); 46.1, 50.4 (2\* t, NCH<sub>2</sub>Ph); 56.1 (q, OCH<sub>3</sub>); 111.4, 111.6 (2\* s, C-4); 115.1, 115.2 (2\* d, C-6); 115.6, 115.7 (2\* d, C-3'); 117.7, 118.0 (2\* d, C-3); 126.8, 127.0 (2\* s, C-5); 129.4 (d, C-2'); 130.0 (s, C-1'); 146.5, 146.6 (2\* s, C-2); 147.5, 147.6 (2\* s, C-1); 157.1, 157.5 (2\* s, C-4'); 162.7, 163.0 (2\* d, CHO)

110

115 Stufe 5: (4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-6-oxo-6H-benzofuro[3a,3,2-ef]-[3]benzazepin-10-carboxaldehyd:



120 Eine Mischung von 13 g (39.5 mmol) Kaliumhexacyanoferrat(III), 300 mL Chloroform und 50 mL wässrige 10 %ige Kaliumcarbonatlösung wird auf 60°C erwärmt, unter heftigem Rühren mit 3 g (7.9 mmol) N-[2-(2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethyl]-N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-formamid versetzt und anschließend weitere 10 Minuten heftig mechanisch gerührt. Danach wird der entstandene braune Feststoff über Hyflo abfiltriert, dreimal mit je 30 mL Chloroform nachgewaschen und fest abgepreßt. Das Filtrat wird sodann mit etwa 150 mL Wasser gewaschen, die Waschphase mit 150 mL Chloroform rückgeschüttelt, die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft. Durch Reinigung über Säulenchromatographie (15 g Kieselgel, Laufmittel: CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 97:3) werden 580 mg (19 % d. Th.) farblose Kristalle vom Schmelzpunkt 218-220°C erhalten.

130 DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>; δ (ppm)): 2.58-4.27 (m, 8H, H-5/5'/9/9'/11/11'/12/12'); 3.80 (s, 3H, OCH<sub>3</sub>); 4.85 (dd, 1H, H-4a); 6.09 (dd, 1H, H-8); 6.53 (dd, 1H, H-7); 7.01 (s, 1H, H-2); 8.10, 8.30 (2\* s, 1H, CHO Konf. A/B)

<sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>; δ (ppm)): 33.4, 35.3 (2\*t, C-9 Konf. A/B); 37.2, 37.4 (2\*t, C-5 Konf. A/B); 43.7 (t, C-11); 48.7, 49.0 (2\*t, C-12 Konf. A/B); 50.9, 51.4 (2\*s, C-8a Konf. A/B); 56.2 (q, OCH<sub>3</sub>); 83.8, 84.3 (2\*s, C-4a Konf. A/B); 115.3, 115.7 (2\*s, C-1 Konf. A/B);

135

116.8, 117.0 (2\*d, C-8 Konf. A/B); 127.6, 128.9 (2\*s, C-12a Konf. A/B); 128.0, 128.8 (2\*d, C-7 Konf. A/B); 129.8, 130.8 (2\*s, C-12b Konf. A/B); 141.5, 141.7 (2\*d, C-2 Konf. A/B); 143.8, 144.0 (2\*s, C-3a Konf. A/B); 146.8 (s, C-3); 161.7, 162.3 (2\*d, CHO); 193.0, 193.4 (2\*s, C-6)


140

$C_{17}H_{16}BrNO_4$  (JOS 1526) 378.23 g/mol

ber.: C 53.99H 4.26 N 3.70

gef.: C 53.70H 4.47 N 3.41

- 45 Stufe 6: (4 $\alpha$ ,8 $\alpha$ )-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef]-[3]benzazepin-6-ol:



- 155 Zu einer Lösung von 500 mg (1.32 mmol) (4 $\alpha$ ,8 $\alpha$ )-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-6-oxo-6H-benzofuro[3a,3,2-ef]-[3]benzazepin-10-carboxaldehyd in 12 mL absolutem Tetrahydrofuran werden bei -12°C unter Stickstoff 4 mL (4.00 mmol) 1 N L-Selectrid-Lösung zugetropft und das Reaktionsgemisch anschließend eine Stunde bei -10°C gerührt. Danach wird mit 3 mL Methanol hydrolysiert, die Lösung zur Trockene eingedampft, in 50 mL 2 N Salzsäure aufgenommen und eine weitere Stunde heftig gerührt. Die wässrige Lösung wird mit 50 mL Essigsäureethylester gewaschen, die Waschphase mit 20 mL 2 N Salzsäure rückgeschüttelt, die vereinigten wässrigen Phasen mit konzentriertem wässrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 50 mL Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft, wodurch 380 mg (82 % d. Th.) hellgelbe Kristalle vom Schmp. 132 - 136°C an (4 $\alpha$ ,8 $\alpha$ )-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef]-[3]benzazepin-6-ol erhalten werden.

DC:  $CHCl_3$  : MeOH = 9:1


$^1H$ -NMR ( $CDCl_3$ ;  $\delta$  (ppm)):

1.87 (ddd, 1H, H-5); 2.62 (ddd, 1H, H-5'); 2.68 (ddd, 1H, H-11); 2.78 (d, 1H, H-9,  $^2J_{9,9'}=12.6$  Hz); 2.85 (ddd, 1H, H-11'); 2.98 (d, 1H, H-9',  $^2J_{9,9'}=12.6$  Hz); 3.30 (ddd, 1H, H-12); 3.37 (ddd, 1H, H-12'); 3.80 (s, 3H, OCH<sub>3</sub>); 4.08 (ddd, 1H, H-6); 4.50 (dd, 1H, H-4a); 6.08 (dd, 1H, H-8,  $^3J_{7,8}=10.2$  Hz); 6.15 (d, 1H, H-7,  $^3J_{7,8}=10.2$  Hz); 6.96 (s, 1H, H-2) 30.2 (t, C-5); 36.7 (t, C-9); 49.7 (t, C-11); 51.6 (s, C-8a); 56.0 (q, OCH<sub>3</sub>); 57.3 (t, C-12); 62.0 (d, C-6); 85.5 (d, C-4a); 114.9 (s, C-1); 115.7 (d, C-8); 127.3 (d, C-2); 127.7 (d, C-7); 130.5 (s, C-12a); 134.2 (s, C-12b); 143.5 (s, C-3a); 145.4 (s, C-3)

- 170 Stufe 7: (4 $\alpha$ ,8 $\alpha$ )-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-10-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef]-[3]benzazepin-6-ol

175






Zu einer Lösung von 370 mg (1.05 mmol) von (4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol in 12 mL Acetonitril werden unter heftigem Rühren nacheinander 1 mL 35 %ige wäßrige Formaldehydlösung und portionsweise 165 mg (2.63 mmol) Natriumcyanoborhydrid zugegeben und das Reaktionsgemisch bei Raumtemp. eine Stunde heftig gerührt. Danach wird die Lösung mit 2 N Salzsäure angesäuert, mit 15 mL Dichlormethan gewaschen und die Waschphase mit 15 mL 2 N Salzsäure rückgeschüttelt. Die vereinigten wäßrigen Phasen werden mit konzentriertem wäßrigem Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 30 mL Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft, wodurch 355 mg (92 % d. Th.) gelbe Kristalle vom Schmp. 158 - 161 °C an (4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-10-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol erhalten werden.

DC:  $CHCl_3$  : MeOH = 9:1

$^1H$ -NMR ( $CDCl_3$ ;  $\delta$  (ppm)): 1.91 - 2.04 (m, 1H, H-5); 2.27 - 2.48 (m, 2H, H-5'/11); 2.41 (s, 3H, NCH<sub>3</sub>); 2.60 - 2.81 (m, 2H, H-9/11'); 2.92 - 3.16 (m, 2H, 9'/12); 3.34 (dd,  $^3J_{11/12} = 6.37$  Hz,  $^2J_{12/12'} = 16.48$  Hz, 1H, H-12'); 4.13 - 4.25 (m, 1H, H-6); 4.58 (b, 1H, H-4a); 6.02 (dd,  $^3J_{7/8} = 10.17$  Hz,  $^4J_{6/8} = 5.08$  Hz, 1H, H-8); 6.18 (d,  $^3J_{7/8} = 10.17$  Hz, 1H, H-7); 6.92 (s, 1H, H-2)

Stufe 8: (4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-3-methoxy-10-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef]-[3]benzazepin-6-ol



Eine Mischung aus 340 mg (0.93 mmol) (4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-

methoxy-10-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol und 722 mg (6.51 mmol) Calciumchlorid in 40 mL 50 %igem Ethanol wird mit 1.4 g (22.32 mmol) frisch aktiviertem Zinkpulver<sup>1</sup> versetzt und 5 Stdn. auf Rückfluß erhitzt. Anschließend wird das Zink abfiltriert, mit Methanol nachgewaschen und die Restlösung eingedampft. Der Rückstand wird in 50 mL 1 N Salzsäure aufgenommen, mit 30 mL Essigsäureethylester gewaschen und die Waschphase mit 20 mL Salzsäure rückgeschüttelt. Die vereinigten wäßrigen Phasen werden mit konzentriertem wäßrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 50 mL Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingedampft, wodurch 230 mg (86 % d. Th.) gelbe Kristalle vom Schmp. 152 - 155°C an (4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-3-methoxy-10-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol erhalten werden.


DC: EE : EtOH = 9:1 (sichtbar durch Oxidation in der Jod-Kammer)

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>; δ (ppm)): 1.90 - 2.04 (m, 1H, H-5); 2.26 - 2.46 (m, 2H, H-11/11'); 2.42 (s, 3H, NCH<sub>3</sub>); 2.62 - 2.80 (m, 3H, H-5'/9/9'); 3.01 - 3.12 (m, 1H, H-12); 3.12 - 3.29 (m, 1H, H-12'); 3.83 (s, 3H, OCH<sub>3</sub>); 4.12 - 4.22 (m, 1H, H-6); 4.57 (b, 1H, H-4a); 6.01 (ddd, <sup>3</sup>J<sub>7/8</sub> = 10.16 Hz, <sup>4</sup>J<sub>6/8</sub> = 5.18 Hz, <sup>5</sup>J<sub>5/8</sub> = 0.95 Hz; 1H, H-8); 6.22 (dd, <sup>3</sup>J<sub>7/8</sub> = 10.16 Hz, <sup>4</sup>J<sub>5/7</sub> = 1.09 Hz, 1H, H-7); 6.61 (d, <sup>3</sup>J<sub>1/2</sub> = 8.21 Hz, 1H, H-2); 6.66 (d, <sup>3</sup>J<sub>1/2</sub> = 8.21 Hz, 1H, H-1)


<sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>; δ (ppm)): 30.0 (t, C-5); 34.5 (t, C-9); 48.9 (s, C-8a); 49.3 (q, NCH<sub>3</sub>); 55.6 (q, OCH<sub>3</sub>); 59.1 (t, C-11); 62.0 (d, C-6); 66.3 (t, C-12); 85.6 (d, C-4a); 111.1 (d, C-1); 121.5 (d, C-8); 126.5 (d, C-2); 128.3 (d, C-7); 130.9 (s, C-12a); 132.7 (s, C-12b); 142.9 (s, C-3a); 145.3 (s, C-3b)

## Beispiel 2:

(4α,8α)-4a,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-6-[[4-bromphenyl)methyl]-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol



<sup>1</sup> Zinkpulver (Fa. Aldrich) mit 2 N Salzsäure versetzten, gut durchmischen, abfiltrieren und zunächst mit dest. Wasser neutral waschen, dann mit Methanol gut nachwaschen.




- 240 Eine Mischung von 23 mg (0.068 mmol) (4 $\alpha$ ,8 $\alpha$ )-4 $\alpha$ ,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol, 19 mg (0.136 mmol) Kaliumcarbonat und 12 mg (0.082 mmol) Natriumjodid wird in 20 ml absolutem Aceton mit 21 mg (0.082 mmol) 4-Brombenzylbromid versetzt und auf Rückfluß erhitzt. Nach einer Stunde wird das Reaktionsgemisch eingedampft, der Rückstand in 10 ml 2 N Salzsäure aufgenommen, mit Essigsäureethylester gewaschen, mit konzentriertem wäßrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 5 ml Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden einmal mit gesättigter wäßriger Natriumchloridlösung gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,
- 245 Aktivkohle), filtriert und eingedampft. Die weitere Reinigung erfolgt über flash chromatographie (15 g Kieselgel; Laufmittel: CHCl<sub>3</sub>  $\Rightarrow$  CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 95:5), wodurch 10 mg (29 % d. Th.) ölige Substanz an (4 $\alpha$ ,8 $\alpha$ )-4 $\alpha$ ,5,9,10,11-Hexahydro-1-brom-6-[(4-bromphenyl)methyl]-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][3]benzazepin-6-ol erhalten werden.


DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>;  $\delta$  (ppm)): 1.78 (ddd, 1H, H-5); 1.98 - 2.31 (m, 4H, H-5'/9/11/11'); 2.70 (ddd, 1H, H-9'); 3.57 (ddd, 1H, H-12); 3.82 (s, 3H, OCH<sub>3</sub>); 3.86 (ddd, 1H, H-12'); 4.15 (b, 1H, H-6); 4.42 (d, 1H, NCH<sub>2</sub>); 4.65 (b, 1H, H-4 $\alpha$ ); 5.00 (d, 1H, NCH<sub>2</sub>); 5.91 (d, 1H, H-7); 6.06 (dd, 1H, H-8); 6.92 (s, 1H, H-2); 7.28 (d, 2H, Ph-2/6); 7.43 (d, 2H, Ph-3/5)

Schema zu Beispiel 1 und 2



- 260 **Beispiel 3:**  
2-[4-[(4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-benzofuro[3a,3,2-e,f][2]benzazepin-11-yl]butyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 1,1-dioxid tartrat, dihydrat (SPH-1374)



265

2-(6-Bromhexyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (2.33 g, 7.32 mmol), hergestellt gemäß Hamor, G. H.; Rubessa, F.; *Farmaco Ed. Sci.* **1970**, 25, 36-39, Norgalanthamin (2.00 g, 7.32 mmol) und N-Ethyl-diisopropylamin (2.84 g, 22.0 mmol) in absolutem Chloroform (20 ml) werden 24 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

270

Das Lösungsmittel wird abgezogen und der Rückstand säulenchromatographisch gereinigt (150 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak : 96.5 : 3 : 0.5), wodurch das Produkt als farbloser Schaum (2.67 g, 5.23 mmol, 71.4 %) erhalten wird.

DC: Chloroform : Methanol : Ammoniak = 89 : 10 : 1; R<sub>f</sub> = 0.5

275

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 8.05 - 7.72 (m, 4H), 6.63 - 6.55 (m, 2H), 6.10 - 5.90 (m, 2H), 4.56 (b, 1H), 4.15 - 4.01 (m, 2H), 3.84 - 3.70 (m, 6H), 3.42 - 3.04 (m, 2H), 2.71 - 2.35 (m, 4H), 2.10 - 1.72 (m, 4H), 1.65 - 1.40 (m, 2H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 158.8 (s), 145.7 (s), 143.9 (s), 137.5 (s), 134.6 (d), 134.1 (d), 133.0 (s), 129.4 (s), 127.4 (d), 127.2 (s), 126.8 (d), 124.9 (d), 121.8 (d), 120.7 (d), 111.0 (d), 88.5 (d), 61.9 (d), 57.5 (t), 55.7 (q), 51.4 (t), 50.5 (t), 48.3 (s), 39.1 (t), 32.9 (t), 29.8 (t), 26.0 (t), 24.5 (t)

280

Die Base (SPH-1369, 2.50g, 4.90 mmol) und (+)-Weinsäure (0.80g, 5.33 mmol, 1.09 Äquivalent) werden in EtOH (95%, ca. 10 mL) bis zur klaren Lösung erwärmt (ca. 50°C) und diese Lösung noch warm tropfenweise innerhalb von 5 min zu magnetisch gerührtem absolutem Ether (ca. 200 mL) zugefügt wobei ein weißer Niederschlag entsteht. Nach Stehen über Nacht bei Raumtemperatur werden die erhaltenen Kristalle abgenutscht und mit absol. Ether (3 x 50 mL) gewaschen und das Produkt im Vakuumexsiccator bei Raumtemperatur/50 mbar über Calciumchlorid getrocknet wobei das Tartrat Dihydrat in Form eines farblosen Pulvers (3.184g, 93.3% d.Th.) erhalten wird. Eine Analysenmenge wird bei 2 mbar und 40°C 8 Stunden über Phosphorpentoxid getrocknet.

285


C<sub>27</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>S · C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> · 2 H<sub>2</sub>O (JOS 1659) (697.7)

290

Ber.	C 56.18H 5.78	N 4.23
Gef.a)	C 55.74H 5.81	N 4.15
b)	C 55.76H 5.79	N 4.26

10 **Beispiel 4:**

2-[5-[(4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-benzofuro[3a,3,2-e,f][2]benzazepin-11-yl]pentyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 1,1-dioxid (SPH-1372)



15 2-(5-Bromopentyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1.66 g, 5.00 mmol), Norgalanthamin (1.37 g, 5.00 mmol) und N-Ethyl-diisopropylamin (1.94 g, 15.0 mmol) in absolutem Chloroform (15 ml) werden 24 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

Das Lösungsmittel wird abgezogen und der Rückstand säulenchromatographisch gereinigt (150 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak : 96.5 : 3 : 0.5), wodurch das Produkt als farbloser Schaum (2.09 g, 3.99 mmol, 79.7 %) erhalten wird.

20 DC: Chloroform : Methanol : Ammoniak = 89 : 10 : 1; R<sub>f</sub> = 0.5  
<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 8.05 - 7.70 (m, 4H), 6.63 - 6.50 (m, 2H), 6.09 - 5.85 (m, 2H), 4.55 (b, 1H), 4.15 - 3.99 (m, 2H), 3.82 - 3.60 (m, 5H), 3.41 - 2.92 (m, 2H), 2.70 - 2.32 (m, 3H), 2.09 - 1.70 (m, 4H), 1.58 - 1.23 (m, 6H);

25 <sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 158.7 (s), 145.6 (s), 143.8 (s), 137.5 (s), 134.5 (d), 134.1 (d), 133.0 (q), 129.4 (s), 127.3 (d), 127.2 (s), 126.8 (d), 124.8 (d), 121.8 (d), 120.7 (d), 111.0 (d), 88.5 (d), 61.8 (d), 57.5 (t), 55.7 (q), 51.4 (t), 51.0 (t), 48.2 (s), 39.1 (t), 32.8 (t), 29.8 (t), 28.1 (t), 26.6 (t), 24.3 (t), 20.3 (d)  
 Herstellung des Fumarats (UJ-1682)

30 Eine warme (ca. 50°C) Lösung der Base (1.686g, 3.21 mmol) in EtOH (95%, 10 mL) wird mit gesättigter Fumarsäurelösung (10 mL, ca. 0.5 M in 95% Ethanol) vereinigt, bei ca. 60°C bis zum Erreichen einer klaren Lösung erwärmt und diese Lösung noch warm tropfenweise innerhalb von 5 min zu magnetisch gerührtem absolutem Ether (ca. 200 mL) zugefügt wobei ein weißer Niederschlag entsteht. Nach Stehen über Nacht bei Raumtemperatur werden die erhaltenen Kristalle abgenutscht und mit absol. Ether (3 x 50 mL) gewaschen und das Produkt im Vakuumsiccator bei Raumtemperatur/50 mbar über Calciumchlorid getrocknet wobei das

35 Fumarat in Form eines farblosen Pulvers (1.394g, 67.7% d.Th.) erhalten wird. Eine Analysenmenge wird bei 2 mbar und 40°C 8 Stunden über Phosphorpentoxid getrocknet. Aus der Mutterlauge wird eine zweite Fraktion gewonnen (= UJ-1682-1-2)


C<sub>28</sub>H<sub>32</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub> · C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> · ½ C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O (JOS 1657) (677.8)

40 Ber. C 59.54H 6.21 N 4.21  
 Gef. C 59.49H 6.18 N 4.20

**Beispiel 5:**

2-[6-[(4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-benzofuro[3a,3,2-

45 e,f)[2]benzazepin-11-yl]hexyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 1,1-dioxid fumarat (SPH-1373):



50 2-(6-Bromohexyl)-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1.50 g, 4.33 mmol), hergestellt gemäß Kim, Sung-Kyu; Cho, Su-Dong; Moon, Jung-Kyen; Yoon, Yong-Jin. J. Heterocycl. Chem. (1996), 33(3), 615-618, Norgalanthamin (1.18 g, 4.33 mmol), und N-Ethyl-diisopropylamin (1.68 g, 13.0 mmol) in absolutem Chloroform (15 ml) werden 24 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wird abgezogen und der Rückstand säulenchromatographisch gereinigt (150 g Kiesegel, Chloroform : Methanol : Ammoniak : 96.5 : 3 : 0.5), wodurch die Base als farbloser  
55 Schaum (1.91 g, 3.52 mmol, 81.4 %) erhalten wird.

DC: Chloroform : Methanol : Ammoniak = 89 : 10 : 1; R<sub>f</sub> = 0.5

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 8.08 - 7.72 (m, 4H), 6.68 - 6.55 (m, 2H), 6.12 - 5.90 (m, 2H), 4.57 (b, 1H), 4.16 - 4.01 (m, 2H), 3.82 - 3.65 (m, 6H), 3.52 - 3.03 (m, 2H), 2.71 - 2.28 (m, 3H), 2.10 - 1.71 (m, 4H), 1.55 - 1.25 (m, 7H);

60 158.8 (s), 145.7 (s), 143.9 (s), 137.6 (s), 134.6 (d), 134.2 (d), 133.1 (s), 129.5 (s), 127.4 (d), 127.3 (s), 126.9 (d), 125.0 (d), 121.9 (d), 120.8 (d), 111.1 (d), 88.6 (d), 62.0 (d), 57.6 (t), 55.8 (q), 51.5 (t), 48.3 (t), 39.3 (t), 32.9 (t), 29.9 (t), 28.2 (t), 27.1 (t), 26.7 (t), 26.6 (t)

Herstellung des Fumarats

65 Eine durch Erwärmen der Base (1.33g, 2.47 mmol) in Fumarsäurelösung (8 mL, gesättigte Lösung in 95% Ethanol) auf ca. 60°C erhaltene klare Lösung wird tropfenweise innerhalb von 5 min zu magnetisch gerührtem absolutem Ether zugefügt wobei ein weißer Niederschlag entsteht. Nach Stehen über Nacht bei Raumtemperatur werden die erhaltenen Kristalle abgenutscht und mit absol. Ether (3 x 50 mL) gewaschen und das Produkt im Vakuumexsiccator bei Raumtemperatur/50 mbar über Calciumchlorid getrocknet wobei das Fumarat in Form eines  
70 farblosen Pulvers (1.170g, 72% d.Th.) erhalten wird. Eine Analysenmenge wird bei 2 mbar und 40°C 8 Stunden über Phosphorpentoxid getrocknet.


C<sub>29</sub>H<sub>34</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>S · C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> (JOS 1658)

Ber. C 60.54, H 5.85, N 4.28.

Gef.: C 60.49, H 5.97, N 4.22

#### Beispiel 6:

Stufe 1: 2-(4-Brombutyl)-5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-carbon-säuremethylester



80

Zu einer Suspension von Natriumhydrid (0.84 g, 17.6 mmol, 50 % in Weißöl, durch Digerieren mit absolutem Petrolether (3 x 50 mL) vom Weißöl befreit) in absolutem DMF wird 5,6-Dimethoxy-1-oxoindan-2-carbonsäuremethylester (4.0 g, 16.0 mmol), hergestellt gemäß Fukushi, Hideto; Mabuchi, Hiroshi; Itoh, Katsumi; Terashita, Zen-ichi; Nishikawa, Kohei; Sugihara, Hirosada; Chem. Pharm. Bull. 1994, 42(3), 541-550, bei Raumtemperatur in Substanz zugegeben und die Lösung 45 Minuten bei Raumtemperatur gerührt. Danach versetzt man mit 1,4-Dibrombutan (24.2 g, 112.0 mmol) und rührt 18 Stunden bei Raumtemperatur. Man verteilt zwischen Wasser und Ether, extrahiert die wässrige Phase quantitativ mit Ether, wäscht die vereinigten organischen Phasen mit Wasser (5 x), gesättigter Kochsalzlösung (1 x) und trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle).

85

90

Vom nach dem Eindampfen erhaltenen Rückstand wird überschüssiges Dibromalkan am Hochvakuum durch Kugelrohrdestillation (100 °C/0.05 mbar) abgetrennt und der erhaltene Rückstand aus siedendem tert.-Butylmethylether (25 mL) umkristallisiert, wodurch das Produkt in Form farbloser Kristalle (5.02 g, 13.0 mmol, 81.6 %) erhalten wird.  
 DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 3 : 1; Rf = 0.15

95

Schmp.: 92 – 93 °C  
 $^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  7.13 (s, 1H), 6.88 (s, 1H), 3.94 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.65 (s, 3H), 3.58 (d, J=18.3 Hz, 1H), 3.33 (t, J=6.7 Hz, 2H), 2.97 (d, J=17.2 Hz, 1H), 2.20-1.99 (m, 1H), 1.95-1.73 (m, 3H), 1.53-1.26 (m, 2H);  
 $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  200.7 (s), 171.6 (s), 156.1 (s), 149.7 (s), 148.5 (s), 127.7 (s), 107.1 (d), 104.8 (d), 60.6 (s), 56.2 (q), 56.0 (q), 52.6 (q), 36.3 (t), 33.6 (t), 33.2 (t), 32.6 (t), 23.1 (t).

100

Anzahl, chemische Verschiebung und Multiplizität der gefundenen Peaks bestätigen die postulierte Struktur


Stufe 2:

105

2-(4-Brombutyl)-5,6-dimethoxyindan-1-on



- 73 -



115


- 120 2-(4-Brombutyl)-5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-carbonsäuremethylester (3.0 g, 7.79 mmol) wird in konzentrierter Salzsäure (10 mL) und Essigsäure (30 mL) 12 Stunden bei 60 °C gerührt. Man versetzt mit gesättigter Natriumcarbonatlösung, neutralisiert mit Natriumcarbonat und extrahiert quantitativ mit Ether, wäscht die vereinigten organischen Phasen mit gesättigter Natriumcarbonatlösung (3 x), Wasser (1 x), gesättigter Kochsalzlösung (1 x), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und kristallisiert den nach Eindampfen erhaltenen Rückstand aus *tert*-Butylmethylether (10 mL) um. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (1.85 g, 5.65 mmol, 72.5 %)
- 125 DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 3 : 1; R<sub>f</sub> = 0.2
- Schmp.: 72 – 73 °C
- 130 <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.15 (s, 1H), 6.85 (s, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 3.40 (t, J=6.8 Hz, 1H), 3.23 (dd, J=18.0 Hz, J=8.0 Hz, 1H), 2.78-2.57 (m, 2H), 2.00-1.72 (m, 3H), 1.65-1.35 (m, 3H); <sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 207.1 (s), 155.5 (s), 149.4 (s), 148.8 (s), 129.3 (s), 107.3 (d), 104.3 (d), 56.1 (t), 56.0 (t), 47.4 (d), 33.5 (t), 32.6 (t), 32.5 (t), 30.6 (t), 25.8 (t)

Stufe 3:

- 135 2-[4-[(4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-benzofuro[3a,3,2-e,f][2]benzazepin-11-yl]butyl]-5,6-dimethoxyindan-1-on

140

- 74 -



145

(

2-(4-Brombutyl)-5,6-dimethoxyindan-1-on (1.0 g, 3.01 mmol), Norgalanthamin (919 mg, 3.36 mmol) und Kaliumcarbonat (1.26 g, 9.09 mmol, wasserfrei, fein vermahlen) werden als in absolutem Acetonitril (10 mL) 24 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

150

Das Reaktionsgemisch wird filtriert, das Lösungsmittel abgezogen und der Rückstand säulenchromatographisch gereinigt (150 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak : 96.5 : 3 : 0.5), wodurch das Produkt als farbloser Schaum erhalten wird (1.21 g, 2.32 mmol, 77.6 %)

DC: Chloroform : Methanol : Ammoniak : 89.5 : 10 : 0.5,  $R_f = 0.65$

$^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  7.14 (s, 1H), 6.83 (s, 1H), 6.67-6.52 (m, 2H), 6.12-5.90 (m, 2H), 4.57 (b, 1H), 4.02-4.18 (m, 2H), 3.93 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.75 (d,  $J=13.7$  Hz, 1H), 3.43-3.06 (m, 3H), 2.75-2.35 (m, 5H), 2.11-1.83 (m, 3H), 1.59-1.29 (m, 6H);


155

$^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  207.5 (s), 155.4 (s), 149.3 (s), 148.9 (s), 145.7 (s), 144.0 (s), 133.1 (s), 129.4 (s), 127.5 (d), 126.9 (d), 121.9 (d), 111.1 (d), 107.3 (d), 104.2 (d), 88.6 (d), 62.0 (d), 57.7 (t), 56.1 (q), 56.0 (q), 55.8 (q), 51.5 (t), 51.2 (t), 48.3 (t), 47.5 (d), 32.8 (t), 32.5 (t), 31.5 (t), 29.9 (t), 27.4 (t), 25.1 (t)

### Beispiel 7:

Stufe 1: 2-(5-Brompentyl)-5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-carbon-säuremethylester

165



180

190

195

200

205 (Natriumsulfat/Aktivkohle) und kristallisiert den nach Eindampfen erhaltenen Rückstand aus tert.-Butylmethylether (10 mL) um. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (1.78 g, 5.22 mmol, 69.5 %)

DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 3 : 1; R<sub>f</sub> = 0.2

Schmp.: 67.5 – 68.5 °C


210 <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.15 (s, 1H), 6.85 (s, 1H), 3.95 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 3.50 (t, J=7.0 Hz, 2H), 3.20 (dd, J=6.4 Hz, J=9.5 Hz, 1H), 2.72 (d, J=3.2 Hz, 1H), 2.60 (d, J=3.2 Hz, 1H), 2.00-1.65 (m, 3H), 1.55-1.35 (m, 5H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 207.4 (s), 155.5 (s), 149.4 (s), 148.8 (s), 129.4 (s), 107.4 (d), 104.3 (d), 56.2 (q), 56.0 (q), 47.5 (d), 44.9 (t), 32.5 (t), 32.3 (t), 31.4 (t), 26.8 (t), 26.5 (t)

215

Stufe 3:

2-[5-[(4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-benzofuro[3a,3,2-e,f][2]benzazepin-11-yl]pentyl]-5,6-dimethoxyindan-1-on (SPH-1359)



C<sub>16</sub>H<sub>21</sub>BrO<sub>3</sub>

341.25 g/mol

C<sub>32</sub>H<sub>39</sub>NO<sub>6</sub>

533.67 g/mol

220

2-(4-Bromopentyl)-5,6-dimethoxyindan-1-on (1.66 g, 4.86 mmol), Norgalanthamin (1.46 g, 5.35 mmol) und Kaliumcarbonat (2.01 g, 14.6 mmol, wasserfrei, fein vermahlen) werden als in absolutem Acetonitril (10 mL) 24 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

Das Reaktionsgemisch wird filtriert, das Lösungsmittel abgezogen und der Rückstand säulenchromatographisch gereinigt (150 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak : 96.5 : 3 : 0.5), wodurch das Produkt als farbloser Schaum erhalten wird (1.84 g, 2.32 mmol, 70.9 %)

DC: Chloroform : Methanol : Ammoniak : 89.5 : 10 : 0.5, R<sub>f</sub> = 0.65

230 <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.11 (s, 1H), 6.82 (s, 1H), 6.63-6.54 (m, 2H), 6.10-5.88 (m, 2H), 4.55 (b, 1H), 4.17-4.00 (m, 2H), 3.92 (s, 3H), 3.85 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.73 (d, J=13.7 Hz, 1H), 3.40-3.01 (m, 3H), 2.72-2.25 (m, 5H), 2.10-1.75 (m, 3H), 1.65-1.19 (m, 8H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 207.4 (s), 155.3 (s), 149.2 (s), 148.8 (s), 145.6 (s), 143.8 (s), 133.0 (s), 129.4 (s), 129.3 (s), 127.4 (d), 126.9 (d), 121.8 (d), 111.0 (d), 107.2 (d), 104.2 (d), 88.5 (d), 77.2 (d), 61.9 (d), 57.6 (t), 56.0 (q), 55.9 (q), 55.7 (q), 51.4 (t), 48.2 (s), 47.5 (d), 32.9 (t), 32.4 (t), 31.5 (t), 29.8 (t), 27.2

235 (t), 27.1 (t)

Herstellung des Fumarats

Eine Lösung der Base (1.00, 1.874 mmol) in gesättigter Fumarsäurelösung (6 mL, ca. 0.5 M in 95% Ethanol) wird bei ca. 60°C bis zum Erreichen einer klaren Lösung erwärmt und diese

- 250

255

**8a-8ac:** (+)-Galanthamin Derivate  
**9a-9e:** (1)-Galanthamin Derivate

Beispiel	Nr.	SPH	BATCH LABCODE	R1
8	3bi	SPH-1218	CB 30	-C(SMe)=NCN
9	4a	SPH-1229	CB 52	-pyrimidine-(2-yl)
10	4b	SPH-1234	CB 56	-2-Cl-pyrimidine-(4-yl)
11	4c	SPH-1245	CB 59	-2-NEt2-pyrimidine-(4yl)
12	4d	SPH-1244	CB 57	-2-O(CH2)3NMe2-pyrimidine-(4-yl)
13	4e	SPH-1230	CB 53	-4,6-Cl-1,3,5-triazine-(2-yl)
14	4f	SPH-1243	CB 58	4,6-di(NEt2)-1,3,5-triazine-(2-yl)
15	4g	SPH-1228	CB 43	-4,6-OPh-1,3,5-triazine-(2yl)
16	4h	SPH-1233	CB 51	-4,6-di(O(CH2)2NH2)-1,3,5-triazine-(2-yl)
17	4i	SPH-1242	CB 55	4,6-di(O(CH2)3NMe2)-1,3,5-triazine-(2-yl)
18	4j	SPH-1246	MR 16	-CO-CH2Cl
19	4l	SPH-1214	CB 34	-CO-NHCH(Me)2
20	4m	SPH-1221	CB 45	-CO-NHC(Me)3
21	4n	SPH-1231	CB 49	-CONHEt
22	4o	SPH-1222	CB 46	-CONH-cyclohexane
23	4p	SPH-1215	CB 33	-CONHPh
24	4q	SPH-1237	CB 47	-CONH-Ph(4-Cl)
25	4r	SPH-1267	CB 73	-CO-NH-CH(Me)Ph, S-(-)
26	4s	SPH-1232	CB 50	-CONH-2-naphthaline
27	4t	SPH-1211	CB 13	-CSNHMe
28	4u	SPH-1236	CB 48	-CSNHCH2CH=CH2
29	4v	SPH-1259	HM 59	-C(COOMe)=CHCOOMe
30		SPH-1196	TK 36-2	-(CH2)3-(2-(4-F-phenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane)-5-yl)
31	4x	SPH-1219	CB 36	-CH=C(CN)2
32	4y	SPH-1278	HM 60	CH=C(COOMe)2
33	4z	SPH-1264	HM 58	-CH=CHCOCH2OEt
34	4ac	SPH-1248	MR 7	-CH2-COOEt
37	4af	SPH-1116	Ja 6-2	-(CH2)2-NH2
40	4ai	SPH-1217	CB 28	-(CH2)2-COOEt
41	4aj	SPH-1277	HM 57	-(CH2)2-COOC(Me)3
42	4ak	SPH-1262	MR 14	-(CH2)2-CONHCHMe2
43	4ab	SPH-1102	TK 72/5	-CH2-CH=CH2
43	4al	SPH-1249	MR 13	-(CH2)2-CONHCMe3
44	4am	SPH-1216	CB 35	-(CH2)2-CN
45	4an	SPH-1220	CB 41	-(CH2)3-OH
46	4aa	SPH-1103	TK 74/3	-Bn
46	4ao	SPH-1235	CB 42	-(CH2)3-NH2
47	4ap	SPH-1107	TK 94/3	-(CH2)3-N-piperidine
48	8a	SPH-1280	CB 98	-Ph
49	8b	SPH-1282	CB 100	-thiophene-2yl
50	8c	SPH-1327	WO 2	-(N-benzoyl)-4-piperidine
51	8e	SPH-1296	CB 147	-COOPh
52	8f	SPH-1328	CB 161	-C(=S)OPh
53	8g	SPH-1292	CB 112	-Fmoc
54	8h	SPH-1326	CB 171	-CO-(CH2)2-CH=CH2
55	8i	SPH-1268	CB 78	-CONH2
56	8j	SPH-1287	HM 109	-CSNHMe
57	8k	SPH-1269	CB 85	-CO-NHCH(Me)2
58	8l	SPH-1270	CB 86	-CO-NHC(Me)3
59	8m	SPH-1266	CB 75	-CONH-Ph(2-CF3)
60	8n	SPH-1272	CB 81	-C(SMe)=NCN

61	8o	SPH-1289	HM 117	-CH <sub>2</sub> -cyclopropane
63	8r	SPH-1295	BM 1	-CH <sub>2</sub> -CN
64	8s	SPH-1314	DD 18	-CH <sub>2</sub> -CO-(2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane)-5-yl
65	8t	SPH-1311	BM 4	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -NH <sub>2</sub>
66	8u	SPH-1117	Ro21 CB120	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -N-morpholine
67	8v	SPH-1329	DD 26	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -(2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane)-5-yl
68	8w	SPH-1276	CB 89	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COOH
69	4ae	SPH-1096	TK 81/3	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -OH
69	8x	SPH-1271	CB 87	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -COOC(Me) <sub>3</sub>
70	8z	SPH-1315		-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -OH
71	8aa	SPH-1213	TK 96/3	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -NMe <sub>2</sub>
72	4k	SPH-1104	Ro 20	CO(CH <sub>2</sub> ) <sub>14</sub> Me
72	8ab	SPH-1286	HM 113	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -N-piperidine
73	4ad	SPH-1099	TK 80-3	-CH <sub>2</sub> -CN
73	8ac	SPH-1312	DD 24	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -(2-(4-F-phenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane)-5-yl
74	4ag	SPH-1098	Ro 11	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -N-morpholine
75	9a	SPH-1284	DD 10	-CO-NHCH(Me) <sub>2</sub>
76	9b	SPH-1283	DD 9	-CO-NHC(Me) <sub>3</sub>
77	9c	SPH-1118	Ro 22	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -N-morpholine
78	9d	SPH-1330	RMA-15	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -NMe <sub>2</sub>
79	9e	SPH-1333	RMA 14	-(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> -N-piperidine

#### Beispiel 8:

265 Schritt 1  
(6R)-1-Bromo-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepin-6-on  
(2a)

Zu einer gerührten Lösung von (6R)-5,6,9,10,11,12,1-bromo-3-methoxy-6-oxo-4aH-hexahydro-benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepin-11(12H)-carboxaldehyd (2) (100.0 g, 0.26 mol) in Toluol (2.6 l) Wasser (660 ml) und konzentrierter Salzsäure (400 ml) wurden hinzugefügt. Das Reaktionsgemisch wurde unter Rühren 48 Stunden lang rückflußgekocht. Der Niederschlag wurde abfiltriert mit Wasser (3 x 500 ml) gewaschen. Die Phasen des Hydrates wurden getrennt und die organische Phase mit Wasser (3 x 500 ml) extrahiert. Der Niederschlag wurde mit den vereinigten, wäßrigen Lösungen des Hydrates erhitzt und heißfiltriert. Die Lösung wurde mit 30%igem Natriumhydroxid auf pH = 12 eingestellt. Der Niederschlag wurde filtriert und getrocknet (50°C/50 mbar), um 64.5 g (70%) der Titelverbindung (2a), um einen Schmelzpunkt von 228-231°C zu erhalten. <sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 6.94 (dd, J<sub>1</sub> = 10.3, 1.9 Hz, 1H), 6.62 (s, 1H), 6.00 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 4.69 (m, 1H), 4.04 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 3.83 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.29 (m, 2H), 3.07 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 2.70 (dd, J<sub>1</sub> = 17.8 Hz, J<sub>2</sub> = 3.7 Hz, 1H), 2.16 (m, 1H), 1.80 (dt, J<sub>1</sub> = 14.0 Hz, J<sub>2</sub> = 2.9 Hz, 1H); <sup>13</sup>C-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 194.3 (s), 146.9 (s), 143.8 (s), 135.3 (d), 130.6 (s), 129.3 (s), 126.9 (d), 121.9 (d), 111.8 (s), 87.9 (d), 56.3 (t), 55.9 (q), 51.8 (t), 49.0 (s), 37.2 (t), 33.0 (t). Anal. (C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>BrNO<sub>3</sub>·0.4 H<sub>2</sub>O) C, H, N.

#### Schritt 2:

285 (6R)-1-Bromo-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepin-6-ol



(3)

290 Zu einer Lösung von (6R)-1-Bromo-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-  
 ef][2]benzazepin-6-on (2a) (64.5 g, 0.184 mol) in trockenem THF (1.3 l) wurde eine L-  
 Selektidlösung (1M, 276 ml, 0.276 mol) bei -10°C zugegeben. Nach 30-minütigem Rühren bei -10  
 bis -5°C wurde das Reaktionsgemisch mit MeOH (80 ml) hydrolysiert und eingeeengt. Der  
 erhaltene Rückstand wurde in 2 N-Salzsäure aufgelöst und 18 h bei Raumtemperatur gerührt. Die  
 295 Lösung wurde mit konzentriertem Ammoniak auf pH = 9 eingestellt und mit EtOAc (3 x 500 ml)  
 extrahiert, die vereinigten, organischen Schichten wurden mit Brine gewaschen und getrocknet  
 (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), um 55.9 g (90.6%) des Produktes zu ergeben. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 6.85 (s, 1H), 6.05 (m,  
 2H), 4.56 (b, 1H), 4.48 (d, J = 14.7 Hz, 1H), 4.10 (m, 1H), 3.85 (d, J = 14.7 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.35-  
 3.05 (m, 2H), 2.62 (m, 1H), 2.25 (m, 1H), 1.98 (d, J = 13.2 Hz, 1H), 1.85-1.65 (m, 2H); <sup>13</sup>C-NMR  
 (CDCl<sub>3</sub>) δ 145.8 (s), 144.0 (s), 134.1 (s), 131.6 (s), 127.9 (d), 126.8 (d), 115.5 (d), 113.0 (s), 88.4 (d),  
 300 61.7 (d), 56.0 (q), 52.7 (t), 49.3 (s), 46.6 (t), 29.7 (t).

Schritt 3:

(6R)-3-Methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (= +/-  
 Norgalanthamin) (4)

305

310 Zu einer Lösung von (6R)-1-Bromo-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-  
 ef][2]benzazepin-6-ol (3) (20.0 g, 56.8 mmol) in 50% EtOH (1000 ml) wurde aktiviertes Zink (89.0 g,  
 1.36 mol) und Kalziumchlorid (44.0 g, 0.40 mol) hinzugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 18 h  
 lang rückflußgekocht und über Zelite filtriert. Das Filtrat wurde eingeeengt, der Rückstand mit 2N-  
 Salzsäure (500 ml) verdünnt und mit EtOAc (3 x 400 ml) extrahiert. Der pH-Wert der wäßrigen  
 315 Phase wurde mit konzentriertem Ammoniak auf über 8.5 eingestellt und mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (3 x 100 ml)  
 und mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>:MeOH = 9:1 (3 x 100 ml) extrahiert. Die vereinigten, organischen Extrakte wurden  
 mit Brine (200 ml) gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) und eingeeengt, um 12.3 g (79.0%) der  
 Verbindung 4 zu ergeben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 6.62 (b, 2H), 6.02 (m, 2H), 4.61 (b, 1H), 4.14 (t, J = 4.3  
 Hz, 1H), 3.98 (d, J = 5.0 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H), 3.30 (m, 1H), 2.69 (t, J = 15.7, 1H), 2.10-1.63 (m, 4H);  
 320 <sup>13</sup>C-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 146.2 (s), 144.1 (s), 133.1 (s), 131.7 (s), 127.8 (d), 126.8 (d), 120.8 (d), 111.1 (d),  
 88.4 (d), 61.9 (d), 55.9 (q), 53.3 (t), 48.5 (s), 46.7 (t), 39.4 (t), 29.9 (t). Anal. (C<sub>20</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)C, H, N.

Schritt 4:

Methyl (6R)-1-Bromo-N<sup>11</sup>-cyano-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-  
 325 4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-11(12H)carboximidothioat (3bi)

330

Zu einer Lösung von (+/-)-Norgalanthamin (0.5 g, 1.4 mmol) in EtOH:DMF = 4:1 (20 ml) wurden 0.21 g, 1.4 mmol) N-cyanodithiocarbonimidessäuredimethylester (0.21 g, 1.4 mmol) hinzugefügt. Das Reaktionsgemisch wurde 4 Tage rückflußgekocht und eingengt. Der Rückstand wurde in EtOH kristallisiert, um 0.25 g (41.7%) der Verbindung 3bi zu ergeben:  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$ :  $\delta$  6.90 (s, 1H), 6.05 (dd,  $J_1 = 10.3$  Hz,  $J_2 = 5.0$  Hz, 1H), 5.86 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1H), 5.62 (d,  $J = 16.5$  Hz, 1H), 4.62 (b, 1H), 4.36 (d,  $J = 16.5$ , 1H), 4.14 (m, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.79 (m, 1H), 2.96 (d,  $J = 15.3$  Hz, 1H), 2.77 (s, 3H), 2.68 (m, 1H), 1.92 (m, 3H);  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$ :  $\delta$  146.3 (s), 145.0 (s), 132.7 (s), 129.0 (s), 125.4 (d), 125.2 (d), 125.2 (s), 116.0 (d), 114.3 (d), 88.0 (d), 61.3 (d), 56.1 (q), 55.0 (t), 49.6 (t), 48.6 (s), 29.4 (t), 16.1 (q). Anal. ( $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{BrN}_3\text{O}_3 \cdot 0.85 \text{ EtOH}$ ) C, H, N.

#### Beispiel 9:

(6R)-3-Methoxy-11-(2-pyrimidinyl)-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepin-6-ol (4a)

Zu einer Lösung von (+/-)-Norgalanthamin (0.5 g 1.8 mmol) in EtOH (30 ml) wurden 0.21 g, 1.8 mmol) 2-Chlorpyrimidin und Natriumhydrogencarbonat (0.61 g, 7.2 mmol) hinzugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 2 Tage rückflußgekocht und konzentriert. Der Rückstand wurde mit Wasser (30 ml) verdünnt und EtOAc (3 x 20 ml) extrahiert. Die vereinigten, organischen Extrakte wurden mit Kochsalzlösung gewaschen (20 ml), getrocknet ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) und eingengt, um 0.51 g (80.8%) von 4a zu ergeben:  $^1\text{H-NMR}(\text{DMSO}-d)$   $\delta$  7.82 (d,  $J = 4.0$  Hz, 2H), 6.42 (d,  $J = 12.0$  Hz 1H), 6.23 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 6.03 (t,  $J = 4.0$  Hz, 1H), 5.83 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 5.54 (dd,  $J_1 = 8.0$  Hz,  $J_2 = 3.0$  Hz, 1H), 4.98 (d,  $J = 14.0$  Hz, 1H), 4.28 (d,  $J = 16.0$ , 1H), 4.09 (b, 1H), 3.94 (d,  $J = 14.0$  Hz, 1H), 3.72 (m, 1H), 3.38 (s, 3H), 3.21 (t,  $J = 14.0$  Hz, 1H), 2.54 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 2.15 (m, 1H), 1.55 (m, 3H),  $^{13}\text{C-NMR}(\text{DMSO}-d)$   $\delta$  159.5 (s), 156.7 (2), 145.5 (s), 142.8 (s), 131.6 (s), 128.9 (s), 126.8 (d), 126.1 (d), 120.8 (d), 109.9 (d), 108.8 (d), 86.8 (d), 61.3 (d), 54.8 (q), 50.2 (t), 47.3 (s), 47.4 (t), 34.6 (t), 29.2 (t). Anal. ( $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_3 \cdot 0.15 \text{ EtOH}$ ) C, H, N.

#### Beispiel 10:

(6R)-11-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepin-6-ol (4b) wurde analog Beispiel 9 hergestellt. Reaktionszeit 40 h, Ausbeute 0.62 g (88.6%).  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  7.84 (d,  $J = 4.0$  Hz, 1H), 6.88 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 6.69 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 6.05 (b, 2H), 5.90 (d,  $J = 4.0$  Hz, 1H), 5.58 (b, 1H), 4.34 (m, 2H), 4.18 (b, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.60 (t,  $J = 16.0$  Hz, 1H), 2.73 (d,  $J = 16.0$  Hz, 1H), 2.39 (m, 1H), 2.04 (d,  $J = 18$  Hz, 1H), 1.87 (m, 2H);  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  160.5 (s), 158.4 (s), 157.0 (s), 145.0 (s), 144.1 (s), 132.2 (s), 128.2 (d), 127.8 (s), 126.6 (d), 126.1 (d), 111.0 (d), 107.1 (d), 88.1 (d), 61.6 (d), 55.8 (q), 53.8 (t), 48.3 (s), 46.0 (t), 34.9 (t), 29.6 (t).

#### Beispiel 11:

(6R)-11-(2-Diethylamino)-4-pyrimidinyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-

370 [1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4c).

Zu einer Lösung von Verbindung 4b (0.5 g, 1.30 mmol) in Diethylamin (6 ml, 57.6 mmol) wurde 0.1 g (1.30 mmol) Kaliumhydroxyd hinzugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 22 h rückflußgekocht und eingeeengt. Der Rückstand wurde mit gesättigter Lösung von  
375 Kaliumkarbonat (30 ml) verdünnt und mit EtOAc (3 x 20 ml) extrahiert. Die vereinigten, organischen Phasen wurden mit Kochsalzlösung gewaschen (20 ml), getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) und eingeeengt. Flashchromatographie ergab 0.21 g (38.5%) von 4c. Nachstehend sind nur die unterschiedlichen NMR-Signale beschrieben: <sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 2.97 (d, J = 16.0 Hz, 4H), 1.34 (m, 6H); <sup>13</sup>C-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 36.3 (t), 14.0 (q).

380

#### Beispiel 12:

(6R)-11-(2-(3-(Dimethylamino)propoxy)-4-pyrimidinyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4d): Die Herstellung erfolgte analog Beispiel 11. Reaktionszeit 2 h, Ausbeute 0.16 g (41.0%). Es werden nur die unterschiedlichen NMR-Signale  
385 beschrieben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 4.34 (m, 2H), 2.28 (s, 6H), 2.00 (m, 4H); <sup>13</sup>C-NMR(CDCl<sub>3</sub>) 65.0 (t), 56.3 (t), 45.2 (q), 27.0 (t).

#### Beispiel 13:


(6R)-11-(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4e): Eine Lösung von 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazin (0.66 g, 3.7 mmol) in Aceton (16 ml) wurde auf Eiswasser (35 ml) gegossen und bei 0°C (+/-)-  
390 Norgalanthamin (1.0 g, 3.7 mmol) in kleinen Teilen zugegeben. Nach Zugabe von 2N-Natriumhydroxyd (2ml) wurde das Reaktionsgemisch 40 h lang rückflußgekocht. Die wäßrige Phase wurde mit EtOAc (3 x 30 ml) extrahiert. Die vereinigten, organischen Phasen wurden mit  
395 Kochsalzlösung (30 ml) gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) und eingeeengt, um 0.90 g (59.5%) der Verbindung 4e zu ergeben: <sup>1</sup>H-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 6.82 (d, J = 10.0 Hz, 1H), 6.63 (d, J = 10.0 Hz, 1H), 6.02 (b, 2H), 5.30 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 4.75 (d, J = 16.0, 1H), 4.50 (b, 1H), 4.22 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 4.11 (b, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.59 (m, 1H), 3.06 (m, 1H), 2.61 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 1.90 (m, 3H); <sup>13</sup>C-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 207.0 (s) 171.2 (s), 163.7 (s), 146.2 (s), 143.9 (s), 132.3 (d), 129.5 (s), 127.6 (s), 126.7  
400 (d), 121.5 (d), 110.8 (d), 88.0 (d), 61.7 (d), 55.7 (q), 51.8 (t), 48.2 (s), 43.4 (t), 35.9 (t), 29.7 (t).

Die Verbindungen 4f - 4i enthalten das grundlegende Galanthamingerüst wie 4e, unterscheiden sich aber im Stickstoffsubstituenten. Da das Proton und Kohlenstoffsignal des Galanthaminkerns sich nicht wesentlich unterscheiden, werden nachstehend die NMR-Signale des Stickstoffsubstituenten wiedergegeben.

405

#### Beispiel 14:

(6R)-11-[4,6-Bis-(diethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4f): Eine Lösung von Verbindung 4e (0.30 g, 0.71 mmol) in 40 ml Aceton wurde auf 100 ml Eiswasser gegossen und bei 0°C eine Lösung von  
410 Diethylamin (5.7 ml, 54.7 mmol) in Aceton (10 ml) hinzugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 2 h lang rückflußgekocht und dann auf 200 ml Eiswasser gegossen. Die wäßrige Phase wurde mit 3



x 100 ml EtOAc extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit Kochsalzlösung (100 ml) gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Flashchromatographie ergab 0.17 g (47.8%) der Verbindung 4f:  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  3.54 (m, 8H), 1.18 (m, 12H);  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  41.7 (t), 13.4 (q).

#### Beispiel 15:

(6R)-11-(4,6-Diphenoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4g): Zu einer Lösung von (+/-)-Norgalanthamin (1.0 g, 3.74 mmol) in Dioxan (60 ml) wurden 6.5 g (18.3 mmol) 2,4,6-triphenoxy-1,3,5-triazin zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 20 h lang rückflußgekocht. Der Niederschlag wurde abfiltriert und mit Dioxan gewaschen. Das Filtrat wurde eingeeengt und Flashchromatographie ergab 0.91 g (45.9%) der Verbindung 4g:  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  7.42-7.03 (m, 10H);  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  172.1 und 162.3 (s), 138.3 und 138.1 (d), 134.6 (d), 131.3 und 130.8 (d).

#### Beispiel 16:

(6R)-11-(4,6-Bis-(2-aminoethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4h): Nach der in Beispiel 11 angegebenen Arbeitsweise wurde die Verbindung hergestellt, wobei die Reaktionszeit 3 h betrug. Man erhielt 0.15 g (67.9%) der Verbindung 4h:  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  3.64 (m, 4H), 3.42 (m, 4H);  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  61.3 (t), 42.1 (t).

#### Beispiel 17:

(6R)-11-(4,6-Bis-(2-(dimethylamino)ethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4i). Nach der in Beispiel 11 angegebenen Arbeitsweise wurde bei einer Reaktionszeit von 3 h die Verbindung 4i in einer Ausbeute von 0.16 g (59.5%) erhalten:  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  4.12 (q, J = 6.0 Hz, 4H), 2.29 (d, J = 4.0 Hz, 12H), 1.29 (m, 8H);  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  65.6 (t), 56.0 (t), 45.2 (q), 29.2 (t).

#### Beispiel 18:

2-Chloro-1-((6R)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)-1-ethanon (4j): Zu einer Lösung von (+/-)-Norgalanthamin (2.0 g, 7.3 mmol) in trockenem TRF (100 ml) wurden 0.82 g Chloracetylchlorid (7.3 mmol) und 0.81 g (8.0 mmol) Triethylamin zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 3 h lang rückflußgekocht und eingeeengt. Der Rückstand wurde mit 2N Salzsäure (100 ml) verdünnt und mit EtOAc (3 x 75 ml) extrahiert. Die wäßrige Phase wurde auf pH > 8.5 mit konzentriertem Ammoniak eingestellt und mit 3 x 75 ml  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  extrahiert. Die vereinigten, organischen Phasen wurden mit Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Flashchromatographie ergab 0.20 g (7.7% der Verbindung 4j):  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  6.78 (b, 1H), 6.12 (m, 2H), 5.30 (d, J = 11.0 Hz, 1H), 4.65 (m, 2H), 4.32-4.01 (m, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.59 (m, 1H), 3.06 (m, 1H), 2.61 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 1.90 (m, 3H),  $^{13}\text{C-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  166.0 (s), 146.2 (s), 144.9 (s), 132.3 (d), 128.3 (s), 127.3 (s), 126.0 (d), 120.2 (d), 111.2 (d), 88.2 (d), 61.7 (d), 55.8 (q), 52.8 (t), 48.1 (s), 45.5 (t), 41.4 (t), 35.4 (t), 29.6 (t).

#### Beispiel 19:

(6R)-6-Hydroxy-N<sup>11</sup>-isopropyl-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxamid (4l): Nach der in Beispiel 11 angegebenen Arbeitsweise wurde bei einer Reaktionszeit von 4 h 0.50 g der Verbindung 4h mit einem Schmelzpunkt von 106-108°C erhalten:  $^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$   $\delta$  6.68 (dd, J = 10.3; 8.3 Hz, 2H), 6.00 (m, 2H), 4.59 (b, 1H), 4.47



(d, J = 16.4 Hz, 1H), 4.31 (d, J = 16.4, 1H), 4.16 (m, 1H), 3.86 (m, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.36 (dt, J = 12.6; 2.0 Hz, 1H), 2.69 (dd, J = 15.7; 3.4 Hz, 1H), 2.28 (d, J = 11.3 Hz, 1H), 2.02 (m, 1H), 1.88 (dd, J = 12.3; 3.4 Hz, 1H), 1.77 (m, 1H), 1.07 (dd, J = 21.8; 6.4 Hz, 6H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 156.4 (s), 146.8 (s), 144.5 (s), 132.4 (s), 129.0 (s), 127.9 (d), 126.4 (d), 120.1 (d), 111.0 (d), 88.3 (d), 61.7 (d), 55.8 (q), 51.5 (t), 48.3 (s), 45.4 (t), 42.4 (d), 36.4 (t), 29.7 (t), 23.3 (q), 23.1 (q). Anal. (C<sub>20</sub>H<sub>26</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) C, H, N.

Die Verbindungen 4m - 4s enthalten das GalanthaminGrundgerüst wie 4l, unterscheiden sich aber hinsichtlich des Stickstoffsubstituenten. Da die Proton- und Kohlenstoffsignale des GalanthaminKerns sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden, sind nur die Signale des Stickstoffsubstituenten nachstehend wiedergegeben.

#### Beispiel 20:

(6R)-N<sup>11</sup>-t-Butyl-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepine-11(12H)-carboxamide (4m): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 3 h, Ausbeute 0.57 g (85%); Schmelzpunkt 204-205°C; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 1.24 (s, 9H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 156.4 (s), 50.7 (s), 29.3 (q). Anal. (C<sub>21</sub>H<sub>28</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) C, H, N.

#### Beispiel 21:

(6R)-N<sup>11</sup>-Ethyl-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepine-11(12H)-carboxamide (4n): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 3 h, Ausbeute 0.61 g (98%); Schmelzpunkt 137-139°C; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 3.14 (q, J = 4.0 Hz, 2H), 1.04 (t, J = 10 Hz, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 157.0 (s), 35.6 (t), 15.3 (q).

#### Beispiel 22:

(6R)-N<sup>11</sup>-Cyclohexyl-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepine-11-(12H)-carboxamide (4o): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 5 h, Ausbeute 0.56 g (79%); Schmelzpunkt 225-228°C; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 1.24 (s, 9H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 48.8 (d), 33.4 (t), 33.2 (t), 25.5 (t), 24.8 (t), 24.6 (t).

#### Beispiel 23:

(6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-phenyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepine-11-(12H)-carboxamide (4p): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 4 h, Ausbeute 0.34 g (47%); Schmelzpunkt 198-199°C; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.24 (m, 4H), 6.99 (q, J = 4.2 Hz, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 154.5 (s), 138.7 (s), 128.7 (d), 122.9 (d), 119.7 (d). Anal. (C<sub>23</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>·H<sub>2</sub>O) C, H, N.

#### Beispiel 24:

(6R)-N<sup>11</sup>-4-Chlorophenyl-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepine-11-(12H)-carboxamide (4q): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 5 h, Ausbeute 0.16 g (21%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.49-6.94 (m, 4H); <sup>13</sup>C-NMR δ (CDCl<sub>3</sub>) 154.1 (s), 139.1 (s), 123.4 (s), 122.9 (d), 119.7 (d).

#### Beispiel 25:

(6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-(S)-(-)-α-methylbenzyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepine-11-(12H)-carboxamide (4r): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 6 h, Ausbeute 0.66 g (58%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.21 (d, J = 6.0 Hz, 4H), 7.17 (m, 1H), 4.91 (m, 1H), 1.41 (dd, J = 20.0; 12 Hz, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 156.6 und 165.4 (s), 144.5 (s), 128.3 und 128.1 (d), 126.5 und 126.4 (d), 125.9 und 125.5 (d), 46.1 (d), 22.9 und 22.6 (q).

#### Beispiel 26:

(6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-(S)-(-)- $\alpha$ -methylbenzyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-11-(12H)-carboxamide (4s): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 6 h, Ausbeute 0.66 g (58%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  7.82 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.61 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 7.43 (m, 4H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  155.4 (s), 134.0 (s), 133.6 (s), 132.5 (s), 128.6 (d), 127.9 (d), 125.9 (d), 125.7 (d), 125.6 (d), 125.6 (d), 121.1 (d).

**Beispiel 27:**

(6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-methyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-11-(12H)-carboxamide (4t): Verfahren gemäß Beispiel 11, Reaktionszeit 3 h, Ausbeute 0.57 g (99%); Schmelzpunkt 219-221°C; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  6.81 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 6.71 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 6.12 (d, J = 10.3 Hz, 1H), 5.81 (dd, J = 10.2; 4.4 Hz, 1H), 5.21 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 4.44 (s, 1H), 4.25 (d, J = 5.5, 1H), 4.07 (b, 1H), 3.72 (s, 3H), 3.66 (m, 1H), 2.84 (d, J = 3.4 Hz, 3H); 2.28 (d, J = 11.2 Hz, 1H), 2.04 (d, J = 20.1 Hz, 1H), 1.88 (d, J = 12.1 Hz, 1H), 1.65 (d, J = 13.9 Hz, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  182.2 (s), 147.2 (b), 144.9 (s), 132.4 (s), 128.2 (d), 126.6 (s), 126.2 (d), 120.5 (d), 111.3 (d), 88.3 (d), 61.7 (d), 55.9 (q), 53.7 (t), 50.5 (t), 48.2 (s), 35.6 (t), 32.9 (q), 29.7 (t). Anal. (C<sub>18</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>·0.05 CH<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>) C, H, N.

**Beispiel 28:**

(6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-allyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-11-(12H)-carbothioamide (4u): Verfahren nach Beispiel 11, Reaktionszeit 5 h, Ausbeute 0.47 g (70%); Schmelzpunkt 192-194°C; gleiches Gerüst wie 47, nur die unterschiedlichen NMR-Signale werden wiedergegeben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  6.85 (m, 1H), 5.13 (m, 2H), 4.14 (m, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  181.2 (s), 133.7 (d), 116.6 (t), 48.3 (t). Anal. (C<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>S) C, H, N.

**Beispiel 29:**

((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11-(12H)-yl-fumaraciddimethylester (4v): Verfahren nach Beispiel 11. Zu einer Lösung von (+/-)-Norgalanthamin (0.5 g, 1.74 mmol) in 40 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wurden 0.37 g (2.61 mmol) But-2-enedionsäuredimethylester zugegeben und 20 h lang gerührt. Das Lösungsmittel wurde entfernt, um ein öliges Produkt zu erhalten, dessen Flashchromatographie 0.28 g (39.1 %) von 4v ergab. Schmelzpunkt 112-115°C, <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  6.63 (dd, J<sub>1</sub> = 12.6 Hz, J<sub>2</sub> = 8.1 Hz, 2H), 6.02 (dd, J<sub>1</sub> = 15.9 Hz, J<sub>2</sub> = 11.5 Hz, 2H), 4.77 (b, 1H), 4.59 (b, 1H), 4.22 (d, J = 15.9, 1H), 4.13 (b, 1H), 3.92 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.72 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 3.59 (s, 3H); 3.46 (m, 1H), 3.19 (dt, J<sub>1</sub> = 15.1 Hz, J<sub>2</sub> = 3.1 Hz, 3H), 2.68 (dd, J<sub>1</sub> = 15.8 Hz, J<sub>2</sub> = 2.2 Hz, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.54 (m, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  167.6 und 165.7 (s), 153.0 (s), 146.0 (s), 144.3 (s), 132.9 (s), 128.5 (s), 127.8 (d), 126.4 (d), 121.8 (d), 111.2 (d), 88.6 (d), 86.6 (d), 61.9 (d), 56.9 (t), 55.8 (q), 55.0 (q), 50.2 (q), 48.3 (s), 33.0 (t), 29.8 (t). Anal. (C<sub>22</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>7</sub>) C, H, N.

**Beispiel 30:**

(6R)-11-(3-(2-(4-Fluor)phenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-5-yl-propyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4w): Verfahren nach Beispiel 11, Reaktionszeit 4 d, Ausbeute 0.14 g (63.0%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  7.21 (m, 2H); 6.68 (m, 3H), 5.0 (s, 1H), 4.47 (d, J = 14.0 Hz, 1H), 3.90 (m, 1H), 3.63 (m, 3H), 3.24 (m, 1H), 2.04 (m, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  168.0 und 167.6 (s), 146.4 (d), 144.1 (s), 127.7 und 127.5 (d), 112.5 und 112.4 (d), 67.0 (t), 57.0 und 56.8 (d), 56.8 und 56.6 (t), 51.8 und 51.6 (t), 36.6 (t); 33.7 und 33.6 (t).

**Beispiel 31:**

2-((6R)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-ylmethylene)-malononitrile (4x): Verfahren nach Beispiel 11, Reaktionszeit 6 h, Ausbeute 0.41 g (64.8%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.12 (m, 1H), 6.63 (dd, J<sub>1</sub> = 12.6 Hz, J<sub>2</sub> = 8.1 Hz, 2H), 6.02 (dd, J<sub>1</sub> = 15.9 Hz, J<sub>2</sub> = 11.5 Hz, 2H), 4.59 (b, 1H), 4.22 (d, J = 15.9, 1H), 4.13 (b, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.72 (d, J = 15.9 Hz, 1H), 3.46 (m, 1H), 3.19 (dt, J<sub>1</sub> = 15.1 Hz, J<sub>2</sub> = 3.1 Hz, 3H), 2.68 (dd, J<sub>1</sub> = 15.8 Hz, J<sub>2</sub> = 2.2 Hz, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.54 (m, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 157.2 und 156.8 (d), 146.0 (s), 144.3 (s), 132.9 (s), 128.5 (s), 127.8 (d), 126.4 (d), 124.2 (s), 121.8 (d), 116.8 und 116.5 (s), 115.0 und 114.7 (s), 111.2 (d), 88.6 (d), 61.9 (d), 56.9 (t), 55.8 (q), 48.3 (s), 33.0 (t), 29.8 (t).

**Beispiel 32:**

2-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-ylmethylene)-malonoaciddiethylester (4y): Verfahren nach Beispiel 11, Reaktionszeit 21 h, Ausbeute 0.46 g (63.3%), Schmelzpunkt 145-146°C, gleiches Gerüst wie Verbindung 4v, nur die unterschiedlichen NMR-Signale werden beschrieben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 6.83 (s, 1H), 3.43 (m, 6H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 181.2 (s), 133.7 (d), 116.6 (t), 48.3 (t). Anal. (C<sub>22</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>7</sub>·0.25 C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O) C, H, N.

**Beispiel 33:**

3-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl-acrylacidethylester (4z): Verfahren nach Beispiel 11, Reaktionszeit 20 h, Ausbeute 0.30 g (46.2%), Schmelzpunkt 121-122°C, gleiches Gerüst wie Verbindung 4v, nur die unterschiedlichen NMR-Signale werden beschrieben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.40 (dd, J<sub>1</sub> = 16.0 Hz, J<sub>2</sub> = 2.0 Hz, 1H), 4.68 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 4.10 (m, 2H), 1.28 8m, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 169.3 und 167.8 (s), 161.1 (d), 97.5 (d), 59.0 (t), 14.5 und 14.3 (q).

Verfahren E: Eine Lösung von (+/-)-Norgalanthamin (0.5 g, 1.83 mmol), 0.51 g (3.66 mmol) Kaliumkarbonat, (2.20 mmol) Natriumjodid und Alkylhalogenid (2.20 mmol) in Aceton (20 ml) wurden 12 h rückflußgekocht und eingeeengt. Der Rückstand wurde in 30 ml 2N Salzsäure aufgelöst und mit 1 x 20 ml AcOEt extrahiert. Die wäßrige Lösung wurde mit konzentriertem Ammoniak auf pH > 8.5 eingestellt und mit AcOEt (3 x 20 ml) extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte wurden mit Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) eingeeengt und durch MPLC gereinigt.

Die Verbindungen 4ab - 4ah und 4an - 4aq enthalten das grundlegende Galanthamingerüst wie 4aa, unterscheiden sich aber hinsichtlich des Stickstoffsubstituenten. Da die Proton- und Kohlenstoffsignale des Galanthaminkerns sich voneinander nicht wesentlich unterscheiden, werden nur die NMR-Signale des Stickstoffsubstituenten nachstehend wiedergegeben.

**Beispiel 34:**

Ethyl-2-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)acetat (4ac): Nach dem Verfahren E unter Verwendung von Ethylchloracetat und einer Reaktionszeit von 1 h wurden 0.48 g der Verbindung (73%) erhalten; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 4.10 (m, 2H), 3.32 (s, 2H), 1.21 (t, J = 7.3 Hz, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 170.7 (s), 60.4 (t), 58.0 (t), 14.1 (q).

**Beispiel 35:**

Vorschrift:

SUBSTITUTION IN POSITION 1



3.2.1.1 [4aS-(4a $\alpha$ ,6 $\beta$ ,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-1-(N,N-dimethylamino)-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-(N,N-Dimethylamino)-galanthamin (MH-7)

The reaction scheme shows the conversion of a substituted tetrahydroisoquinoline alkaloid to a N-methylated derivative. The starting material (left) features a benzene ring with a methoxy group (OCH<sub>3</sub>) at position 6, an amino group (NH<sub>2</sub>) at position 7, and a hydroxyl group (OH) at position 8. The product (right) is the N-methylated derivative, where the amino group has been converted to a dimethylamino group (N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>).

320 mg (1.06 mmol)	1-Aminogalanthamin (4)
0.50 ml	Ameisensäure in 2 ml Wasser
0.25 ml	Formaldehyd (37%)

Unter Magnetrührung wurden alle Reaktanden, gelöst in 10 ml Wasser, zusammen auf 70°C erwärmt. Nach 4.5 h wurde mit konz. aq. Ammoniak basisch gemacht, wobei ein weißer Niederschlag in gelber Lösung ausfiel. Das Reaktionsgemisch wurde mit Ethylacetat erschöpfend extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen.

Das resultierende Substanzgemisch wurde auf einer Kieselgelsäule ( $\text{CHCl}_3$  :  $\text{MeOH}$  = 1:1) aufgetrennt und anschließend im Hochvakuum mittels Kugelrohr destilliert.

Ausbeute: 0.17 g (0.52 mmol = 49% d. Th.) hellgelbes Öl

$$\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_3 \quad [330.43]$$

605 DC:  $R_f = 0.49$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 1:1$ )

B.p.: 180°C / 0.01 Torr

$$\alpha_D^{20} [c=0.1, \text{CHCl}_3] = -156.36^\circ$$

FID-Nummern:

<sup>1</sup>H: MHEM0F.016, <sup>13</sup>C: MHEM1F.002, DEPT: MHEM2F.002

610 <sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.57 (s, 1 H), 6.08 (dd, J = 10.3, 1.0 Hz, 1 H), 5.97 (dd, J = 10.3,

4.8 Hz, 1 H), 4.56 (bs, 1 H), 4.45 (d,  $J = 15.1$  Hz, 1 H), 4.12 (bs, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.55 (d,  $J = 15.1$  Hz, 1 H), 3.12 (td,  $J = 13.1, 1.7$  Hz, 1 H), 2.97 (dt,  $J = 14.1, 3.5$  Hz, 1 H), 2.72-2.53 (m, 1 H), 2.58 (s, 6 H), 2.44 (s, 3 H), 2.12-1.98 (m, 2 H), 1.62 (ddd,  $J = 13.6, 3.8, 2.1$  Hz, 1 H);  $^{13}\text{C}$ -NMR (50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  147.1 (s), 143.2 (s), 142.0 (s), 133.7 (s), 127.3 (d), 127.2 (d), 124.2 (s), 103.9 (d), 88.3 (d), 62.0 (d), 55.9 (q),

615 54.4 (t), 54.1 (t), 48.4 (s), 45.7 (q), 44.2 (q), 34.8 (t), 29.8 (t)

### Beispiel 37:

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-11-(3-Aminoethyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3*a*,3,2-

ef][2]benzazepin-6-ol (4af), Verfahren F, Reaktionspartnerverbindung 4ad, Reaktionszeit 1 h; Ausbeute 0.31 g (59.2 %); Schmelzpunkt 47-51°C; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 2.69 (m, 2H), 1.92 (b, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 51.9 (s), 38.0 (t).

**Beispiel 40:**

Ethyl-3-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)propanoat (4ai): Verfahren B, Reaktionszeit 4 h; Ausbeute 0.64 g (47.5%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 4.15 (q, J = 6.0 Hz, 2H), 2.81 (t, 7.0 Hz, 2H), 2.47 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.23 (t, J = 6 Hz, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 172.4 (s), 60.3 (t), 57.3 (t), 32.9 (t), 14.1 (q).

**Beispiel 41:**

t-Butyl-3-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)propanoat (4aj): Verfahren B, Reaktionszeit 5 h; Ausbeute 0.83 g (60.0%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 2.82 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.40 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.43 (s, 9H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 172.0 (s), 80.5 (s), 57.7 (t), 34.2 (t), 28.0 (q). Anal. (C<sub>24</sub>H<sub>33</sub>NO<sub>5</sub>) C, H, N.

**Beispiel 42:**

3-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)-N<sup>11</sup>-isopropylpropanamid (4ak): Verfahren B, Reaktionszeit 18 h; Ausbeute 0.55 g (78.7%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 3.81 (m, 1H), 2.79 (t, J = 6Hz, 2H), 2.32 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 1.10 (t, J = 12.0 Hz, 6H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 171.4 (s), 56.9 (t), 40.7 (d), 33.2 (t), 22.7 (q).

**Beispiel 43:**

3-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)-N1-t-butylpropanamid (4al): Verfahren B, Reaktionszeit 24 h; Ausbeute 0.37 g (51.2%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 2.76 (t, 6.0 Hz, 2H), 2.29 (m, 2H), 1.28 (s, 9H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 171.4 (s), 51.4 (t), 50.3 (s), 33.5 (t), 28.7 (q).

**Beispiel 44:**

3-((6R)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)propanitril (4am): Verfahren B, Reaktionszeit 4 h; Ausbeute 0.53 g (90.6%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 2.82 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 2.47 (t, J = 6.8 Hz, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 118.7 (s), 51.6 (t), 46.6 (t), 16.7 (t).

**Beispiel 45:**

(6R)-11-(3-Hydroxypropyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4an): Verfahren F, Reaktionspartnerverbindung 4ai, Reaktionszeit 7 h; Ausbeute 0.21 g (47.7%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 3.77 (m, 2H), 2.72 (m, 2H), 2.02 (m, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 63.9 (t), 57.3 (t), 29.8 (t).

**Beispiel 46:**

(6R)-11-(3-Aminopropyl)-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4ao): Verfahren F, Reaktionspartnerverbindung 4am, Reaktionszeit 1 h; Ausbeute 78 mg (52.8%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 3.22 (m, 2H), 2.68 (m, 2H), 1.72 (m, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 51.3 (t), 37.8 (t), 29.3 (t).

**Beispiel 47:**

(6R)-11-(3-piperidin-1-yl-propyl)-3-methoxy-5,6,9,10-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (4ap): Verfahren E, Reaktionszeit 3 d; Ausbeute 0.36 g (53.2%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 2.68 (m, 8H), 1.77 (m, 6H), 1.50 (m, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 57.4 (t), 44.1 (t), 49.2 (t), 24.7

660 (t), 23.4 (t), 23.3 (t):

### Beispiel 48:

#### Stufe 1:

(4a,S,6R8aS)-3-Methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH[1]benzofuro[3a,3,2-ef[2]benzazepin-6-ol, (-)-Norgalanthamin (8).

#### Methode 1:

Zu einer Lösung von 10.92 g (40.0 mmol) rac. Norgalanthamin (4) in 40 ml Methanol wird eine Lösung von 7.72 g (20.0 mmol) (+)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure in 15 ml Methanol getropft und anschließend mit 1 ml Methanol nachgewaschen. Die Lösung wird mit einem Impfkristall versetzt (ohne Impfkristall kann die Kristallbildung mehrere Wochen dauern) und zwei Tage bei 4°C stehen gelassen. Dann wird mit einem Glasstab gut durchgerieben und weitere zwei bis fünf Tage bei 4°C stehen gelassen, wobei immer wieder mit einem Glasstab gut durchgerieben wird. Anschließend wird das ausgefallene Salz abgesaugt, dreimal mit eiskaltem Methanol nachgewaschen und in 100 ml Wasser aufgenommen. Die wässrige Phase wird mit konzentriertem wässrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 60 ml Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden einmal mit gesättigter wässriger Natriumchloridlösung gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Aktivkohle), filtriert und eingedampft, wodurch 2.9 g (37,5 % d. Th) farblose Kristalle an (-) Norgalanthamin (8) erhalten werden.

#### Methode 2:

Zu einer Lösung von Glantheamin (1) (20.0g, 70 mmol) in CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (350 ml)

665 wurden m-CPBA (Peroxidgehalt 76%, 15.6 g 70 mmol) hinzugefügt und die klare Lösung 40 min bei Raumtemperatur gerührt. In diesem Stadium war die Umwandlung in das N-Oxid quantitativ, wie durch HPLC festgestellt wurde. Dann wurde eine Lösung von FeSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O (9.7 g 35 mmol) in MeOH (100 ml) zugefügt. Die Mischung wurde 20 min gerührt, mit 2N Salzsäure (200 ml) versetzt, die flüchtigen Anteile (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und MeOH) bei vermindertem Druck abgedampft und dann mit  
670 Ether (3 x 100 ml) gewaschen. Die wässrige Lösung wurde mit konzentriertem Ammoniak auf pH> 8.5 eingestellt und mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (3 x 100 ml) extrahiert und mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>:MeOH = 9:1 (3 x 100 ml). Die vereinigten, organischen Extrakte wurden mit Kochsalzlösung (200 ml) gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet und eingeeengt, um ein kristallines Produkt zu ergeben (18.2 g, 96%), das aus einer 92:8-Mischung aus Norgalanthamin und Galantheamin bestand. MPLC (CHCl<sub>3</sub>:MeOH:Et<sub>3</sub>N =  
675 98:1.25:0.5), 16.1 g (84.7%) Norgalanthamin (8): <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 6.62 (b, 2H), 6.02 (m, 2H), 4.61 (b, 1H), 4.14 (t, J = 4.3 Hz, 1H), 3.98 (d, J = 5.0 Hz, 2H), 3.83 (s, 3H), 3.30 (m, 1H), 2.69 (d, J = 15.7, 1H), 2.10-1.63 (m, 4H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 146.2 (s), 144.1 (s), 133.1 (s), 131.7 (s), 127.8 (d), 126.8 (d), 120.8 (d), 111.1 (d), 88.4 (d), 61.9 (d), 55.9 (q), 53.3 (t), 48.5 (s), 46.7 (t), 39.4 (t), 29.9 (t).

Stufe 2:

680 (4a,S,6R,8aS)-3-Methoxy-11-Phenyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-  
ef[2]benzazepin-6-ol (8a). Zu einer Lösung 1.0 g der Verbindung 8 (-)-Norgalanthamin in 50 ml  
CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wurden 0.28 g Phenylborsäure (7.2 mmol), 0.6 ml Pyridin (7.2 mmol), 0.67 g Kupferacetat  
(3.6 mmol) und ein Molekularsieb (1.0 g) zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde bei  
Raumtemperatur 3 Tage lang gerührt. Der Niederschlag wurde abfiltriert und mit 3 x 10 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>  
685 gewaschen. Das Filtrat wurde 3 x mit 50 ml verdünnter Ammoniaklösung extrahiert. Die  
vereinigten, wäßrigen Phasen wurden mit 3 x 50 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert, die organischen Phasen  
wurden mit Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. MPLC  
ergab 0.33 g (26.4%) der Verbindung 8a. Schmelzpunkt 178-180°C;  
1H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.18 (m, 2H), 6.82 (m, 3H), 6.67 (dd, J<sub>1</sub> = 33.8 Hz, J<sub>2</sub> = 7.6 Hz, 2H), 6.05 (b, 2H),  
690 4.66 (b, 1H), 4.53 (m, 1H), 4.19 (d, J = 15.3 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.81 (d, J = 15.3 Hz, 1H), 3.33 (m,  
1H), 2.68 (m, 1H), 2.07 (m, 3H), 1.62 (m, 1H); 13C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 158.2 (s), 145.9 (s), 144.5 (s), 133.0  
(s), 129.4 (s), 128.9 (d), 128.1 (d), 126.9 (d), 126.1 (d), 121.1 (d), 116.0 (d), 111.4 (d), 88.6 (d), 61.9  
(d), 57.0 (t), 55.9 (q), 50.6 (t), 48.2 (s), 32.8 (t), 29.9 (t). Anal. (C<sub>22</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub>·0.75 H<sub>2</sub>O) C, H, N.

**Beispiel 49:**

695 (4a,S,6R,8aS)-3-Methoxy-11-thiophenyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-  
ef][2]benzazepin-6-ol (8b). Die Verbindung wurde wie in Verbindung 8a hergestellt, die  
Reaktionszeit betrug 3 Tage, Ausbeute 0.14 g (28.0%). Nur die von 8a unterschiedlichen NMR-  
Signale sind beschrieben: 1H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) 7.23 (m, 1H), 6.92 (t, J = 3.0 Hz, 1H), 6.83 (d, J = 2.7 Hz,  
1H); 13C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 145.7 (s), 127.6 (d), 126.2 (d), 125.0 (d). Anal. (C<sub>20</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>3</sub>S) C, H, N.

**Beispiel 50:**

700 (4a,S,6R,8aS)-11-Benzoyl-piperidin-4-yl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-



[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8c). 1-Benzoyl-piperidin-4-on (0.34 g, 1.7 mmol), 0.47 g Titanisopropylat (1.7 mmol) und 3.6 g (1.3 mmol) der Verbindung 8 wurden 30 min bei 110°C geschmolzen. Nach dem Abkühlen bei Raumtemperatur wurde eine Lösung von Natriumcyanoborhydrid (65 mg, 0.9 mmol) in trockenem EtOH (10 ml) zugegeben und das Reaktionsgemisch bei Raumtemperatur 24 Stunden gerührt. Nach Zugabe von 2 ml Wasser wurde der Niederschlag abfiltriert, das Filtrat eingeeengt und der Rückstand mit 20 ml EtOAc verdünnt und erneut filtriert. Die klare Lösung wurde eingeeengt. MPLC ergab 0.24 g (38.8%) der Verbindung 8c. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.52-7.31 (m, 5H), 6.65 (b, 2H), 6.08 (m, 2H), 4.64 (b, 1H), 4.22-3.90 (m, 4H), 3.82 (s, 3H), 3.37 (m, 2H), 3.01-2.62 (m, 5H), 2.10-1.82 (m, 5H), 1.67-1.42 (m, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) 170.1 (s), 145.8 (s), 144.0 (s), 136.0(s), 133.1 (s), 129.4 (d), 128.8 (d), 128.4 (d), 128.3 (d), 127.6 (d), 126.7 (d), 121.6 (d), 111.2 (d), 88.6 (d), 61.9 (d), 55.8 (q), 55.6 (t), 48.3 (t), 30.8 (t), 29.8 (t).

#### Beispiel 51:

(4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxylicacidphenylester (8e): Zu einer Lösung von 0.50 g der Verbindung 8 (1.74 mmol) in 50 ml CHCl<sub>3</sub> wurden 2.5 g Natriumhydrogenkarbonat (29.8 mmol) und 1.84 ml Phenylchlorformiat (14.6 mmol) zugegeben. Das Gemisch wurde kräftig gerührt und 2 Stunden rückflußgekocht und dann mit Wasser (30 ml) verdünnt. Die Phasen wurden getrennt. Die wäßrige Phase wurde mit 2 x 30 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert und die vereinigten, organischen Phasen mit 1N Salzsäure (30 ml) gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und unter vermindertem Druck eingeeengt, um das rohe Produkt zu ergeben. MPLC (CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>:MeOH = 99:1) ergab 0.58 g (84.2%) der Verbindung 8e: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.51-7.04 (m, 5H), 6.82 (dd, J<sub>1</sub> = 24.0 Hz, J<sub>2</sub> = 6.0 Hz, 2H), 6.04 (b, 2H), 4.91 (b, 1H), 4.69 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 4.20 (b, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.42 (m, 1H), 3.19 (m, 1H), 2.43-1.90 (m, 4H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 151.3 (s), 146.6 (s), 145.7 (s), 130.5 (s), 130.1 (s), 129.4 (d), 129.3 (d), 125.9 (d), 125.3 (d), 125.0 (d), 121.6 (d), 111.9 (d), 88.3 (d), 62.8 (d), 57.7 (t), 55.9 (q), 53.4 (t), 49.3 (s), 43.3 (t), 32.7 (t).

#### Beispiel 52:

(4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carbothionacid-O-phenylester (8f): Zu einer Lösung von 0.50 g der Verbindung 8 (1.74 mmol) in 25 ml CHCl<sub>3</sub> wurden 0.24 ml Chlorothionformiat (1.74 mmol) zugegeben und das Reaktionsgemisch unter Stickstoff 1 Stunde lang gerührt. Das Lösungsmittel wurde abgetrennt, um ein farbloses Öl zu ergeben, das flashchromatographiert wurde, um 0.50 g (71.2%) der Verbindung 8a zu ergeben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.48-7.12 (m, 3H), 7.02 (d, J = 6.0 Hz, 2H), 6.83 (m, 2H), 6.04 (b, 2H), 5.08 (m, 1H), 4.71 (d, J = 26.0 Hz, 2H), 4.28 (m, 1H), 3.88 (s, 3H), 3.41 (m, 2H), 2.51-2.09 (m, 4H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 187.5 und 187.4 (s), 153.8 und 153.7 (s), 146.7 und 146.6 (s), 145.8 und 145.7 (s), 131.3 und 130.6 (s), 130.2 und 129.5 (s), 129.2 und 129.1 (d), 126.0 und 125.9 (d), 125.0 und 124.9 (d), 122.7 und 122.6 (d), 121.6 und 120.4 (d), 115.3 (d), 112.0 (d), 84.4 und 84.2 (d), 63.1 und 62.9 (d), 55.9 (q), 51.5 (t), 49.5 und 49.3 (s), 47.8 (t), 36.9 (t), 33.1 (t).

#### Beispiel 53:

(4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxylicacid-9-H-fluor-9-ylmethylester (8g): Zu einer Lösung von 0.5 g der Verbindung 8 (1.8 mmol) und 2.5 ml Triethylamin (1.8 mmol) in 20 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wurden 0.5 g 9-

fluorenylmethyloxycarbonylchlorid (20 mmol) zugegeben und 30 min bei Raumtemperatur gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde eingeeengt, der Rückstand mit 80 ml 2 N Salzsäure verdünnt und mit 5 x 50 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt, um 0.88 g (99.2%) der Verbindung 8g zu ergeben. Schmelzpunkt 76-79°C;  $\alpha_D = -33.0^\circ$ ; <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  1.72 (dd, J = 13.5; 5.0 Hz, 1H), 1.80-2.10 (m, 2H), 2.69 (dd, J = 13.5; 5.0 Hz, 1H), 3.20-3.45 (m, 2H), 3.85 (s, 3H), 3.95-4.35 (m, 3H), 4.40-4.52 (m, 2H), 5.78-6.05 (m, 2H), 6.22-6.82 (m, 2H), 7.19-7.82 (m, 8H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  155.1 (s), 144.4 (s), 144.0 (s), 141.4 (s), 134.0 (s), 129.1 (s), 128.1 (s), 128.0 (d), 127.6 (d), 126.4 (d), 124.9 (d), 124.7 (d), 121.0 (d), 119.9 (d), 111.1 (d), 88.3 (d), 66.9 (t), 61.9 (d), 56.0 (q), 51.5 (t), 48.3 (s), 47.3 (d), 45.9 (t), 36.4 (t), 29.7 (t).

**Beispiel 54:**

1-([4a,S,6R,8aS]-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)pent-4-en-1-on (8h): Zu einer Lösung von 1.0 g der Verbindung 8 (3.7 mmol) und 0.51 ml (3.7 mmol) Triethylamin in 40 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/MeOH = 5:2 wurden bei 0°C 0.97 ml (5.1 mmol) Pent-4-enoikanhydrid zugegeben und 20 min gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit 20 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> verdünnt, mit 2 x 20 ml gesättigter, Natriumhydrogenkarbonatlösung extrahiert. Die vereinigten, wäßrigen Phasen wurden mit 2 x 40 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert, die vereinigten organischen Phasen wurden mit Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt, um 1.24 g (95.3%) der Verbindung 8h zu ergeben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  6.66 (b, 2H), 5.98 (m, 2H), 5.78 (m, 1H), 4.98 (m, 2H), 4.66 (d, J = 12.8 Hz, 1H), 4.55 (s, 1H), 4.41 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 4.11 (b, 1H), 3.93 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.17 (t, J = 17.7 Hz, 1H), 2.76-2.15 (m, 5H), 1.92 (m, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  171.7 (s), 146.8 (s), 144.6 (s), 137.3 (d), 132.4 (s), 128.1 (s), 128.0 (d), 126.3 (d), 120.3 (d), 114.9 (d), 111.0 (d), 88.2 (d), 61.7 (d), 55.8 (q), 52.7 (t), 48.2 (s), 44.6 (t), 35.7 (t), 33.2 (t), 29.7 (t), 28.8 (t).

**Beispiel 55:**

1-([4a,S,6R,8aS]-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxamid (8i): Zu einer Suspension von 0.5 g der Verbindung 8 (1.8 mmol) in 25 ml Wasser wurde der pH-Wert mit 2N Salzsäure auf pH = 3 eingestellt und 0.23 g (3.6 mmol) Natriumcyanid zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 25 Stunden lang bei Raumtemperatur gerührt und dann der pH-Wert mit konzentriertem Ammoniak auf über 8.5 eingestellt und schließlich mit 3 x 20 ml CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> extrahiert. Die vereinigten, wäßrigen Phasen wurden mit Kochsalzlösung extrahiert, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. MPLC (CHCl<sub>3</sub>:MeOH(NH<sub>3</sub>) = 95:5) ergab 0.38 g (66%) der Verbindung 8i: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  6.67 (dd, J = 12.8; 8.1 Hz, 2H), 6.00 (dd, J = 15.1; 10.4 Hz, 2H), 4.68 (b, 1H), 4.51 (d, J = 16.8 Hz, 1H), 4.31 (d, J = 16.8 Hz, 1H), 4.11 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.35 (t, J = 12.8 Hz, 1H), 2.67 (d, J = 15.3 Hz, 1H), 2.41 (b, 1H), 1.97 (m, 2H), 1.72 (d, J = 13.8 Hz, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  158.1 (s), 146.8 (s), 144.5 (s), 132.3 (s), 128.6 (s), 128.0 (d), 126.2 (d), 120.3 (d), 111.1 (d), 88.1 (d), 61.6 (d), 55.8 (q), 51.9 (t), 48.3 (s), 45.6 (t), 36.3 (t), 29.7 (t).

**Beispiel 56:**

(4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-methyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carbothioamid (8j): Verfahren nach Beispiel .... Reaktionszeit 4 Stunden, Ausbeute 1.02 g (88%); Schmelzpunkt 229-230°C; <sup>1</sup>H-NMR und <sup>13</sup>C-NMR waren identisch

mit Verbindung 4t. Anal.  $C_{18}H_{22}N_2O_3 \cdot 0.2 CH_3C_6H_5$  C, H, N.

**Beispiel 57:**

(4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-N<sup>11</sup>-isopropyl-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxamid (8k): Verfahren A, Reaktionszeit 3 Stunden, Ausbeute 1.86 g (71%); <sup>1</sup>H-NMR und <sup>13</sup>C-NMR waren identisch mit Verbindung 4i.

**Beispiel 58:**

(4a,S,6R,8aS)-N<sup>11</sup>-t-Butyl-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxamid (8l): Verfahren A, Reaktionszeit 3 Stunden, Ausbeute 1.63 g (60%); Schmelzpunkt 106-108°C; <sup>1</sup>H-NMR und <sup>13</sup>C-NMR waren identisch mit Verbindung 4m.

**Beispiel 59:**

(4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-N<sup>11</sup>-2-trifluoromethyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboxamid (8m): Verfahren A, Reaktionszeit 5 Stunden, Ausbeute 0.60 g (59%);

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 8.20 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 7.24 (m, 2H), 7.02 (m, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 153.6 (s), 137.6 (s), 127.6 (d), 126.1 (d), 123.0 und 117.8 (s), 122.3 (d), 119.8 (s), 111.3 (d).

**Beispiel 60:**

Methyl-(4a,S,6R,8aS)-N<sup>11</sup>-Cyano-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carboximidothioat (8n). Die Verbindung wurde wie für die Verbindung 3bi beschrieben, hergestellt. Reaktionszeit 3 Tage, Ausbeute 0.90 g (33,2%); <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 6.72 (m, 2H), 5.98 (d, J = 10.2 Hz, 2H), 4.62 (m, 2H), 4.14 (b, 1H), 3.92 (d, J = 11.8 Hz, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.44 (m, 2H), 2.74 (s, 3H), 2.68 (m, 1H), 1.99 (m, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 146.2 (s), 144.9 (s), 131.7 (s), 128.7 (d), 125.8 (s), 125.5 (d), 121.8 (d), 111.2 (d), 88.1 (d), 61.6 (d), 55.8 (q), 51.2 (t), 49.7 (t), 47.9 (s), 29.6 (t), 16.1 (q).

**Beispiel 61:**

(4a,S,6R,8aS)-11-(Cyclopropylmethyl)-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8o): Verfahren nach Beispiel E, Reaktionszeit 36 Stunden, Ausbeute 0.12 g (29.0%); selbes Gerüst wie 4aa, nur die unterschiedlichen NMR-Signale werden beschrieben. <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 3.48 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 0.91 (m, 1H), 0.53 (d, J = 12 Hz, 2H), 0.11 (d, J = 6 Hz, 2H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 57.2 (t), 9.8 (d), 4.7 (t), 4.1 (t).

**Beispiel 63:**

3-((4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)ethannitril (8r): Verfahren wie in Beispiel E, Reaktionszeit 2 Stunden, Ausbeute 1.67 g (61,1%); Schmelzpunkt 169-171°C; <sup>1</sup>H-NMR und <sup>13</sup>C-NMR waren identisch mit Verbindung 4ad. Anal. ( $C_{18}H_{20}N_2O_3 \cdot 0.67 H_2O$ ) C, H, N.

**Beispiel 64:**

1-(2-Phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-5-yl)-2-((4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)-1-ethanon (8s): Verfahren wie in Beispiel E, Reaktionszeit 3 Tage, Ausbeute 0.68 g (37.8%); Schmelzpunkt 85-89°C; α = -169.3°, gleiches Gerüst wie 4aa, nur unterschiedliche NMR-Signale werden beschrieben: <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 7.21 (m, 2H); 6.68 (m, 3H) 5.0 (s, 1H), 4.47 (d, J = 14.0 Hz, 1H), 3.90 (m, 1H), 3.63 (m, 3H), 3.24 (m, 1H), 2.04 (m, 3H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 168.0 und 167.6 (s), 146.4 (d), 144.1 (s), 127.7 (d), 127.5 (d), 112.5 (d), 112.4 (d), 67.0 (t), 57.0 und 56.8 (d), 56.8 und 56.6 (t), 51.8 und 51.6 (t), 36.6 (t);

33.7 und 33.6 (t). Anal. ( $C_{29}H_{33}N_3O_4 \cdot 0.33 H_2O$ ) C, H, N.

**Beispiel 65:**

830 (4a,S,6R,8aS)-11-(3-Aminoethyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8t): Verfahren nach Beispiel F, Reaktionspartnerverbindung 8r; Reaktionszeit 18 Stunden, Ausbeute 1.01 g (66.1%); Schmelzpunkt 72-75°C;  $\alpha_D = -71.58^\circ$ ,  $^1H$ -NMR und  $^{13}C$ -NMR waren identisch mit Verbindung 4af. Anal. ( $C_{18}H_{24}N_2O_3 \cdot 0.65 EtOH \cdot 0.05 CH_2Cl_2$ ) C, H, N.

835 **Beispiel 66:**

(4a,S,6R,8aS)-11-(2-Morpholin-4-yl-ethyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8u): Verfahren nach Beispiel E, Reaktionszeit 2 Tage, Ausbeute 1.77 g (63.6%); Schmelzpunkt 101-104°C;  $\alpha_D = -110.9^\circ$ ,  $^1H$ -NMR und  $^{13}C$ -NMR waren identisch mit Verbindung 4ag. Anal. ( $C_{22}H_{30}N_2O_4 \cdot 0.15 CH_2Cl_2$ ) C, H, N.

840 **Beispiel 67:**

(4a,S,6R,8aS)-11-(2-Phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-5-yl-ethyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8v): Verfahren nach Beispiel F, Reaktionspartnerverbindung 8s, Reaktionszeit 30 min, Ausbeute 0.26 g (50.8%); Schmelzpunkt 72-75°C;  $\alpha_D = -131.6^\circ$ ,  $^1H$ -NMR und  $^{13}C$ -NMR waren identisch mit Verbindung 4ah. Anal.

845 ( $C_{29}H_{35}N_3O_3 \cdot 0.35 CH_2Cl_2 \cdot 0.5 Et_3N$ ) C, H, N.

**Beispiel 68:**

3-((4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)propanacid (8w): Eine Lösung von 8w (0.5 g, 1.25 mmol) wurde in  $CH_2Cl_2$  (20 ml) in Trifluoraceticacid (5 ml) zugegeben. Die Reaktionsmischung wurde bei Raumtemperatur 2 Stunden gerührt und ergab ein Konzentrat von 0.37 g (64.5%) von 8w: gleiches Gerüst wie 4aa, nur unterschiedliche NMR-Signale werden beschrieben:  $^1H$ -NMR ( $CDCl_3$ ) 8.95 (b, 1H), 2.82 (m, 2H), 2.25 (m, 2H).

**Beispiel 69:**

t-Butyl-3-((4a,S,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-propanoat (8x): Verfahren B, Reaktionszeit 6 Stunden, Ausbeute 0.74 g (53.2%);  $^1H$ -NMR und  $^{13}C$ -NMR waren identisch mit Verbindung 4aj.

**Beispiel 70:**

(4a,S,6R,8aS)-11-(3-Hydroxypropyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8z): Verfahren E, Reaktionszeit 4 Tage, Ausbeute 0.32 g (56.7%);  $\alpha_D = 90.0^\circ$ ;  $^1H$ -NMR und  $^{13}C$ -NMR waren identisch mit Verbindung 4an.

**Beispiel 71:**

(4a,S,6R,8aS)-11-((3-Dimethylamino)propyl)-3-methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (8aa): Verfahren E, Reaktionszeit 24 Stunden, Ausbeute 0.45 g (51.6%); selbes Gerüst wie 4aa, nur die unterschiedlichen NMR-Signale werden beschrieben.  $^1H$ -NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  2.50 (m, 2H), 2.30 (m, 2H), 2.22 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 1.82 (m, 2H);  $^{13}C$ -NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  55.6 (t), 53.4 (t), 45.0 (q), 25.3 (t).

**Beispiel 72:**

(4a,S,6R,8aS)-3-Methoxy-11-(3-piperidin-1-yl-propyl)-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-



### Beispiel 73:

### Beispiel 74:

### Beispiel 75:

### Beispiel 76:

890 **Beispiel 77:**


### Beispiel 78:

**Verbindung 79:**

### Beispiel 80:

### Schritt 1:

905 ~~2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzaldehyd~~



910 2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd (100,0 g, 433 mmol), 2-Brompropan (160,0 g, 1,30 mol) und Kaliumcarbonat (300 g, 2,16 mol, wasserfrei, frisch gemahlen) werden in Acetonitril (1200 ml) 48 Stunden bei 60°C gerührt.

915 Das Reaktionsgemisch wird filtriert, das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand zwischen Wasser (800 ml) und Ether (800 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (2 x 300 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (2 x 500 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 500 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und der nach Abdestillieren des Lösungsmittels erhaltene Rückstand aus Methanol (500 ml) umkristallisiert. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form blaßrosafarbener Kristalle (98,1 g, 83%).


Schmp.: 75-76°C

920 DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 3:1, Rf = 0,75  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  10.13 (s, 1 H), 7.40 (s, 1 H), 7.03 (s, 1 H), 4.61 (Septett, J = 6.4 Hz, 1 H), 3.92 (s, 3 H), 1.38 (d, J = 6.4, Hz 6 H);  
 $^{13}\text{C NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  190.8 (d), 155.6 (s), 147.1 (s), 126.4 (s), 120.0 (s), 115.8 (d), 113.7 (d), 71.5 (d), 56.4 (q), 21.8 (q)

925

#### Schritt 2:

#### 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzalmethanol



930

Zu einer Suspension von Natriumborhydrid (1.67 g, 44.1 mmol) in wasserfreiem Ethanol (60 ml) wird bei 15°C 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzaldehyd (6.0 g, 22.0 mmol) innerhalb von 15 Minuten in Substanz zugegeben und die Mischung eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt.

935

Der nach Abdestillieren des Lösungsmittels verbliebene Rückstand wird zwischen

gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (60 ml) und Ether (100 ml) verteilt. Die wässrige Phase wird mit Ether (3 x 40 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (1 x 100 ml), Wasser (1 x 100 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 100 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert. Nach

40 Abdestillieren des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (5.575 g, 95%).

Schmp.: 67-69°C

DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 4:1, R<sub>f</sub> = 0,25

1H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.00 (s, 2 H), 4.64 (s, 2 H), 4.50 (Septett, J = 6.4 Hz, 1 H), 3.85 (s, 3 H), 2.05 (s, 1 H), 1.34 (d, J = 6.4, Hz 6 H);

45 13C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 150.1 (s), 146.5 (s), 131.8 (s), 116.1 (s), 115.9 (d), 112.6 (s), 71.7 (t), 64.3 (d), 56.0 (q), 21.8 (q)

MT-44 JOS 1693


C<sub>11</sub>H<sub>15</sub>BrO<sub>3</sub>

Berechnet: C, 48.02; H, 5.50

Gefunden: C, 48.11; H, 5.29

955 Schritt 3:

1-Brom-2-(chloromethyl)-5-methoxy-4-(1-methylethoxy)-benzol



C<sub>11</sub>H<sub>15</sub>BrO<sub>3</sub>

275.14 g/mol

C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>BrClO<sub>2</sub>

293.59 g/mol

960 Zu 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzylmethanol (5.63 g, 20.5 mmol) in absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (60 ml) wird Thionylchlorid (20 ml) in absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (10 ml) innerhalb von 10 Minuten zugetropft und 90 Minuten bei Raumtemperatur gerührt.

Der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird zwischen Ether (100 ml) und gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (100 ml) verteilt,

965 die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 100 ml), Wasser (1 x 100 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 100 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (5.72 g, 95%).

Schmp.: 68-70°C

970 DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 3:1, R<sub>f</sub> = 0,9

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.05 (s, 1 H), 6.97 (s, 1 H), 4.66 (s, 2 H), 4.51 (Septett,  $J = 6.4$  Hz, 1 H), 3.85 (s, 3 H), 1.37 (d,  $J = 6.4$ , Hz 6 H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  151.2 (s), 146.8 (s), 128.5 (s), 117.7 (s), 116.1 (d), 114.8 (s), 71.9 (t), 56.2 (d), 64.4 (q), 21.9 (q)

975

MT-45 JOS 1760

$\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_3$


Berechnet: C, 71.16; H, 8.53

Gefunden: C, 70.90; H, 8.28

980

#### Schritt 4:

#### 1-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]ethanon



$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2$

136.15 g/mol

$\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_2$

178.23 g/mol

985

1-[4-Hydroxyphenyl]ethanon (12.7 g, 93.2 mmol), 2-Bromopropan (57.3 g, 466 mmol) und Kaliumcarbonat (62.2 g, 466 mmol, wasserfrei, frisch gemahlen) werden in absolutem Acetonitril (150 ml) 24 Stunden bei  $60^\circ\text{C}$  gerührt.

990

Das Reaktionsgemisch wird filtriert, das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abdestilliert und der Rückstand zwischen Wasser (200 ml) und Ether (200 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (2 x 80 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen mit Wasser (2 x 100 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 100 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert. Auf diese Weise erhält man nach Abdestillieren des

995

Lösungsmittels das Produkt in Form farbloser Kristalle (16.8 g, 99%).

Schmp.:  $36-80^\circ\text{C}$

DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 4:1,  $R_f = 0,5$

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.82 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2 H), 6.88 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2 H), 4.63 (Septett,  $J = 6.4$  Hz, 1 H), 2.52 (s, 3 H), 1.33 (d,  $J = 6.4$  Hz, 6 H);


1000

$^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  196.7 (s), 161.9 (s), 130.5 (d), 129.8 (s), 115.0 (d), 70.0 (d), 26.2 (q), 21.8 (q)

#### Schritt 5:

#### 2-Brom-1-[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethanon

1005



Zu einer Lösung von 1-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]ethanon (10.0 g, 56.0 mmol) in

absolutem Dioxan (100 ml) wird Brom (11.7 g, 73.5 mmol) in absolutem Dioxan (70 ml)/absolutem

Ether (100 ml) innerhalb einer Stunde zugetropft und 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Das

Reaktionsgemisch wird mit Natriumsulfit (5.0 g) in Wasser (100 ml) versetzt, die Phasen werden

getrennt und die wäßrige Phase mit Ether (3 x 100 ml) extrahiert, die vereinigten organischen

Phasen werden mit Wasser (2 x 100 ml), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 150 ml)

und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle),

filtriert und der nach Abdestillieren des Lösungsmittels erhaltene Rückstand unter einem Gemisch

aus Petrolether (25 ml) und Cyclohexan (25 ml) bei  $-20^{\circ}\text{C}$  kristallisiert. Auf diese Weise erhält man

das Produkt in Form farbloser, sich rasch dunkel verfärbender Kristalle (8.80 g, 59%).

Schmp.: 36-37°C

DC:            Petrolether : Essigsäureethylester = 4:1, R<sub>f</sub> = 0,7


<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.93 (d, J = 9.5 Hz, 2 H), 6.92 (d, J = 9.5 Hz, 2 H), 4.63 (Septett, J = 6.4 Hz, 1 H),

4.40 (s, 2 H), 1.35 (d,  $J = 6.4$  Hz, 6 H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 189.8 (s), 162.7 (s), 131.4 (d), 126.4 (s), 115.3 (d), 70.3 (d), 30.7 (t), 21.9 (q)

### Schritt 4:

**1-(2-Bromethyl)-4-(1-methylethoxy)benzol**



Zu einer Suspension von wasserfreiem Aluminiumchlorid (5.70 g, 43.0 mmol) in absolutem

CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (100 ml) wird bei 5°C tert.-Butylamin-Borankomplex (7.45 g, 85.0 mmol, Pellets oder Pulver)

zugegeben. Nach 15 Minuten wird 2-Brom-1-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-ethanon (7.30 g, 28.4 mmol) in wasserfreiem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (50 ml) innerhalb von 30 Minuten zugetropft.


Das Gemisch wird drei Stunden bei Raumtemperatur gerührt, mit 0.1 N Salzsäure (100 ml) versetzt und die wäßrige Phase mit  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (2 x 30 ml) extrahiert. Die vereinigten organischen

1035 Phasen werden mit 0.1 N Salzsäure (2 x 50 ml), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 50 ml) und gesättigter Kochsalzlösung gewaschen (1 x 100 ml), getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und der nach Eindampfen des Lösungsmittels erhaltene Rückstand durch Kugelrohrdestillation (0.05 mbar/80°C) gereinigt, wobei das Produkt als farbloses Öl (5.81 g, 83%) erhalten wird.

1040 DC: Petrolether, Rf = 0,35  
<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.18 (d, J = 9.5 Hz, 2 H), 6.87 (d, J = 9.5 Hz, 2 H), 4.53 (Septett, J = 6.4 Hz, 1 H), 3.53 (t, J = 6.9 Hz, 2 H), 3.08 (t, J = 6.9 Hz, 2 H), 1.33 (d, J = 6.4 Hz, 6 H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 156.7 (s), 130.7 (s), 129.5 (d), 115.8 (d), 69.8 (d), 38.5 (t), 33.2 (t), 21.9 (q)

1045 MT-35 JOS 1760  
 C<sub>11</sub>H<sub>15</sub>BrO  
 Berechnet: C, 54.34; H, 6.22  
 Gefunden: C, 54.34; H, 6.09

1050 Schritt 7:  
 2-[2-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]ethyl]propandisäuredimethylester



1055 1-(2-Bromomethyl)-4-(1-methylethoxy)benzol (19.0 g, 78.1 mmol), Malonsäuredimethylester (40.0 g, 300 mmol) und Kaliumcarbonat (42.0 g, 300 mmol, wasserfrei, frisch vermahlen) in absolutem DMF (400 ml) werden 10 Stunden bei 70°C gerührt.

Das Lösungsmittel wird im Rotationsverdampfer entfernt und der Rückstand zwischen Wasser (250 ml) und Ether (250 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (1 x 100 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen mit Wasser (3 x 200 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 150 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und überschüssiger Malonsäuredimethylester aus dem der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltenen Rückstand abdestilliert (160°C/15 mbar).


Das Rohprodukt wird mittels Kugelrohrdestillation (140°C/0,001 mbar) gereinigt, wodurch das Produkt als farbloses Öl erhalten wird (18.9 g, 82%).

1065 DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 9:1, Rf = 0,4  
<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.08 (d, J = 10 Hz, 2 H), 6.81 (d, J = 10 Hz, 2 H), 4.50 (Septett, J = 6.5 Hz, 1 H), 3.71 (s, 6H), 3.32 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 2.58 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.19 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.65 - 2.47 (m, 2H), 2.26 - 2.06 (m, 2H), 1.31 (d, J = 6 Hz, 6H);

1070 <sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 169.8 (s), 156.3 (s), 132.3 (s), 129.4 (d), 115.9 (d), 69.9 (d), 52.5 (q), 50.8 (d), 32.4 (t), 30.6 (t), 22.1 (q)

**Schritt 8:**

**2-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]methyl-2-[2-[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethyl]propan- disäuremethylester**



2-[2[4-(1-Methylethoxy)phenyl]ethyl]propandisäuredimethylester (18.9 g, 64.2 mmol), 1-Brom-2-(chloromethyl)-4-(1-methylethoxy)-5-methoxybenzol (18.9 g, 64.2 mmol) und Kaliumcarbonat (45.0 g, 321 mmol, wasserfrei, frisch vermahlen) in absolutem DMF (300 ml) werden 12 Stunden bei 60°C gerührt.

Der nach Entfernen des Lösungsmittels verbleibende Rückstand wird zwischen Wasser (250 ml) und Ether (250 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (1 x 100 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (3 x 200 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (150 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt.

Nach Trocknen am Hochvakuum erhält man das Produkt als farbloses Öl (33.7 g, 95%).

DC:                      Petrolether : Essigsäureethylester = 9:1, Rf = 0,5

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.04 (s, 1 H), 7.01 (d, J = 10 Hz, 2H), 6.79 (d, J = 10 Hz, 2H), 6.73 (s, 1H); 4.47 (Septett, J = 6.5 Hz, 1H), 4.36 (Septett, J = 6.5 Hz, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.72 (s, 6H), 3.48 (s, 2H), 2.65 - 2.47 (m, 2H), 2.26 - 2.06 (m, 2H), 1.31 (d, J = 6.5 Hz, 12 H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 171.4 (s), 156.1 (s), 149.8 (s), 146.2 (s), 133.0 (s), 129.3 (s), 129.1 (d), 118.2 (s), 116.2 (d), 116.0 (d), 115.8 (d), 69.7 (d), 58.7 (s), 55.9 (q), 52.3 (q), 37.4 (t), 34.5 (t), 29.9 (t), 21.95 (q), 21.9 (q)

MT-54 JOS 1698


C<sub>27</sub>H<sub>35</sub>BrO<sub>7</sub>

Berechnet: C, 58.81; H, 6.40

Gefunden: C, 59.00; H, 6.26

**Schritt 9:**

**Alpha-[[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-4-(1-methylethoxy)benzolbutansäure**



- 1110 2-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]methyl-2-[2-[4-(1-methylethoxy)-phenyl]ethyl]propanedisäuredimethylester (33.7 g, 61.1 mmol) und Kaliumhydroxid (17.5 g, 312 mmol) werden in Ethanol (150 ml)/Wasser (30 ml) 12 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

Das Reaktionsgemisch wird mit konzentrierter Salzsäure bis auf einen pH von 1 angesäuert und eine Stunde unter Rückfluß gehalten.

- 1115 Der nach Entfernen des Lösungsmittels verbliebene Rückstand wird zwischen Wasser (250 ml) und Ether (250 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (2 x 100 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser neutralgewaschen, mit gesättigter Kochsalzlösung (150 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert. Der nach Entfernen des Lösungsmittels verbliebene Rückstand wird im Kugelrohr 30 Minuten bei 140°C decarboxyliert und anschließend bei 150°C/0.005 mbar destilliert. Auf diese Weise wird das

- 1120 Produkt in Form farbloser Kristalle (27.5 g, 94%) erhalten.

Schmp.: 114-116°C

DC: Chloroform : Methanol = 9:1, Rf = 0.65


<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 7.09, (s, 1H), 7.01 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 6.80 (s, 1H), 6.78 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 4.69 - 4.37 (m, 2H), 3.72 (s, 3H), 3.00 - 2.33 (m, 5H), 1.99 - 1.58 (m, 2H), 1.18 (d, J = 6.4 Hz, 12H);

- 1125 <sup>13</sup>C NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): 176.0 (s), 155.6 (s), 149.3 (s), 145.8 (s), 133.1 (s), 130.3 (s), 129.1 (d), 118.1 (d), 116.0 (d), 115.5 (s), 114.1 (d), 70.6 (d), 69.0 (d), 55.8 (q), 44.9 (d), 33.5 (t), 31.9 (t), 21.85 (q), 21.8 (q)

- 1130 MT-100 JOS 1592  
 $C_{24}H_{31}BrO_5$   
 Berechnet: C, 60.13; H, 6.52  
 Gefunden: C, 60.38; H, 6.55

- 1135 Schritt 10:  
 Alpha[[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-4-(1-methylethoxy)benzolbutansäureamid





140

Zu Alpha[[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-4-(1-methylethoxy)-benzolbutansäure (10.0 g, 20.8 mmol) in  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (100 ml) wird Thionylchlorid (50 ml) bei  $0^\circ\text{C}$  innerhalb von 15 Minuten zugetropft und das Gemisch zwei Stunden bei dieser Temperatur gerührt.

Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt, der Rückstand in absolutem Formamid (15 ml) aufgenommen und bei  $0^\circ\text{C}$  mit Ammoniak in Formamid (100 ml einer bei dieser Temperatur gesättigten Lösung) versetzt. Das Gemisch wird eine Stunde bei  $0^\circ\text{C}$  gerührt und auf Wasser (1500 ml) gegossen.

1150

Die ausgefallenen Kristalle werden abfiltriert und mit Wasser (4 x 400 ml) digeriert. Auf diese Art wird das Produkt in Form farbloser Kristalle (9.21 g, 92%) erhalten.

Schmp.: 154-156°C

DC:  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  : Methanol = 9 : 1,  $R_f$  = 0.7

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{DMSO}-d_6$ ):  $\delta$  7.32 (s, 1H), 7.08 (s, 1H), 7.02 (d,  $J$  = 7.3 Hz, 2H), 6.83 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 6.78 (d,  $J$  = 7.3 Hz, 2H), 4.68 - 4.32 (m, 2H), 3.77 (s, 3H), 3.39 (s, 3H), 3.00 - 2.62 (m, 2H), 2.00 - 1.58 (m, 2H), 1.18 (d,  $J$  = 6.4 Hz, 12H);

1155

$^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{DMSO}-d_6$ ): 175.8 (s), 155.5 (s), 149.1 (s), 145.8 (s), 133.5 (s), 130.9 (s), 129.9 (d), 118.1 (d), 115.8 (d), 115.5 (s), 114.1 (d), 70.9 (d), 69.0 (d), 55.8 (q), 45.9 (d), 34.2 (t), 32.1 (t), 21.85 (q), 21.8 (q)

1160

MT-112 JOS 1591

$\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{BrNO}_4$


Berechnet: C, 60.25; H, 6.74; N, 2.93

Gefunden: C, 59.99; H, 6.56; N, 2.82

1165

Schritt 11:

Herstellung von Alpha[[2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl]methyl]-4-hydroxybenzolbutansäureamid



1170

Zu einer Lösung von Alpha[[2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl]methyl]-4-hydroxybenzylbutansäureamid (9.30 g, 19.4 mmol) in absolutem  $CH_2Cl_2$  (150 ml) wird bei  $-78^\circ C$  Bortrichlorid (40 ml, 1.6 M in  $CH_2Cl_2$ ) zugetropft und eine Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Danach wird das Gemisch auf Raumtemperatur erwärmt und zwei Stunden gerührt.

1175

Man versetzt mit Wasser (300 ml) und destilliert das organische Lösungsmittel am Rotationsverdampfer ab, wobei das Rohprodukt kristallin ausfällt, das abfiltriert und mit Wasser (6 x 200 ml) und Diisopropylether (2 x 40 ml) digeriert wird. Dabei erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (6.76 g, 88%).

1180

Schmp.:  $177 - 179^\circ C$

DC:  $CH_2Cl_2$  : Methanol = 9 : 1,  $R_f = 0.4$

$^1H$  NMR ( $DMSO-d_6$ ):  $\delta$  9.18 (s, 2H), 7.18 (s, 1H), 7.04 (s, 1H), 6.97 (d,  $J = 7.3$  Hz, 2H), 6.72 (s, 1H), 6.65 (s, 1H), 6.66 (d,  $J = 7.3$  Hz, 2H), 3.77 (s, 3H), 3.48 (s, 3H), 2.92 - 2.38 (m, 4H);

1185

$^{13}C$  NMR ( $DMSO-d_6$ ):  $\delta$  175.6 (s), 155.5 (s), 147.0 (s), 145.8 (s), 131.3 (s), 129.9 (s), 129.8 (d), 117.9 (s), 115.8 (d), 115.0 (d), 11.9 (d), 56.0 (q), 48.1 (d), 37.6 (t), 37.0 (t)

MT-114 JOS 1692

$C_{18}H_{20}BrO_4$


1190

Berechnet: C, 54.84; H, 5.11; N, 3.55  
 Gefunden: C, 54.55; H, 4.90; N, 3.28

Schritt 12:

1195

1-Brom-4a, 5, 9, 10, 11, 12-hexahydro-3-methoxy-6-oxa-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-11-carbonsäureamid



$\alpha$ -[[2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl]methyl]-4-hydroxybenzolbutansäureamid (3.00 g, 10.0 mmol) wird in Chloroform (300 mL) suspendiert und mit einer Lösung von Hexacyanoferrat(III) (13.2 g, 40.0 mmol) in Kaliumcarbonatlösung (75 mL, zehnpromig) versetzt.

Das Gemisch wird bei Raumtemperatur 40 Minuten heftig gerührt und über Hyflo filtriert.

Die wäßrige Phase wird mit Chloroform (3 x 50 mL) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (2 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 150 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Kieselgel), filtriert und das nach Eindampfen des Lösungsmittels erhaltene Rohprodukt durch Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Essigsäureethylester) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (0.36 g, 12 %).

210 DC: Chloroform : Methanol = 9 : 1,  $R_f$  = 0.4 und 0.5

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.00 (s, 1H); 6.86 (dd, *J* = 12 Hz, *J* = 1 Hz, 1H), 6.06 (d, *J* = 1 Hz, 1H), 5.02 (bs, 2H), 4.70 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.62 (d, *J* = 16 Hz, 1H), 3.23 (dd, *J* = 16 Hz, *J* = 3 Hz, 1H), 3.08–2.89 (m, 1H), 2.77 (dd, *J* = 16 Hz, *J* = 6 Hz, 1H), 2.62–1.70 (m, 5H)

1215  $^{13}\text{C}$  NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  202.5 (s), 184.9 und 179.1 (s), 146.5 und 146.1 (d), 145.0 und 145.9 (s), 143.3 und 142.0 (s), 132.0 und 131.8 (s), 128.9 und 128.0 (s), 126.7 und 126.2 (d), 116.3 und 115.0 (s), 114.4 (d), 87.4 und 87.3 (d), 56.0 (q), 49.5 und 49.3 (s), 45.3 (d), 37.3 und 37.0 (t), 35.4 (t), 34.4 (t), 30.4 (t)

Tieferlaufendes Diastereomeres

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 6.70 - 6.85 (m, 2H), 6.07 - 5.91 (m, 2H), 4.54 (s, 1H), 4.12 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.99 (s, 1H), 2.86 (t, J = 15 Hz, 1H), 2.72 (d, J = 16 Hz, 1H), 2.63 (dd, J = 16 Hz, J = 3 Hz, 1H), 2.30 - 1.60 (m, 9H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 146.4 (s), 143.9 (s), 133.7 (s), 128.5 (s), 128.1 (d), 127.5 (d), 123.3 (d), 111.7 (d), 88.9 (d), 62.4 (d), 56.3 (q), 52.8 (d), 48.3 (s), 45.1 (t), 35.8 (t), 35.6 (t), 30.4 (t)

1225 MT-115-JOS-1585

$$\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{BrNO}_4$$


Berechnet: C, 55.12; H, 4.63; N, 3.57

Gefunden: C, 54.91; H, 4.66; N, 3.41

1230

### Beispiel 81:

**1-Brom-4a, 5, 9, 10, 11, 12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-11-carbonsäureamid**



1235

1240

1245

1250

1255

1260

Zu einer Suspension von 1-Brom-4a, 5, 9, 10, 11, 12-hexahydro-3-methoxy-6-oxa-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-11-carbonsäureamid (860 mg, 2.19 mmol) in absolutem THF (5 mL) wird bei 0 °C L-Selectride® (6.6 mL, 6.6 mmol, 1 M in THF) innerhalb von 15 Minuten zugegeben und das Gemisch 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man hydrolysiert mit Wasser (3 mL) und verteilt zwischen Wasser (10 mL) und Essigsäureethylester (10 mL), extrahiert die wäßrige Phase mit Essigsäureethylester (3 x 5 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 1 N Salzsäure (3 x 10 mL), Wasser (2 x 10 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (1 x 10 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 10 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und reinigt das nach Abdestillieren des Lösungsmittels erhaltene Rohprodukt durch Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Essigsäureethylester). Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (741 mg, 86 %).

DC: Chloroform : Methanol = 9 : 1, R<sub>f</sub> = 0.35 und 0.45

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 6.92 (s, 1H), 6.10 – 5.89 (m, 2H), 5.82 – 5.53 (m, 2H), 4.54 (s, 1H),

4.13 (s, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.51 (d, J = 15 Hz, 1H), 3.05 (dd, J = 17 Hz, J = 6 Hz, 1H), 2.96 – 2.84 (m, 1H),

2.65 (d, J = 16 Hz, 1H), 2.83 (dd, J = 16 Hz, J = 6 Hz, 1H), 2.44 – 1.40 (m, 9H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 177.7 und 175.2 (s), 145.3 (s), 145.7 (s), 144.2 (s) und 143.9 (s), 133.8 und 134.2 (s), 128.3 und 128.2 (d), 126.5 (d), 116.1 und 115.9 (s), 115.3 und 115.1 (d), 88.5 (d), 61.8 (d), 56.1 (q), 49.1 und 49.0 (s), 46.0 (d), 41.9 (t), 35.9 und 35.7 (t), 29.8 und 29.6 (t), 28.8 und 26.2 (t)

MT-120.

JOS 1710


C<sub>18</sub>H<sub>20</sub>BrNO<sub>4</sub>

Berechnet: C, 54.84; H, 5.11; N, 3.55

Gefunden: C, 54.84; H, 5.18; N, 3.43

#### Beispiel 82:

11-Amino-1-brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-6-ol (SPH-1459)



Bis(trifluoracetoxyl)iodbenzol (PIFA, 787 mg, 1.78 mmol) wird in Acetonitril (3.5 ml, HPLC-Qualität) gelöst und mit Wasser (3.5 ml, HPLC-Qualität) versetzt. Danach wird 1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-11-carbonsäureamid innerhalb von 2 Stunden in Substanz zugegeben und das Gemisch 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert, der Rückstand in Chloroform (5 ml) aufgenommen, filtriert und durch Säulenchromatographie (30 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (490 mg, 75%).

DC: Chloroform : Methanol = 9 : 1, Rf = 0.2 und 0.25

$^1\text{H}$  NMR (MeOH- $d_4$ ):  $\delta$  7.07 (s, 1H), 6.12 - 5.87 (m, 2H), 5.82 - 5.53 (m, 2H), 4.53 (s, 1H), 4.14 (s, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.59 (d, J = 20 Hz, 1H), 3.14 - 2.92 (m, 1H), 2.47 (d, J = 17 Hz, 1H), 2.16 (s, 3H), 2.01 - 2.62 (m, 2H);

$^{13}\text{C}$  NMR (MeOH- $d_4$ ):  $\delta$  148.3 und 148.2 (s), 146.5 und 146.1 (s), 135.8 (s), 129.9 und 129.3 (s), 128.5 und 127.9 (d), 125.9 und 123.9 (d), 118.4 und 118.1 (s), 116.9 und 116.0 (d), 118.4 und 118.0 (s), 116.8 und 116.0 (d), 89.0 und 88.9 (d), 62.4 und 62.3 (d), 57.2 (q), 50.6 und 50.4 (s), 49.8 (d), 38.5 (t), 36.0 und 33.0 (t), 31.8 und 31.0 (t), 31.4 und 28.3 (t)

JOS 1707


$\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{BrNO}_3 \cdot 1 \text{ CHCl}_3$

Berechnet: C, 44.52; H, 4.36; N, 2.88

Gefunden: C, 44.90; H, 4.30; N, 2.67

Beispiel 83:

11-Amino-4a, 5, 9, 10, 11, 12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-6-ol



1295

### Herstellung der Kupfer-Zink-Legierung

Zinkpulver (600 mg) und Kupfer(I)iodid werden unter Argon in Wasser (4 mL) und Ethanol (4 mL) 45 Minuten im Ultraschallbad umgesetzt, wobei eine tiefschwarze, feinpulvrige Suspension entsteht.

### 300 Debromierung

11-Amino-1-brom-4a, 5, 9, 10, 11, 12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzocyclohepta[hi]benzofuran-6-ol (80 mg, 0.22 mmol) und Calciumchlorid (300 mg, 2.7 mmol) werden in Substanz zu der entstandenen Suspension zugegeben und das Gemisch 12 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Man versetzt mit konzentrierter wässriger Ammoniaklösung (1 mL), entfernt das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer, nimmt den Rückstand in Chloroform (15 mL) auf, filtriert und reinigt den nach Eindampfen des Filtrats am Rotationsverdampfer erhaltenen Rückstand durch Säulenchromatographie (30 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1). Auf diese Weise lassen sich beide optischen Isomere trennen (10 mg, 0.04 mmol Isomer A; 26 mg, 0.09 mmol Isomer B; gesamt 36 mg, 59 %) und als farbloser Schaum gewinnen.

### 1310 Höherlaufendes Diastereomeres

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.73-6.62 (m, 2H), 6.05 (s, 2H), 4.62 (s, 1H), 4.14 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.57 (s, 1H), 3.22 (d,  $J = 16$  Hz, 1H), 2.83 (dd,  $J = 16$  Hz,  $J = 6.5$  Hz, 1H), 2.24 - 1.60 (m, 9H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  146.2 (s), 144.3 (s), 133.6 (s), 128.4 (s), 128.1 (d), 127.2 (d), 124.8 (d), 111.9 (d), 89.0 (d), 62.6 (d), 56.3 (q), 49.0 (s), 48.3 (d), 41.8 (t), 32.5 (t), 30.4 (t), 30.4 (t)

### 1315 Tieferlaufendes Diastereomeres

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.70-6.58 (m, 2H), 6.07-5.91 (m, 2H), 4.54 (s, 1H), 4.12 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.99 (s, 1H), 2.86 (t,  $J = 15$  Hz, 1H), 2.72 (d,  $J = 16$  Hz, 1H), 2.63 (dd,  $J = 16$  Hz,  $J = 3$  Hz, 1H), 2.30-1.60 (m, 9H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  146.4 (s), 143.9 (s), 133.7 (s), 128.5 (s), 128.1 (d), 127.5 (d), 123.3 (d), 111.7 (d), 88.9 (d), 62.4 (d), 56.3 (q), 52.8 (d), 48.3 (s), 45.1 (t), 35.8 (t), 35.6 (t), 30.4 (t).


1320

[illegible]

**Beispiel 84:**

**Schritt 1:**

- 10 Kondensation und Reduktion: Allgemeine Arbeitsvorschrift



- 15 1 eq. 2-Methyl-4-methoxy-5-hydroxybenzaldehyd  
bzw. 2,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyd  
1 eq. Tyramin  
0.8 eq. Natriumborhydrid  
10 ml Ethanol (96%) / 1 g Aldehyd

- 20 Das Edukt wurde in Ethanol suspendiert und unter Rühren das Tyramin zugegeben, dann wurde das Reaktionsgemisch 8.5 h auf Rückfluß erhitzt. Da sich die gebildete Schiff'sche Base (MH-16' bzw. 34') auf der DC-Platte wieder in die Ausgangsmaterialien zerlegt, wurde der Reaktionsfortgang mittels Reduktion einer kleinen Probe mit Natriumborhydrid, üblicher Aufarbeitung und Auftragen des erhaltenen Produkts ermittelt.


- 25 Nach 8.5 h wurde das Reaktionsgemisch im Eisbad auf 0°C abgekühlt und das Natriumborhydrid, gelöst in 4 ml Wasser / 1 g, langsam zugetropft, dann im Eisbad 30 min gerührt. Anschließend wurde unter heftigem Rühren auf 150 ml Eis/Wasser / 1 g Aldehyd gegossen, der entstandene weiße Niederschlag abfiltriert und im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Aus der Mutterlauge fiel eine zweite Fraktion des Produkts aus, welche gesammelt und getrocknet wurde.

30

**Beispiel 84:**

**Schritt 1a:**

5-[N-[2-[4-Hydroxyphenyl]ethyl]aminomethyl]-2-methoxy-4-methylphenol (MH-16)



35

- 27.8 g (168 mmol) 2-Methyl-4-methoxy-5-hydroxybenzaldehyd (6)  
23.0 g (168 mmol) Tyramin  
5.20 g (134 mmol = 0.8 eq) Natriumborhydrid  
40 Ausbeute: 43.4 g (161 mmol = 96% d. Th.) beiges Pulver  
 $C_{17}H_{21}NO_3$  [287.36]  
DC:  $R_f = 0.21$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1 + 1\% \text{ konz. } NH_4OH$ )  
M.p.: 122-124°C




		% C	% H	% N
45	berechnet	71.06	7.37	4.87
	gefunden	71.07	7.41	4.86

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6.90 (m, 2 H), 6.67 (s, 1 H), 6.62 (m, 2 H), 6.55 (s, 1 H); 3.72 (s, 3 H); 3.51 (s, 2 H); 2.73 (t, J = 6.5 Hz, 2 H); 2.60 (t, J = 6.5 Hz, 2 H); 2.10 (s, 3 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 155.4 (s), 145.8 (s), 143.9 (s), 130.9 (s), 130.4 (s), 129.3 (d), 126.0 (s), 116.2 (d), 115.0 (d), 114.3 (d), 55.7 (q), 51.1 (t), 50.3 (t), 35.0 (t), 17.9 (q)

#### Beispiel 84:

Schritt 1b:

5-(N-[2-[4-Hydroxyphenyl]ethyl]aminomethyl)-2,4-dimethoxyphenol (MH-34)



18.85 g (103.47 mmol) 5-Hydroxy-2,4-dimethoxy-benzaldehyd (8)

14.21 g (103.47 mmol) Tyramin

60 3.13 g (82.74 mmol) = 0.8 eq. NaBH<sub>4</sub>

200 ml Ethanol 96%

Ausbeute: 28.1 g = 92.63 mmol = 89.5% d. Th.

C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>4</sub> [303.36]

DC: R<sub>f</sub> = 0.14 (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1 + 1% konz. NH<sub>4</sub>OH)

65 M.p.: 170-173°C

C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>4</sub> [303.36] (verunreinigt mit aliphatischer Substanz ca. C<sub>15</sub>H<sub>32</sub>, Schliffett)

		% C	% H	% N
	berechnet	67.31	6.98	4.62
	gefunden	68.10	7.04	4.66

70 <sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6.95 (m, 2 H), 6.70 (s, 1 H), 6.64 (m, 2 H), 6.57 (s, 1 H), 3.75 (s, 3 H), 3.66 (s, 3 H), 3.52 (s, 2 H), 2.59 (bs, 4 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 155.3 (s), 149.9 (s), 146.3 (s), 139.7 (s), 130.4 (s), 129.3 (d), 120.4 (s), 116.6 (d), 115.0 (d), 98.4 (d), 56.0 (q+q), 50.6 (t), 47.1 (t), 35.0 (t)

#### 75 Beispiel 84:

Schritt 2:

Formylierung: Allgemeine Arbeitsvorschrift



80

- 1 eq. Amin  
2 eq. Ameisensäureester (-ethylester oder -methylester)  
10 ml 1,4-Dioxan, destilliert / 1 g Amin  
0.2 ml Dimethylformamid / 1 g Amin

85 katalytische Menge Ameisensäure


Alle Reagentien wurden zusammen auf Rückfluß erhitzt (eventuell mehrmals Ameisensäure zugeben) und das Reaktionsgemisch nach Ende der Reaktion im Vakuum zur Trockene eingengt. Der feste Rückstand wurde in 10 ml Methanol / 1 g Amin aufgenommen und unter Rühren 50 ml Eis / Wasser / 1 g Amin portionsweise zugegeben, wobei sich die Suspension des Zwischenprodukts unter Hydrolyse zum flockigen Endprodukt umwandelte, welches abgesaugt und getrocknet wurde.

90

### Beispiel 84/ Schritt 2a

N-((5-Hydroxy-4-methoxy-2-phenylmethyl)-N-(2-[4-hydroxyphenyl]ethyl)) formamid (MH-18)

95



- 55.0 g (191 mmol) 5-(N-[2-[4-Hydroxyphenyl]ethyl]aminomethyl)-2-methoxy-4-methylphenol (XVII)  
23.5 ml (383 mmol = 2 eq) Ameisensäuremethylester  
11.0 ml DMF  
1.50 ml Ameisensäure  
400 ml 1,4-Dioxan

100

105 Die Aufarbeitung erfolgt nach 7 h.

Ausbeute: 49.8 g (158 mmol = 82.6% d. Th.) beiges Pulver

$C_{18}H_{21}NO_4$  [315.37]

110

DC:  $R_f = 0.35$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1 + 1\% \text{ konz. } NH_4OH$ )  
M.p.: 170-171°C

	% C	% H	% N
115 berechnet	68.55	6.71	4.44

gefunden 68.77 6.86 4.14

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 9.20 (s, 1 H), 8.74 (d, J = 15.3 Hz, 1 H), 8.19 (s, 0.5 H), 7.88 (s, 0.5 H), 7.00-6.87 (m, 2 H), 6.74 (s, 1 H), 6.72-6.56 (m, 2 H), 6.59 (s, 1 H), 4.31 (s, 1 H), 4.23 (s, 1 H), 3.73 (s, 3 H), 3.21 (dd, J = 15.3, 7.6 Hz, 2 H), 2.60 (t, J = 7.6 Hz, 2 H), 2.12 (s, 3 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 162.7 und 162.3 (d), 155.7 (s), 146.7 und 146.5 (s), 144.4 und 144.2 (s), 129.7 und 129.4 (d), 128.9 und 128.4 (s), 126.5 (s), 126.4 und 126.3 (s), 116.3 und 115.9 (d), 115.1 (d), 114.6 und 114.4 (d), 55.6 (q), 48.0 und 47.4 (t), 43.3 und 41.6 (t), 33.2 und 31.9 (t), 18.1 und 18.0 (q)

#### Beispiel 84/ Schritt 2b

N-(2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl)-N-((5-hydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)methyl)-formylamid (MH-35)



27 g (89 mmol) 5-(N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]aminomethyl)-2,4-dimethoxyphenol (XXV)  
 14.4 ml (178 mmol) Ameisensäureethylester  
 200 ml 1,4-Dioxan  
 5.5 ml Dimethylformamid  
 2 ml Ameisensäure

Die Aufarbeitung erfolgte nach 24 h, die Ameisensäure wurde im Abstand von mehreren Stunden in 3 Portionen zugegeben.

Ausbeute: 26.13 g (78.85 mmol = 88.6% d. Th.) beiges Pulver

C<sub>18</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>5</sub> [331.37]

DC: R<sub>f</sub> = 0.53 (CHCl<sub>3</sub>:MeOH = 9:1 + 1%-konz. NH<sub>4</sub>OH)

M.p.: 130-132°C


	% C	% H	% N
berechnet	65.24	6.39	4.23
gefunden	64.97	6.40	4.18

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 9.18 (bs, 1 H), 8.48 (d, J = 7.4 Hz, 1 H), 8.16 (s, 0.5 H), 7.86 (s, 0.5 H), 6.98-6.87 (m, 2 H), 6.71-6.58 (m, 4 H), 4.31 (s, 1 H), 4.19 (s, 1 H), 3.78 (s, 3 H), 3.75 (s, 3 H), 3.21 (dd, J = 16.4, 7.7 Hz, 2 H), 2.69-2.55 (m, 2 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 162.7 und 162.5 (d), 155.7 und 155.6 (s), 150.6 und 150.3 (s), 146.7 und 147.3 (s), 140.1 und 139.9 (s), 129.6 und 129.3 (d), 129.0 und 128.4 (s), 116.8 und 116.4 (d), 116.2 und 115.9 (s), 115.1 (d), 98.5 und 98.4 (d), 56.3 und 56.2 (q), 55.9 (q), 47.9 und 45.2 (t), 43.0 und 38.3 (t), 33.4 und 31.9 (t)

### Beispiel 84/ Schritt 3

#### Phenolische oxidative Kupplung: 1-Methylgalanthamin (XV)

[(±)-(4aa,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-6-oxo-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11-carboxaldehyd, 1-Methyl-N-formylarwedid (MH-19)



170	11.4 g (69.8 mmol)	N-((5-Hydroxy-4-methoxy-2-phenylmethyl)-N-(2-[4-hydroxyphenyl]ethyl))formamid (XVIII)
	47.0 g (338 mmol)	Kaliumcarbonat
	47.0 g (142 mmol)	Kaliumhexacyanoferrat(III)
	1.60 l	Toluol
175	470 ml	Wasser
	40.0 g	Hyflo

Kaliumcarbonat, Kaliumhexacyanoferrat(III), Wasser und Toluol wurden in einem 4 l - Vierhalskolben auf 80°C erwärmt und dann wurde unter starkem mechanischem Rühren das Edukt eingestreut. Die Temperatur wurde 1 h auf 80°C gehalten, dann Hyflo zugegeben und noch 10 Minuten gerührt. Das Reaktionsgemisch wurde abgesaugt und der feste Rückstand 1 x mit Wasser und 3 x mit heißem Toluol nachgewaschen. Die Toluolphase wurde von der wässrigen Phase getrennt und diese mit Toluol extrahiert. Die organischen Phasen wurden vereinigt, das Lösungsmittel abgezogen und das Produkt im Vakuumtrockenschrank getrocknet.

185

Ausbeute: 6.17 g (19.7 mmol = 55.0% d. Th.) hellgelbes Pulver

DC:  $R_f = 0.48$  und  $0.42$  (2 Rotamere)  
M.p.: Zersetzung  $> 215^\circ\text{C}$


(CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1 + 1% konz. NH<sub>4</sub>OH)

		% C	% H	% N
	berechnet	69.00	6.11	4.47
195	gefunden	68.78	6.33	4.40

<sup>1</sup>H-NMR (Gemisch aus 2 Rotameren, 200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 8.18 (s, 0.2 H), 8.10 (s, 0.8 H), 7.25 (dd, J = 10.4, 1.9 Hz, 0.8 H), 7.15 (dd, J = 10.4, 1.9 Hz, 0.2 H), 6.73 (s, 0.2 H), 6.69 (s, 0.8 H), 5.95 (d, J = 10.3 Hz, 0.8 H), 5.93 (d, J = 10.3 Hz, 0.2 H), 5.14 (d, J = 15.4 Hz, 0.8 H), 4.83 (d, J = 15.4 Hz, 0.2 H), 4.67 (bs, 1 H), 4.51 (d, J = 15.4 Hz, 0.2 H), 4.07 (d, J = 15.4 Hz, 0.8 H), 3.97 (bs, 1 H), 3.78-3.60 (m, 4 H), 3.07 (dd, J = 17.4, 3.4 Hz, 1 H), 2.78 (dd, J = 17.4, 1.9 Hz, 1 H), 2.33 (s, 3H), 2.30 (s, 0.8 H), 2.22 (s, 0.2 H), 1.86 (dt, J = 13.5, 3.7 Hz, 1 H); <sup>13</sup>C-NMR (Gemisch aus 2 Rotameren, 50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 194.9 (s), 162.8 und 162.1 (d), 145.2 und 144.8 (d), 145.5 und 145.3 (s), 142.9 und 142.8 (s), 130.6 und 130.3 (s), 128.2 (s), 127.5 und 127.0 (s), 126.4 und 126.2 (d), 114.5 und 114.2 (d), 87.0 und 86.8 (d), 55.6 (q), 49.2 und 49.0 (s), 47.4 und 45.6 (t), 41.8 und 40.1 (t), 37.7 (t), 37.5 (t), 37.4 (t), 34.1 (t), 19.2 und 18.9 (q)

### Beispiel 85

210 [(±)-(4αα,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-  
ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-demethylgalanthamin (MH-20)



500 mg (1.60 mmol)  
215 6.00 ml (6.06 mmol = 3.78 eq)  
12.0 ml

1-Methyl-N-formylarwedine (XIX)  
L-Selectride 1 M in THF  
abs. THF

Eine Suspension des fein zerkleinerten Eduktes in abs. THF wurde auf 0°C abgekühlt und dann L-Selectride zugetropft, wobei eine Temperatursteigerung von 5°C zu beobachten war. Bei 0°C

- 220 wurde 1 h gerührt, wobei sich eine klare Lösung bildete. Nach 70 min wurden 5 Tropfen Wasser und 1 ml konz. aq. Ammoniak zugegeben, 10 min gerührt und dann das Reaktionsgemisch im Vakuum auf die Hälfte eingengt. Anschließend wurden noch einmal 10 ml Ammoniak zugegeben und die Lösung mit Methylenchlorid extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden einmal mit verdünnter Ammoniaklösung nachgewaschen, über Natriumsulfat
- 225 getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Das entstandene leuchtend rote Öl wurde über eine Kieselgelsäule gereinigt.

Ausbeute: 440 mg (1.53 mmol = 96.0% d. Th.) farbloses Öl

230  $C_{17}H_{21}NO_3$  [287.36]

DC:  $R_f = 0.39$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1 + 1\% NH_4OH$ )

235  $C_{17}H_{21}NO_3 \times 0.8 H_2O$  [301.76]


	% C	% H	% N
berechnet	67.66	7.55	4.64
gefunden	67.60	7.40	4.65

- 240  $^1H$ -NMR (200 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.51 (s, 1 H), 6.06 (d,  $J = 10.2$  Hz, 1 H), 5.97 (dd,  $J = 10.2, 4.5$  Hz, 1 H), 4.57 (bs, 1 H), 4.27 (d,  $J = 16.0$  Hz, 1 H), 4.11 (t,  $J = 4.4$  Hz, 1 H), 3.80 (s, 3 H), 3.77 (d,  $J = 16.0$  Hz, 1 H), 3.40-3.10 (m, 2 H), 2.65 (dd,  $J = 15.6, 3.2$  Hz, 1 H), 2.23 (s, 3 H), 1.99 (ddd,  $J = 15.6, 4.9, 2.3$  Hz, 1 H), 1.89-1.63 (m, 2 H);  $^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  144.4 (s), 142.9 (s), 133.4 (s), 130.5 (s), 127.8 (s), 127.5 (d), 127.1 (d), 113.5 (d), 88.1 (d), 61.4 (d), 55.8 (q), 49.0 (s), 48.9 (t), 46.9 (t), 39.7 (t), 29.8 (t),
- 245 19.4 (q)

#### Beispiel 86

[[ $\pm$ )-(4 $\alpha\alpha$ ,8 $\alpha R^*$ )]-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1,4'-dimethyl-spiro[-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepin]-6,2'-[1,3]-dioxolan]-11-carboxaldehyd, 1-Methyl-N-formyl-narwedinketal

250 (MH-21)



	6.17 g (19.7 mmol)	1-Methyl-N-formylnarwedidin (XIX)
255	40.0 ml	Toluol
	375 mg (1.97 mmol)	p-Toluolsulfonsäure
	11.1 ml (149 mmol)	Propylenglykol

260 In einem Kolben mit Wasserabscheider wurde das Edukt in Toluol vorgelegt und 1/3 der p-Toluolsulfonsäure mit 2/3 des Propylenglykols zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde auf Rückfluß erhitzt und nach 2 h die Lösung der restlichen p-Toluolsulfonsäure in Propylenglykol portionsweise über 5 h zugegeben, dann weitere 6 h auf Rückfluß gekocht. Nach Ende der Reaktion (HPLC-Untersuchung notwendig, da DC wenig aussagekräftig) wurde die Toluolphase abgetrennt und die Propylenglykolphase mit Toluol erschöpfend extrahiert. Die gesammelten

265 Toluolphasen wurden 2 x mit Essigsäure (8% in Wasser), 2 x mit gesättigter Natriumbicarbonatlösung und 2 x mit Wasser extrahiert, dann das Lösungsmittel abgezogen.

Ausbeute: 5.34 g (14.38 mmol = 73% d. Th.) beiger Schaum

270  $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{NO}_5$  [371.44]

DC:  $R_f = 0.71$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )

$$\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{NO}_5 \times 0.85 \text{ H}_2\text{O} \quad [386.74]$$

		% C	% H	% N
275	berechnet	65.22	6.96	3.62
	gefunden	65.39	7.19	3.52

<sup>1</sup>H-NMR (Gemisch aus Diastereomeren und Rotameren, 200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 8.14-8.01 (m, 1 H),


280	7.30-7.09 (m, 2 H), 6.51 (s, 1 H), 6.22-5.97 (m, 1 H), 5.85-5.61 (m, 1 H), 5.38 und 4.77 (d, $J = 15.7$ Hz, 1 H), 4.49 (bs, 1 H), 4.37-4.01 (m, 2 H), 3.93-3.74 (m, 5 H), 3.71-3.10 (m, 1 H), 2.79-2.58 (m, 1 H), 2.41 (s, 2 H), 2.32 (d, $J = 10.2$ Hz, 3 H), 2.25-1.74 (m, 3 H); $^{13}\text{C}$ -NMR (Gemisch aus Diastereomeren und Rotameren, 50 MHz, $\text{CDCl}_3$ ): $\delta$ 162.5 (d), 161.7 (d), 143.7 (s), 143.6 (s), 143.3 (d), 142.7 (d), 129.9 (s), 129.6 (s), 127.8 (d), 127.6 (d), 126.0 (s), 125.7 (s), 114.6 (d), 114.4 (d), 87.5 (d), 87.4 (d), 68.2 (d),
285	68.0 (t), 56.1 (q), 56.0 (q), 49.2 (s), 49.0 (s), 48.7 (t), 46.7 (t), 43.2 (t), 41.2 (t), 38.7 (t), 37.2 (t), 37.1 (t).

34.8 (f), 19.7 (q), 19.4 (q), 18.9 (q)



Beispiel 87

[(±)-(4α,8αR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1,11-dimethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-on, 1-Methylnarwedien (MH-22)



5.34 g (14.4 mmol)  
25.2 ml (25.2 mmol) = 1.75 eq.  
20 ml

1-Methyl-N-formylnarwedinketal (XX)  
Lithiumaluminiumhydrid 1M in THF  
abs. THF

295

300

305

310

1-Methyl-N-formylnarwedien (V) wurde in abs. THF gelöst und unter Rühren Lithiumaluminiumhydrid portionsweise zugegeben. Nach 15 min wurde das Reaktionsgemisch mit 10 ml Toluol versetzt, dann mit 1.5 ml Wasser hydrolysiert und nach Zugabe von 1.5 ml Natronlauge (15% in Wasser) 15 min gerührt. Nach Zugabe von 1.5 g Hyflo wurde 1 h auf Rückfluß erhitzt, abfiltriert, der Filterkuchen 3 x mit je 10 ml Toluol : THF = 1:1 aufgekocht und jeweils abgesaugt. Die organischen Phasen wurden zur Trockene eingedunstet, mit 25 ml 4N HCl aufgenommen und 25 min bei 60°C gerührt, dann mit Ethylacetat erschöpfend extrahiert. Die gesammelten organischen Phasen wurden mit verdünnter HCl rückgewaschen. Die gesammelten sauren, wäßrigen Phasen wurden durch Destillation von überschüssigem Ethylacetat befreit, dann mit konz. aq. Ammoniak basisch gestellt und mit Chloroform erschöpfend extrahiert. Die gesammelten Chloroformphasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Die Reinigung erfolgte durch Umkristallisieren aus Diisopropylether : Ethylacetat = 9:1.

Ausbeute: 4.01 g (13.36 mmol = 93% d. Th.) hellgelbe, sehr feine Nadeln

$C_{18}H_{21}NO_3$  [299.37]

DC:  $R_f = 0.43$  ( $CHCl_3$  : MeOH = 95:5)

315 M.p.: 121-122°C


	% C	% H	% N
berechnet	72.22	7.07	4.68

320 gefunden 71.95 7.08 4.57  
<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 7.01 (dd, J = 10.4, 1.6 Hz, 1 H), 6.56 (s, 1 H), 5.99 (d, J = 10.4 Hz, 1 H), 4.68–4.62 (m, 1 H), 3.97 (d, J = 15.7 Hz, 1 H), 3.80 (s, 3 H), 3.79 (d, J = 15.7 Hz, 1 H), 3.22–2.95 (m, 3 H), 2.71 (dd, J = 17.8, 3.7 Hz, 1 H), 2.44 (s, 3 H), 2.23 (s, 3 H), 2.20–2.01 (m, 1 H), 1.87 (dt, J = 13.8, 3.4 Hz, 1 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 194.4 (s), 145.2 (s), 142.9 (s), 131.0 (s), 128.9 (s), 126.8 (d + d + s), 114.3 (d), 87.7 (d), 55.9 (q), 55.8 (t), 54.1 (t), 48.9 (s), 43.5 (q), 37.1 (t), 33.4 (t), 19.4 (q)

325

# Beispiel 88

[[±)-(4αα,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1,11-dimethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methylgalanthamin (MH-30)



330

170 mg (0.57 mmol)  
 0.70 ml (0.68 mmol) = 1.2 eq.  
 5 ml

1-Methyl-Narwedine (XXI)  
 L-Selectride® 1M in THF  
 absolutes THF

335

Das Edukt wurde unter N<sub>2</sub>-Atmosphäre in THF vorgelegt und auf -25°C abgekühlt, dann wurde langsam L-Selectride zugetropft. Es wurde 30 min bei -15°C gerührt, wobei die anfängliche Suspension zu einer klaren Lösung wurde. Anschließend wurde das Reaktionsgemisch über 1 h auf Raumtemperatur gebracht, mit 5 Tropfen Wasser hydrolysiert, 30 min gerührt, 0.5 ml konz. aq. NH<sub>4</sub>OH zugegeben, weitere 10 min gerührt, wieder 2 ml konz. NH<sub>4</sub>OH zugegeben und schließlich mit Methylenchlorid extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen, wobei 350 mg Rohprodukt entstanden. Dieses Rohprodukt wurde über eine Kieselgelsäule (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1) gereinigt, wobei ein gelbes Öl entstand, welches durch Zugabe von Ether erstarrte.

340

345

Ausbeute: 120 mg (0.398 mmol = 70% d. Th.) farbloses Pulver

C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub> [301.39]

350

DC: R<sub>f</sub> = 0.43 (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 95:5), nicht von Edukt zu trennen

:55


**Herstellung des Hydrobromids:** Die Reaktionslösung wird mit Ethanol (ca. halbes Reaktionsvolumen) hydrolysiert, 30 min gerührt, dann mit konz. HBr auf pH  $\leq 1$  gebracht und über Nacht gerührt. Der entstandene Niederschlag wird abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und getrocknet.



370


	% C	% H	% N
berechnet	55.25	6.44	3.58
gefunden	55.21	6.39	3.56

## 375

380

Das Edukt wurde in der Hitze in Methanol gelöst und dann auf 0°C abgekühlt,  $\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

- 385 zugegeben und etwa 30-60 min bei 0°C gerührt. Anschließend wurde portionsweise  $\text{NaBH}_4$  zugeben, weitere 2 h bei 0-5°C gerührt, wobei sich ein Niederschlag bildete. Das Reaktionsgemisch wurde mit 5 ml 2N HCl hydrolysiert, Methanol im Vakuum abdestilliert, der Rückstand mit weiteren 150 ml 2N HCl aufgenommen, mit konz.  $\text{NH}_4\text{OH}$  basisch gemacht (violetter Niederschlag), mit Ethylacetat extrahiert, die gesammelten organischen Phasen mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Als Rohprodukt entstand ein Isomerengemisch von 1-Methylepigalanthamin und 1-Methylgalanthamin im Verhältnis von ca. 5:1, welches chromatographisch getrennt werden konnte (Kieselgel,  $\text{CHCl}_3$  :  $\text{MeOH}$  = 9:1 + 0.5%  $\text{NH}_4\text{OH}$ ).
- 395 Ausbeute: 1.34 g (4.45 mmol = 66.6% d. Th.) farbloses Öl



DC:  $R_f$  = 0.20 ( $\text{CHCl}_3$  :  $\text{MeOH}$  = 9:1)


400

$^1\text{H-NMR}$  (200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.51 (s, 1 H), 6.10 (d,  $J$  = 10.2 Hz, 1 H), 5.79 (d,  $J$  = 10.2 Hz, 1 H), 4.69-4.56 (m, 1 H), 4.55 (bs, 1 H), 3.96 (d,  $J$  = 15.3 Hz, 1 H), 3.82 (s, 3 H), 3.79 (d,  $J$  = 15.3 Hz, 1 H), 3.21 (td,  $J$  = 13.1, 1.7 Hz, 1 H), 2.97 (dt,  $J$  = 14.1, 3.3 Hz, 1 H), 2.75 (dddd,  $J$  = 14.1, 5.3, 4.0, 1.2 Hz, 1 H), 2.38 (s, 3 H), 2.23 (s, 3 H), 2.10 (dd,  $J$  = 13.1, 3.2 Hz, 1 H), 2.03 (bs, 1 H), 1.69 (ddd,  $J$  = 13.6, 10.7, 2.6 Hz, 2 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  145.0 (s), 142.9 (s), 133.5 (s), 131.7 (d), 128.5 (s), 126.7 (d), 126.6 (s), 113.5 (d), 88.3 (d), 63.1 (d), 55.8 (q), 55.2 (t), 54.1 (t), 48.3 (s), 42.6 (q), 34.6 (t), 32.4 (t), 19.5 (q)

405

- 410 Herstellung des Hydrobromids: Das gewonnene 1-Methylepigalanthamin wurde in Ethanol aufgenommen und mit konz. HBr auf pH  $\leq$  1 gebracht. Das Hydrobromid wurde in der Kälte zur Kristallisation gebracht und der entstandene Niederschlag abgesaugt, mit kaltem Ethanol gewaschen und getrocknet.


- 415 M.p.: 254-255°C (Hydrobromid)



	% C	% H	% N
berechnet	56.25	6.44	3.58
420 gefunden	56.28	6.21	3.57


Beispiel 90

425 **[(±)-(4α,6α,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-demethylepigalanthamin**



**Methode A (Epimerisierung von 1-Methyl-N-demethylgalanthamin (XXII))**

Schritt 1 (Acetylierung): [(±)-(4α,6α,8αR\*)]-6-O-Acetyloxy-4α,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-1-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin (MH-67)



435

100 mg (0.35 mmol)	1-Methyl-N-demethylgalanthamin (XXII)
0.50 ml (1.74 mmol) = 5 eq.	N,N-Dimethylformamid-bis(2,2-dimethylpropyl)-acetal
0.10 ml (1.74 mmol) = 5 eq.	Eisessig
12 ml	Toluol

440

Das Edukt wurde in 10 ml Toluol unter N<sub>2</sub>-Atmosphäre auf 80°C erhitzt und über 1 h ein Gemisch aus N,N-Dimethylformamid-bis-(2,2-dimethylpropyl)acetal und Eisessig in 2 ml Toluol zugetropft. Nach 22 h auf 80°C wurde die erkaltete Toluolphase 1 x mit Wasser dann mit 2 N Salzsäure extrahiert, die sauren, wäßrigen Phasen mit konzentrierter Ammoniaklösung basisch gemacht, mit Ethylacetat extrahiert, die organischen Phasen mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Der Rückstand wurde

445

säulenchromatographisch gereinigt  
(CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 95:5).

450 Ausbeute: 45 mg (0.14 mmol = 39% d. Th.) farbloses Öl

C<sub>19</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>4</sub> [329.40]


DC: R<sub>f</sub> = 0.20 (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 95:5)

455

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.50 (s, 1 H), 6.14 (d, J = 10.2 Hz, 1 H), 5.72 (d, J = 10.2 Hz, 1 H), 5.67-5.58 (m, 1 H), 4.57 (bs, 1 H), 4.24 (d, J = 16.0 Hz, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.75 (d, J = 16.0 Hz, 1 H), 3.40-3.09 (m, 2 H), 2.90-2.70 (m, 1 H), 2.23 (s, 3 H), 2.07 (s, 3 H), 2.01-1.73 (m, 3 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 170.2 (s), 145.3 (s), 142.8 (s), 133.0 (s), 130.5 (s), 128.4 (d), 127.2 (d), 127.0 (s), 113.5 (d), 87.3 (d), 66.4 (d), 55.8 (q), 48.8 (s + t), 47.1 (t), 40.4 (t), 28.2 (t), 21.1 (q), 19.4 (q)

460

Schritt 2: Esterhydrolyse (MH-78)



465

17 mg (0.05 mmol) 6-O-Acetyl-1-methyl-N-demethylepigalanthamin (XXIIa)  
0.5 ml Methanol  
0.1 ml 2N KOH  
470 17 mg (0.12 mmol) = 2.4 eq. Kaliumcarbonat

Die Reagenzien wurden zusammen bei Raumtemperatur gerührt. Nach Ende der Reaktion wurde mit 1 ml Wasser versetzt, Methanol abgezogen, mit 4 ml 2 N Salzsäure angesäuert, die wäßrige Phase mit Ethylacetat gewaschen, dann mit konzentrierter wässriger Ammoniaklösung basisch gemacht und mit Ethylacetat extrahiert. Die organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen.


475

C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>3</sub> [287.36]

480

DC:  $R_f = 0.07$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )

**Methode B (Demethylierung von 1-Methylepigalanthamin) (MH-94)**



0.80 g (2.65 mmol)	1-Methylepigalanthamin (XXIII)
1.50 g (6.63 mmol) = 2.5 eq.	Azodicarbonsäure-bis(2-methyl-2-propylester)
80 ml	Tetrahydrofuran

Die Reagenzien wurden zusammen bei Raumtemperatur 24 h gerührt, dann das Lösungsmittel abgezogen. Der Rückstand wurde in Trifluoressigsäure in Methylenchlorid aufgenommen, 30 min gerührt, im Eisbad mit konzentrierter wässriger Ammoniaklösung basisch gemacht und mit Methylenchlorid extrahiert. Die organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Das Rohprodukt wurde säulenchromatographisch gereinigt ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ ).


Ausbeute: 400 mg (1.39 mmol = 53% d. Th.) farbloses Öl

$\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_3$  [287.36]

DC:  $R_f = 0.10$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )

$^1\text{H-NMR}$  (200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.50 (s, 1 H), 6.08 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1H), 5.80 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1 H), 4.70-4.62 (m, 1 H), 4.57 (bs, 1 H), 4.26 (d,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.75 (d,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 3.35-3.20 (m, 1 H), 2.85-2.70 (m, 1 H), 2.50-2.29 (m, 2 H), 2.23 (s, 3 H), 2.00-1.64 (m, 2 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  145.4 (s), 142.9 (s), 133.5 (s), 131.6 (d), 130.7 (s), 127.2 (d), 126.8 (s), 113.3 (d), 88.2 (d), 63.1 (d), 55.9 (q), 48.9 (t), 48.8 (s), 47.2 (t), 32.2 (t), 28.2 (t), 19.5 (q)

**Allgemeine Arbeitsvorschrift für quartäre 1-Methyl- und 1-Methylepi-galanthaminderivate**  
(Beispiele 90 - 99)



515


Das Edukt wurde in sehr wenig DMF gelöst\*, das Alkylhalogenid zugegeben und das Reaktionsgemisch erhitzt (generell nicht über die Siedetemperatur des Alkylhalogenids, maximal aber 70°C). Mittels DC wurde das Ende der Reaktion bestimmt, dann das Reaktionsgemisch langsam unter Rühren auf Ether getropft (ölt in manchen Fällen leicht aus), der Niederschlag abgesaugt und mit Ether gewaschen. Zur Reinigung und zum Entfernen von restlichem DMF wurde der Niederschlag in Ethanol gelöst und abermals in Ethylacetat ausgefällt, dann im Vakuumtrockenschrank bei 50°C getrocknet.

525 DC:  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ ,  $R_f$  generell knapp über dem Start.

**Beispiel 90**

**[(±)-(4α,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(2-methyl-2-propenyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Chlorid (MH-33)**

530



280 mg (0.94 mmol)  
0.30 ml (3.08 mmol) = 3 eq.  
5.00 ml

535

1-Methylgalanthamin (XV)  
1-Chlor-2-methylprop-2-en  
Dimethylformamid

Die Reaktion wurde bei 70°C durchgeführt und nach 2 h aufgearbeitet, indem das

\* Bei  $R = \text{CH}_2\text{Cl}$  dient Methylenchlorid (p.A. 99.5%) als Lösungsmittel und Reagens.



40 Ausbeute: 270 mg (0.69 mmol = 73% d. Th.) farbloses Pulver


DC:  $R_f = 0.10$  (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)  
545 M.p.: 239-241°C

		% C	% H	% N
	berechnet	63.34	7.92	3.36
550	gefunden	63.22	7.85	3.59

555

**[[±]-(4αα,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(2-propinyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid (MH-38)**

560



1-Methylgalanthamin (XV)

3-Brom-1-propin (Propargylbromid)

Dimethylformamid

570 Ausbeute: 300 mg (0.71 mmol = 62% d. Th.) beiges Pulver

$C_{21}H_{26}BrNO_3$  [420.35]

DC:  $R_f = 0.09$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )

575 M.p.: 216-218°C


$C_{21}H_{26}BrNO_3 \times 0.35 H_2O \times 0.25 C_3H_7NO$  [444.93]

	% C	% H	% N
berechnet	58.72	6.44	3.90
580 gefunden	58.70	6.37	3.94

$^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $DMSO-d_6$ ):  $\delta$  144.8 (s), 144.7 (s), 133.4 (s), 131.0 (s), 125.2 (d), 115.3 (s), 114.5 (d), 86.2 (d), 83.7 (d), 72.6 (t), 60.6 (t), 59.7 (d), 55.6 (q), 46.2 (s), 43.0 (q), 31.0 (t), 18.8 (q)

585 Beispiel 92

[[ $\pm$ ]- $(4\alpha,6\beta,8\alpha^*)$ ]-4 $\alpha,5,9,10,11,12$ -Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-phenylmethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid (MH-39)



590

242 mg (0.80 mmol)

1-Methylgalanthamin (XV)

0.25 ml (1.01 mmol) = 1.4 eq. Benzylbromid

4.00 ml Dimethylformamid

595 Die Reaktion wurde bei 60°C durchgeführt und nach 10 min aufgearbeitet.

Ausbeute: 262 mg (0.55 mmol = 69% d. Th.) beiges Pulver

$C_{25}H_{30}BrNO_3$  [472.42]

600

DC:  $R_f = 0.08$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )

M.p.: 246-248°C

% C	% H	% N
-----	-----	-----


15	berechnet	63.56	6.40	2.96
	gefunden	63.35	6.34	2.93

$^{13}\text{C}$ -NMR (50 MHz, DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  144.7 (s), 133.4 (d), 130.7 (s), 130.4 (d), 129.0 (d), 128.1 (s), 114.5 (d), 86.3 (d), 59.7 (t), 59.5 (d), 55.6 (q), 46.2 (s), 18.6 (q)

10

### Beispiel 93

[( $\pm$ )-(4 $\alpha\alpha$ ,6 $\beta$ ,8 $\alpha\text{R}^*$ )]-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11,11-trimethyl-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepinium, Iodid (MH-83)



(XLII)

615

140 mg (0.46 mmol)

198 mg (1.39 mmol) = 3 eq.

4.00 ml

1-Methylgalanthamin (XV)

Methyliodid

Dimethylformamid

620

Die Reaktion wurde bei 40°C

durchgeführt und nach 1.5 h aufgearbeitet, indem das Reaktionsgemisch auf 30 ml Diethylether getropft wurde.

Ausbeute: 146 mg (0.54 mmol = 71% d. Th.) hellbraunes Pulver

$\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{INO}_3$  [443.32]

DC:  $R_f = 0.05$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )

630 M.p.: 278-280°C

$\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{INO}_3 \times 0.3 \text{ H}_2\text{O}$  [448.72]

		% C	% H	% N
	berechnet	50.86	5.97	3.12
635	gefunden	50.57	5.85	3.43


$^{13}\text{C}$ -NMR (50 MHz, DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  144.6 (s), 144.1 (s), 132.8 (s), 131.6 (s), 114.2 (d), 86.3 (d), 62.6 (t), 59.5 (d), 55.4 (q), 45.9 (s), 31.0 (t), 18.4 (q)

640

Beispiel 94

[(±)-(4αα,6α,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(2-methyl-2-propenyl)-6H-benzofuro[3α,3,2-ef][2]benzazepinium, Chlorid (MH-66)

645



650

150 mg (0.50 mmol)  
45.0 mg (1.50 mmol) = 3 eq.  
4.00 ml

1-Methylepigalanthamin (XXIII)  
1-Chlor-2-methylprop-2-en  
Dimethylformamid

Die Reaktion wurde bei 70°C durchgeführt und nach 100 min aufgearbeitet, indem das Reaktionsgemisch auf 50 ml Diethylether getropft wurde.

655

Ausbeute: 160 mg (0.41 mmol = 82% d. Th.) farbloses Pulver

$C_{22}H_{30}ClNO_3$  [391.94]

DC:  $R_f = 0.09$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )

660

M.p.: 162-164°C

$C_{22}H_{30}ClNO_3 \times 0.7 H_2O \times 0.15 C_3H_7NO$  [415.51]

665

	% C	% H	% N
berechnet	64.90	7.87	3.88
gefunden	64.77	7.68	3.95

$^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $DMSO-d_6$ ):  $\delta$  144.7 (s), 134.2 (s), 134.1 (s), 131.1 (d), 127.5 (t), 114.4 (d), 87.3 (d), 73.0 (t), 60.7 (d), 59.4 (t), 55.6 (q), 46.3 (s), 23.8 (q), 18.9 (q)

670

## 0.

**[(±)-(4α,6α,8αR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(2-propynyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid (MH-71)**



150 mg (0.50 mmol)

$$180 \text{ mg (1.50 mmol)} = 3 \text{ eq.}$$

4.00 ml

1-Methylepigalanthamin (XXIII)

3-Brom-1-propin (Propargylbromid)

Dimethylformamid

680 Die Reaktion wurde bei 70°C durchgeführt und nach 2.5 h aufgearbeitet, indem das Reaktionsgemisch auf 30 ml Diethylether getropft wurde.

Ausbeute: 167 mg (0.40 mmol = 82% d. Th.) hellbraunes Pulver

685  $\text{C}_{21}\text{H}_{26}\text{BrNO}_3$  [420.35]

DC:  $R_f = 0.09$  (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)


M.p.: 158-162°C

<sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 144.8 (s), 133.9 (s), 131.2 (s), 114.5 (d), 87.2 (d), 83.7 (d), 72.6 (d), 55.6 (q), 46.3 (s), 31.9 (t), 18.8 (q)

640

Beispiel 96

695 **[(±)-(4α,6α,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(2-propenyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid (MH-72)**



150 mg (0.50 mmol)  
0.13 ml (1.50 mmol) = 3 eq.  
4.00 ml

1-Methylepigalanthamin (XXIII)  
3-Brom-1-propen (Allylbromid)  
Dimethylformamid

700

Die Reaktion wurde bei 60°C durchgeführt und nach 2 h aufgearbeitet.  
Ausbeute: 150 mg (0.36 mmol = 64% d. Th.) hellbraunes Pulver

$C_{21}H_{28}BrNO_3$  [422.36]

DC:  $R_f = 0.11$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )

705

M.p.: 140-145°C

$C_{21}H_{28}BrNO_3 \times 1 H_2O \times 0.25 C_3H_7NO$  [458.64]


	% C	% H	% N
berechnet	56.96	6.98	3.82
gefunden	56.69	6.65	4.05

710

$^{13}C$ -NMR (50 MHz, DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  144.7 (s), 134.5 (d), 134.0 (s), 131.1 (s), 128.3 (s), 126.1 (d), 115.3 (d), 114.4 (d), 87.2 (d), 60.7 (d), 59.8 (t), 55.6 (q), 46.3 (s), 31.5 (t), 18.8 (q)

Beispiel 97

715 **[(±)-(4α,6α,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(4-(trifluormethyl)phenylmethyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid (MH-75)**



150 mg (0.50 mmol) 1-Methylepigalanthamin (XXIII)  
 357 mg (1.50 mmol) = 1.4 eq. 4-Trifluormethyl-benzylbromid  
 4.00 ml Dimethylformamid

Die Reaktion wurde bei 70°C durchgeführt und nach 1 h aufgearbeitet.

Ausbeute: 142 mg (0.26 mmol = 53% d. Th.) hellgelbes Pulver

$C_{26}H_{29}BrF_3NO_3$  [540.42]


DC:  $R_f = 0.10$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )

M.p.: 178-182°C

$^{13}C$ -NMR (50 MHz, DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  144.8 (s), 134.4 (d + d), 134.2 (d), 132.6 (s), 131.2 (s), 130.9 (s), 130.3 (s), 126.6 (d), 125.8 (s), 121.2 (d), 114.5 (d), 87.3 (d), 60.8 (d), 55.6 (q), 46.3 (s), 34.3 (t), 18.7 (q)

#### Beispiel 98

[[ $\pm$ )-(4 $\alpha$ ,6 $\alpha$ ,8 $\alpha$ R\*)]-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-11-(phenylmethyl)-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid (MH-76)



153 mg (0.51 mmol) 1-Methylepigalanthamin (XXIII)  
 92 mg (0.51 mmol) Benzylbromid  
 4.00 ml Dimethylformamid

Die Reaktion wurde bei 70°C durchgeführt und nach 3 h aufgearbeitet.

Ausbeute: 150 mg (0.32 mmol = 63% d. Th.) hellbraunes Pulver

$C_{25}H_{30}BrNO_3$  [472.42]

DC:  $R_f = 0.11$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )


M.p.: 169-175°C

<sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 144.6 (s), 134.1 (s), 133.4 (d), 131.0 (s), 130.4 (d), 128.9 (d), 128.1 (s), 114.4 (d), 87.2 (d), 61.8 (d), 59.4 (t), 55.6 (q), 46.3 (s), 31.5 (t), 18.6 (q)

755

# Beispiel 99

[(±)-(4α,6α,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11,11-trimethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Iodid (MH-81)



760

210 mg (0.70 mmol)  
290 mg (2.10 mmol) = 3 eq.  
4.00 ml

1-Methylepigalanthamin (XXIII)  
Methyliodid  
Dimethylformamid

765

Die Reaktion wurde bei 70°C durchgeführt und nach 2 h aufgearbeitet, indem das Reaktionsgemisch auf 30 ml Diethylether getropft wurde.

Ausbeute: 240 mg (0.54 mmol = 77% d. Th.) hellbraunes Pulver

770

C<sub>19</sub>H<sub>26</sub>INO<sub>3</sub> [443.32]

DC: R<sub>f</sub> = 0.05 (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)

M.p.: Zersetzung >280°C

775

	% C	% H	% N
berechnet	51.48	5.91	3.16
gefunden	51.25	5.75	3.32

<sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>): δ 144.7 (s), 133.6 (s), 131.1 (s), 114.4 (d), 87.1 (d), 62.2 (t), 60.7 (q),

55.5 (q), 48.4 (d), 46.2 (s), 31.5 (t), 18.9 (q)

780




# Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Herstellung von Galanthamin-N-Oxiden (Beispiel 100-101)

	1 eq.	Galanthaminderivat
785	1-1.5 eq.	3-Chlorperbenzoesäure
	100 ml	Chloroform / 1 g Galanthaminderivat
	0.7 ml	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (35%) / 1 g Galanthaminderivat

790 Die 3-Chlorperbenzoesäure wird in 1/3 Chloroform gelöst, mit Wasserstoffperoxid versetzt und 2 Minuten gerührt. Anschließend wird diese Lösung zu einer Lösung des Galanthaminderivats in 2/3 Chloroform hinzugefügt, 15 Minuten gerührt, eingengt und mittels Säulenchromatographie gereinigt (Gradient: CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1 → MeOH)

## 795 Beispiel 101

[4aS-(4αa,6α,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 11-oxid, Epigalanthamin-N-oxid (PI-23)



49.7 mg (0.17 mmol)

29.9 mg (0.17 mmol)

0.03 ml

5 ml

Epigalanthamin (26)

3-Chlorperbenzoesäure

Wasserstoffperoxid (35%)

Chloroform

805

Ausbeute: 37 mg (71% d. Th.)


C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>4</sub> [303.36]

810 DC: R<sub>f</sub> = 0.05 (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)  
H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.67 (s, 2 H), 5.96 (bs, 2 H), 4.78 (d, J = 15.0 Hz, 1 H), 4.67-4.50 (m, 2 H), 4.26 (d, J = 15.0 Hz, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.67-3.41 (m, 2 H), 3.41 (s, 2 H), 2.96 (s, 3 H), 2.77 (d†, J = 13.1, 3.7 Hz, 1 H), 2.05 (bs, 1 H), 1.74 (t, J = 11.3 Hz, 1 H)

- 815  $^{13}\text{C}$ -Spektren konnten aufgrund der raschen Solvatbildung und Kristallisation in Chloroform nicht aufgenommen werden, der Strukturbeweis konnte jedoch durch Röntgenkristallographie erbracht werden.

**Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Herstellung von N-substituierten 1-Methylgalanthaminderivaten  
(Beispiel 102 - 106)**

20



200 mg (0.70 mmol)

1-Methyl-N-demethylgalanthamin  
(bzw. -epigalanthamin)

192 mg (1.39 mmol) = 2 eq.

Kaliumcarbonat

117 mg (0.78 mmol) = 1.1 eq.

Natriumiodid

(0.84 mmol) = 1.2 eq.

substituiertes Alkylhalogenid

10 ml

Aceton, getrocknet über 4 Å Molsieb

830


Natriumiodid, Kaliumcarbonat und Edukt wurden gut in einer Reibschale verrieben, das Gemisch zusammen mit einigen Glaskügelchen im Kolben vorgelegt und in abs. Aceton suspendiert. Das substituierte Alkylhalogenid wurde zudosiert und das Reaktionsgemisch auf Rückfluß erhitzt. Nach Ende der Reaktion wurde das Reaktionsgemisch im Vakuum zur Trockene eingedampft und der Rückstand mit 2N HCl aufgenommen, die wäßrige Phase mit Ethylacetat gewaschen, dann mit konz. aq. Ammoniak basisch gemacht und wiederum mit Ethylacetat extrahiert. Die gesammelten organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Das Rohprodukt wurde über eine Kieselgelsäule gereinigt (Laufmittel:  $\text{CHCl}_3$  : MeOH = 9:1 + 1%  $\text{NH}_4\text{OH}$ ).

835

**Beispiel 102**

840

**[(±)-(4α,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-11-(2-propenyl)-6H-benzofuro[3α,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-allylgalanthamin (MH-25)**



845 200 mg (0.70 mmol)

1-Methyl-N-demethylgalanthamin (XXII)

0.07 ml (0.84 mmol) = 1.2 eq. 1-Brom-2-propen (Allylbromid)

Nach 10 h wurde die Reaktion aufgearbeitet.

850 Ausbeute: 50 mg (0.15 mmol = 22% d. Th.) gelbes Öl

$C_{20}H_{25}NO_3$  [327.43]

DC:  $R_f = 0.17$  ( $CHCl_3$ : MeOH = 9:1 + 1%  $NH_4OH$ )

855

$C_{20}H_{25}NO_3 \times 0.8 H_2O$  [341.83]

	% C	% H	% N
berechnet	70.27	7.84	4.10
gefunden	70.18	7.60	4.05


860  $^1H$ -NMR (200 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.52 (s, 1 H), 6.12 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1 H), 6.03-5.78 (m, 2 H), 5.18 (bs, 1 H), 5.11 (d,  $J = 4.5$  Hz, 1 H), 4.57 (bs, 1 H), 4.12 (bs, 1 H), 4.09 (d,  $J = 15.0$  Hz, 1 H), 3.81 (s, 3 H), 3.78 (d,  $J = 15.0$  Hz, 1 H), 3.32-3.02 (m, 4 H), 2.72-2.58 (m, 1 H), 2.21 (s, 3 H), 2.07-1.89 (m, 2 H), 1.57 (ddd,  $J = 13.7, 3.4, 2.7$  Hz, 1 H);  $^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  144.0 (s), 143.0 (s), 136.0 (d), 133.6 (s), 129.1 (s), 127.4 (d), 127.2 (d), 126.9 (s), 117.5 (t), 113.7 (d), 88.4 (d), 62.0 (d), 57.2 (t), 55.8 (q), 52.9 (t), 52.0 (t), 48.4 (s), 33.9 (t), 29.8 (t), 19.4 (q)

865

### Beispiel 103

$[(\pm)-(4\alpha\alpha,6\beta,8\alpha R^*)]-4\alpha,5,9,10,11,12$ -Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-11-(phenylmethyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-benzylgalanthamin (MH-26)

870



200 mg (0.70 mmol) 1-Methyl-N-demethylgalanthamin (XXII)  
0.1 ml (0.84 mmol) = 1.2 eq. Brommethylbenzol (Benzylbromid)

875

Nach 24 h wurde die Reaktion aufgearbeitet.

Ausbeute: 140 mg (0.37 mmol = 53% d. Th.) gelbes Öl

880  $\text{C}_{24}\text{H}_{27}\text{NO}_3$  [377.48]


DC:  $R_f = 0.36$  (CHCl<sub>3</sub>: MeOH = 9:1 + 1% NH<sub>4</sub>OH)

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 7.30 (m, 5 H), 6.50 (s, 1 H), 6.16 (d, *J* = 10.2 Hz, 1 H), 5.99 (dd, *J* = 10.2, 4.9 Hz, 1 H), 4.61 (bs, 1 H), 4.13 (bs, 1H), 4.00 (d, *J* = 15.7 Hz, 1 H), 3.82 (s, 3 H), 3.81 (d, *J* = 15.7 Hz, 1 H), 3.69 (s, 2H), 3.34 (td, *J* = 14.1, 12.4, 1.8 Hz, 1 H), 3.13 (td, *J* = 14.1, 3.5 Hz, 1 H), 2.74-2.37 (m, 2 H), 2.19-1.93 (m, 2 H), 1.90 (s, 3 H), 1.57 (dt, *J* = 13.7, 3.0 Hz, 1 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 143.9 (s), 143.0 (s), 138.9 (s), 133.6 (s), 129.2 (s), 128.7 (d), 128.2 (d), 127.4 (d), 127.3 (d), 127.2 (s), 126.9 (d), 113.7 (d), 88.4 (d), 62.0 (d), 57.4 (t), 55.8 (q), 52.4 (t), 52.2 (t), 48.5 (s), 33.7 (t), 29.8 (t), 19.1 (q)

890 Beispiel 104



**[(±)-(4αα,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-11-(2-(4-morpholinyl)ethyl)-6H-benzofuro[3α,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-morpholinoethyl-galanthamin (MH-28)**



895

200 mg (0.70 mmol)

155 mg (0.84 mmol) = 1.2 eq

1-Methyl-N-demethylgalanthamin (XXII)

4-(2-chlorethyl)morpholin Hydrochlorid

Nach 24 h wurde die Reaktion aufgearbeitet.

900

Ausbeute: 210 mg (0.52 mmol = 75% d. Th.) gelbes Öl

C23H32N2O4 [400.52]

905 — DC: —  $R_f = 0.51$  — — — — — (CHCl<sub>3</sub>: MeOH = 9:1 + 1% NH<sub>4</sub>OH).

$$\text{C}_{23}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{O}_4 \times 0.9 \text{ H}_2\text{O} [416.72]$$

% C	% H	% N
-----	-----	-----


berechnet	66.29	8.17	6.72
-----------	-------	------	------

910	gefunden	66.28	8.09	6.85
-----	----------	-------	------	------

915 <sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.52 (s, 1 H), 6.10 (d, J = 10.3 Hz, 1 H), 5.97 (dd, J = 10.3, 4.8 Hz, 1 H), 4.55 (bs, 1 H), 4.13 (bs, 1 H), 4.12 (d, J = 15.9 Hz, 1 H), 3.88 (d, J = 15.9 Hz, 1 H), 3.81 (s, 3 H), 3.75-3.65 (m, 4 H), 3.30 (ddd, J = 14.3, 12.4, 2.0 Hz, 1 H), 3.10 (dt, J = 14.3, 3.3 Hz, 1 H), 2.76-2.58 (m, 4 H), 2.55-2.41 (m, 5 H), 2.25 (s, 3 H), 2.08-1.90 (m, 2 H), 1.55 (dd, J = 13.7, 2.8 Hz, 1 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 144.1 (s), 143.0 (s), 133.5 (s), 128.9 (s), 127.4 (d), 127.1 (d), 126.9 (s), 113.7 (d), 88.4 (d), 66.7 (t + t), 66.6 (t), 61.9 (d), 57.1 (t), 55.8 (q), 54.0 (t + t), 53.4 (t), 52.0 (t), 48.4 (s), 33.4 (t), 29.8 (t), 19.4 (q)

920 Beispiel 105

[[±]-(4α,6β,8αR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-11-(3-(1-piperidinyl)propyl)-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-piperidinopropyl-galanthamin (MH-29)



925

200 mg (0.70 mmol) 1-Methyl-N-demethylgalanthamin (XXII)  
166 mg (0.84 mmol) = 1.2 eq. 1-(3-Chloropropyl)piperidin Hydrochlorid

930 Nach 24 h wurde die Reaktion aufgearbeitet.

Ausbeute: 180 mg (0.44 mmol = 63% d. Th.) gelbes Öl

C<sub>25</sub>H<sub>36</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [412.58]

935

DC: R<sub>f</sub> = 0.27 (CHCl<sub>3</sub>: MeOH = 9:1 + 1% NH<sub>4</sub>OH)

C<sub>25</sub>H<sub>36</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> x 0.50 H<sub>2</sub>O [421.58]


	% C	% H	% N
940 berechnet	71.23	8.85	6.64
gefunden	71.33	8.97	6.60

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.52 (s, 1 H), 6.10 (d, J = 10.4 Hz, 1 H), 5.96 (dd, J = 10.4, 4.7 Hz, 1 H),

4.55 (bs, 1 H), 4.12 (bs, 1 H), 4.08 (d,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 3.83 (d,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 3.81 (s, 3 H), 3.24 (ddd,  $J = 14.2, 12.2, 2.0$  Hz, 1 H), 3.07 (dt,  $J = 14.2, 3.5$  Hz, 1 H), 2.71-2.13 (m, 10 H), 2.24 (s, 3 H), 2.07-1.88 (m, 2 H), 1.77-1.35 (m, 9 H);  $^{13}\text{C}$ -NMR (50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  144.0 (s), 142.9 (s), 133.5 (s), 128.9 (s), 127.3 (d + d), 127.2 (s), 113.7 (d), 88.4 (d), 62.0 (d), 57.2 (t), 55.8 (q), 54.5 (t + t + t), 53.3 (t), 51.4 (t), 48.5 (s), 33.4 (t), 29.8 (t), 25.7 (t + t), 25.0 (t), 24.2 (t), 19.5 (q)

Beispiel 106

[[ $\pm$ -(4 $\alpha\alpha$ ,6 $\alpha$ ,8 $\alpha$ R\*)]-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-1-methyl-11-(3-(1-piperidinyl)propyl)-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1-Methyl-N-piperidinopropyl-epigalanthamin (MH-117)]



955

100 mg (0.35 mmol)

83 mg (0.42 mmol) = 1.2 eq.

1-Methylepigalanthamin (XXIV)

(1-(3-Chlorpropyl)piperidin Hydrochlorid

Nach 28 h wurde die Reaktion aufgearbeitet.

960

Ausbeute: 60 mg (0.15 mmol = 42% d. Th.) hellgelbes Öl

$\text{C}_{25}\text{H}_{36}\text{N}_2\text{O}_3$  [412.58]


965

DC:  $R_f = 0.12$  ( $\text{CHCl}_3$ : MeOH = 9:1)

$^1\text{H}$ -NMR (200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.50 (s, 1 H), 6.10 (d,  $J = 10.2$  Hz, 1 H), 5.78 (dd,  $J = 10.2$ , 1 H), 4.70-4.57 (m, 1 H), 4.54 (bs, 1 H), 4.05 (d,  $J = 15.2$  Hz, 1 H), 3.82 (d,  $J = 15.2$  Hz, 1 H), 3.82 (s, 3 H), 3.25 (ddd,  $J = 13.5, 12.8, 1.6$  Hz, 1 H), 3.09 (dt,  $J = 13.5, 2.5$  Hz, 1 H), 2.75 (dt,  $J = 13.7, 4.1$  Hz, 1 H), 2.56-2.27 (m, 8 H), 2.23 (s, 3 H), 2.08 (td,  $J = 13.1, 4.0$ , 2H), 1.81-1.38 (m, 9 H);  $^{13}\text{C}$ -NMR (50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  144.9 (s), 142.7 (s), 133.4 (s), 131.3 (s), 128.3 (d + d), 127.0 (s), 113.3 (d), 88.1 (d), 63.0 (d), 57.2 (t), 55.7 (q), 54.4 (t + t + t), 53.1 (t), 51.6 (t), 48.4 (s), 33.1 (t), 29.5 (t), 25.6 (t + t), 24.8 (t), 24.1 (t), 19.5 (q)

970

**Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Herstellung von Galanthaminiumbromid-Derivaten (Beispiel 107-109)**




- 980 1 eq. Galanthaminderivat  
 1 eq. N-Bromsuccinimid  
 50 ml Methylenchlorid oder Chloroform, dest. über P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> / 1 g  
 Galanthaminderivat

985 Das Edukt wird im Lösungsmittel gelöst und unter Rühren N-Bromsuccinimid zugegeben. Es bildet sich sofort ein Niederschlag, der nach einer entsprechenden Zeit abgesaugt, gewaschen und trockengesaugt wird.  
 Die so gewonnenen Produkte sind in der Regel sehr rein, wichtig ist jedoch die eher große Menge an Lösungsmittel, da sonst Succinimid in die Substanzen eingeschleppt wird und diese nachträglich schwer zu reinigen sind.

990

**Beispiel 107**

**[4aS-(4aα,6β,8aR\*)]-4a,5,9,10-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid, Galanthaminiumbromid (MH-119)**



995

200 mg (0.7 mmol)  
 124 mg (0.7 mmol)  
 10 ml

Galanthamin (1)  
 N-Bromsuccinimid  
 Methylenchlorid oder Chloroform, dest. über P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

1000

Der entstandene Niederschlag wurde nach 10 min abgesaugt.



Ausbeute: 230 mg (0.63 mmol = 90% d. Th.) hellgelbes Pulver

05  $C_{17}H_{20}BrNO_3$  [366.25]

DC:  $R_f = 0.58$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1 + 1\% NH_4OH$ )

M.p.: 216-219°C

010  $C_{17}H_{20}BrNO_3 \times 0.1 HBr$  [374.34]


	% C	% H	% N
berechnet	54.55	5.41	3.74
gefunden	54.52	5.36	3.66

$^1H$ -NMR (200 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  9.10 (s, 1 H), 7.54 (d,  $J = 8.5$  Hz, 1 H), 7.27 (d,  $J = 8.5$  Hz, 1 H), 5.92 (dd,  $J = 10.3, 4.5$  Hz, 1 H), 5.73 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1 H), 4.74 (s, 1 H), 4.59 (s, 1 H), 4.11 (s, 2 H), 3.94 (s, 3 H), 3.79 (s, 3 H), 2.38 (d,  $J = 15.3$  Hz, 1 H), 2.15 (m, 3 H);  $^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  167.3 (d), 151.3 (s), 146.2 (s), 136.9 (s), 133.0 (d), 129.8 (d), 126.4 (d), 115.0 (s), 112.9 (d), 87.0 (d), 58.9 (d), 56.4 (q), 54.0 (t), 51.5 (q), 45.9 (s), 31.1 (t), 29.7 (t)

1020

### Beispiel 108

[(±)-(4 $\alpha$ ,6 $\beta$ ,8 $\alpha$ R\*)]-4 $\alpha$ ,5,9,10-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid, 1-Methylgalanthaminbromid (PI-8)



1025

200 mg (0.66 mmol)  
118 mg (0.66 mmol)  
5 ml

1-Methylgalanthamin (XV)  
N-Bromsuccinimid  
Chloroform

1030

Nach 5 Minuten entstand ein orange-gelber Niederschlag, der nach 15 Minuten abgesaugt wurde. Der Niederschlag (162 mg) wurde zweimal mit Diethylether gewaschen. Das Filtrat wurde eingengt, in wenig Ethanol aufgenommen und in Diethylether ausgefällt (54 mg).

1035 Ausbeute: 216 mg (0.57 mmol = 86% d. Th.) orange-gelbes Pulver

$C_{18}H_{22}BrNO_3$  [380.28]

1040 DC:  $R_f = 0.02$  (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)  
M.p.: 223-226°C


$C_{18}H_{22}BrNO_3 \times 0.35 HBr$  [408.60]

	% C	% H	% N
berechnet	52.91	5.51	3.43
1045 gefunden	52.99	5.52	3.48

1050 <sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  9.06 (s, 1 H), 7.04 (s, 1 H), 5.81 (dd,  $J = 10.1, 4.5$  Hz, 1 H), 5.54 (d,  $J = 10.2$  Hz, 1 H), 4.74 (s, 1 H), 4.17-3.95 (m, 4 H), 3.91 (s, 3 H), 3.86 (s, 3 H), 2.53 (s, 3 H), 2.40-1.96 (m, 4 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  166.4 (d), 150.5 (s), 144.7 (s), 140.4 (s), 136.7 (s), 128.4 (d), 127.9 (d), 114.9 (d), 113.9 (s), 86.5 (d), 58.7 (d), 56.3 (q), 54.4 (t), 50.5 (q), 47.0 (s), 35.1 (t), 29.4 (t), 18.9 (q)

# Beispiel 109

1055 [4aS-(4aa,6a,8aR\*)]-4a,5,9,10-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepinium, Bromid, Epigalanthaminiumbromid (PI-13)



1060 0.78 g (2.71 mmol)  
0.48 g (2.71 mmol)  
6 ml

Epigalanthamin (26)  
N-Bromsuccinimid  
absolutes Chloroform

1065 Nach 3 Minuten entstand ein gelber Niederschlag, der abgesaugt und zweimal mit Diethylether gewaschen wurde. Eine zweite Fraktion konnte durch Einengen des Filtrats und Tropfen auf 60 ml Diethylether gewonnen werden. Die zweite Fraktion wurde zur Reinigung in wenig Ethanol gelöst und auf Diethylether getropft.

Ausbeute: 0.91 g (2.48 mmol = 92% d. Th.)

1070  $C_{17}H_{20}BrNO_3$  [366.25]

DC:  $R_f = 0.05$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1 + 1\% \text{NH}_4\text{OH}$ )

M.p.: 205-210°C


175  $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{BrNO}_3 \times 0.3 \text{HBr}$  [390.52]

	% C	% H	% N
berechnet	52.28	5.24	3.59
gefunden	52.12	5.18	3.88

180  $^1\text{H-NMR}$  (200 MHz,  $\text{DMSO-d}_6$ ):  $\delta$  9.10 (s, 1 H), 7.51 (d,  $J = 11.5 \text{ Hz}$ , 1 H), 7.20 (d,  $J = 11.5 \text{ Hz}$ , 1 H), 5.82 (d,  $J = 12.7 \text{ Hz}$ , 1 H), 5.68 (d,  $J = 12.7 \text{ Hz}$ , 1 H), 4.80 (bs, 1 H), 4.40-4.21 (m, 1 H), 4.21-4.04 (m, 2 H), 3.94 (s, 3 H), 3.77 (s, 3 H), 2.60 (s, 1 H), 2.30-2.10 (m, 2 H), 1.81-1.60 (m, 1 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (50 MHz,  $\text{DMSO-d}_6$ ):  $\delta$  167.3 (d), 151.2 (s), 146.5 (s), 137.3 (s), 134.4 (d), 133.0 (d), 126.0 (d), 115.0 (s), 113.0 (d), 88.0 (d), 60.7 (d), 56.4 (q), 54.2 (t), 51.4 (q), 46.2 (s), 31.5 (t), 30.8 (t)

### Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Herstellung von Galanthamin-12-carbonitrilderivaten

(Beispiel 110-113)



$R, R' = \text{H, OH}$


1 eq.	Galanthaminiumderivat
3 eq.	Kaliumcyanid
30 ml	Wasser / 1 g Galanthaminiumderivat
10 ml	Diethylether / 1 g Galanthaminiumderivat

1095 Das Edukt wurde in einem Scheidetrichter in Wasser gelöst und die Lösung mit Ether überschichtet, dann festes Kaliumcyanid (frisch verrieben) dazugegeben, wobei sich sofort ein weißer Niederschlag in der wäßrigen Phase bildete. Nach etwa 2-3 Minuten wurde das Produkt durch Schütteln in die Etherphase extrahiert. Die wäßrige Phase wurde mit Ether und bei

1100 schwerer löslichen Derivaten mit Chloroform erschöpfend extrahiert, die organischen Phasen vereinigt, mit gesättigter wässriger Kochsalzlösung gewaschen, über  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Bei Bedarf wurde das erhaltene Produkt über eine Kieselgelsäule gereinigt (Laufmittel:  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ , wenn nicht anders angegeben).

105 Beispiel 110

[4aS-(4aα,6β,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-12-carbonitril, Galanthamin-12-carbonitril (MH-123)



110

3.50 g (9.56 mmol)  
1.90 g (28.7 mmol) = 3eq.  
100 ml  
40.0 ml

Galanthaminiumbromid (L)  
Kaliumcyanid  
Wasser  
Diethylether

1115

Die Reaktion wurde nach der allgemeinen Arbeitsvorschrift durchgeführt.

Rohausbeute >2 g

1120

Das ölige Rohgemisch, bestehend aus einem Isomerenverhältnis von ca. 9:1, wurde in möglichst wenig Ethanol gelöst und unter Rühren das Hauptisomer zur Kristallisation gebracht. Der Niederschlag wurde abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und das Filtrat mit der Waschlösung vereinigt und eingedunstet. Der Vorgang wurde wiederholt, bis die Hauptmenge an reinem Hauptisomer isoliert war.

1125

Ausbeute: 990 mg (3.28 mmol = 34% d. Th.) weißes Pulver

$C_{18}H_{20}N_2O_3$  [312.37]

1130

Es verblieb ein Gemisch aus beiden Isomeren (Verhältnis 9:1) und Galanthamin, das während der Isolierung des Hauptisomers entsteht, welches durch Säulen gereinigt werden konnte. Aus der Säule eluierte wieder das Isomerengemisch im Verhältnis 9:1, da es sich auf der Säule ineinander umwandelt.

1135

DC:  $R_f$  = 0.77 Hauptisomer  
0.63 Nebenisomer (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)  
M.p. 151-155°C


$C_{18}H_{20}N_2O_3 \times 0.1 H_2O$  [314.17]

40		% C	% H	% N
	berechnet	68.82	6.48	8.92
	gefunden	68.85	6.32	8.69

$^1H$ -NMR (200 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.70 (s, 2 H), 6.35 (d,  $J = 10.2$  Hz, 1 H), 6.07 (dd,  $J = 10.2, 5.3$  Hz, 1 H), 4.71 (s, 1 H), 4.61 (m, 1 H), 4.15 (dt,  $J = 11.1, 5.0$  Hz, 1 H), 3.85 (s, 3 H), 3.50 (dd,  $J = 15.0, 13.6$  Hz, 1 H), 2.91 (dt,  $J = 15.0, 3.2$  Hz, 1 H), 2.74-2.61 (m, 1 H), 2.61 (s, 3 H), 2.38 (d,  $J = 11.4$  Hz, 1 H), 1.98-2.08 (m, 2 H), 1.78 (ddd,  $J = 13.7, 5.0, 1.2$  Hz, 1 H);  $^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  146.7 (s), 145.6 (s), 132.9 (s), 128.2 (d), 126.9 (d), 124.2 (s), 122.5 (s), 111.6 (d), 88.9 (d), 61.6 (d + d), 55.9 (q), 49.9 (t), 48.1 (s), 46.1 (q), 36.4 (t), 29.7 (t)

### Beispiel 111

**[(±)-(4 $\alpha\alpha$ ,6 $\beta$ ,8 $\alpha R^*$ )]-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepin-12-carbonitril, 1-Methylgalanthamin-12-carbonitril (PI-12)**



300 mg (0.79 mmol) 1-Methylgalanthaminiumbromid (LI)  
 154 mg (2.36 mmol) = 3 eq. Kaliumcyanid  
 20.0 ml Wasser

Es konnten 205 mg eines weißen Rohproduktes isoliert werden.

Es wurde eine säulenchromatographische Trennung der Diastereomeren mit reinem Ethylacetat als Laufmittel versucht. Dabei konnte aber keine Trennung des Diastereomerengemisches erreicht werden.

Ausbeute: 151 mg (0.46 mmol = 59% d. Th.)

$C_{19}H_{22}N_2O_3$  [326.39]

DC:  $R_f = 0.30/0.65$  (Diastereomerengemisch; Ethylacetat)  
 M.p.: 72-73°C


$C_{19}H_{22}N_2O_3 \times 0.5 H_2O$  [335.39]

		% C	% H	% N
1175	berechnet	68.04	6.91	8.35
	gefunden	67.91	6.62	8.20

1180  $^1\text{H-NMR}$  (Gemisch aus 2 Isomeren, 200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.59 (s, 1 H), 6.31 (d,  $J = 8.9$  Hz, 0.4 H), 6.27 (d,  $J = 8.9$  Hz, 0.6 H), 6.01 (dd,  $J = 9.2, 5.0$  Hz, 1 H), 4.96 (s, 0.6 H), 4.83 (s, 0.4 H), 4.57 (bs, 0.6 H), 4.50 (bs, 0.4 H), 4.12 (dt,  $J = 15.5, 4.9$  Hz, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.47 (ddd,  $J = 13.9, 9.8, 3.4$  Hz, 1 H), 2.88 (dt,  $J = 14.6, 3.8$  Hz, 1 H), 2.70 (bs, 1 H), 2.62 (s, 1.8 H), 2.60 (s, 1.2 H), 2.31 (s, 3 H), 2.10-1.92 (m, 2 H), 1.87-1.68 (m, 1 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (Gemisch aus 2 Isomeren, 100 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  145.5 (s), 145.4 (s), 145.3 (s), 144.8 (s), 135.7 (s), 133.6 (s), 129.7 (d), 129.3 (d), 129.6 (s), 128.7 (s), 128.4 (d), 127.7 (d), 122.9 (s), 122.8 (s), 116.7 (s), 115.3 (s), 114.5 (d), 114.4 (d), 89.4 (d), 88.9 (d), 62.3 (d), 62.2 (d), 57.9 (d), 56.6 (d), 56.5 (q), 56.3 (q), 51.0 (t), 50.3 (t), 49.0 (s), 47.9 (s), 47.2 (q), 47.2 (s), 36.8 (t), 33.7 (t), 30.2 (t), 20.3 (q), 19.3 (q)

### Beispiel 112

1190 **[4aS-(4aa,6a,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-12-carbonitril, Epigalanthamin-12-carbonitril (Pi-14)**



1195 500 mg (1.37 mmol) Epigalanthaminiumbromid (LII)  
270 mg (4.10 mmol) = 3 eq. Kaliumcyanid  
15.0 ml Wasser

Ausbeute: 0.33 g (1.06 mmol = 77% d. Th.)  
 $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_3$  [312.37]

1200


DC:  $R_f = 0.75$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )  
M.p.: 90-96°C

1205  $^1\text{H-NMR}$  (Gemisch aus 2 Isomeren, 200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.92 (d,  $J = 8.3$  Hz, 0.3 H), 6.72 (d,  $J = 8.0$  Hz, 0.3 H), 6.68 (d,  $J = 8.0$  Hz, 0.7 H), 6.62 (d,  $J = 8.3$  Hz, 0.7 H), 6.31 (dt,  $J = 10.5, 1.6$  Hz, 0.7 H), 6.03 (d,  $J = 10.5$  Hz, 0.3 H), 5.85 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1 H), 5.22 (s, 0.3 H), 4.64 (s, 0.7 H), 4.58 (bs, 1 H), 3.86 (s, 0.9 H), 3.85 (s, 2.1 H), 3.12 (dt,  $J = 14.8, 3.2$  Hz, 0.3 H), 2.98-2.70 (m, 1.7 H), 2.58 (s, 2.1 H), 2.38 (s, 0.9 H).

2.27-2.04 (m, 1.2 H), 1.85 (dd,  $J = 13.5, 4.2$  Hz, 1.4 H), 1.71 (ddd,  $J = 13.5, 10.7, 2.5$  Hz, 1.4 H);  $^{13}\text{C}$ -NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  147.5 und 147.2 (s), 145.2 und 145.0 (s), 132.6 (s), 132.5 und 131.9 (d), 126.6 (d), 124.0 und 123.3 (s), 121.8 und 120.1 (d), 116.5 (s), 111.3 und 111.2 (d), 88.7 und 88.4 (d), 62.8 (d), 61.4 und 58.4 (d), 55.8 (q), 50.0 (t), 47.9 (s), 45.9 (q), 36.9 (t), 32.0 und 31.7 (t)

### Beispiel 113

1215 **[( $\pm$ )-(4 $\alpha$ ,6 $\alpha$ ,8 $\alpha$ R\*)]-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-1,11-dimethyl-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepin-12-carbonitril, 1-Methylepigalanthamin-12-carbonitril (PI-19)**



1220 1-Methylepigalanthaminiumbromid wurde nach der allgemeinen Arbeitsvorschrift zur Herstellung von Galanthaminiumderivaten hergestellt, wobei sich jedoch kein Niederschlag bildete. Die Reaktionslösung wurde daher zur Trockene eingedunstet, der verbleibende Rückstand in Ether aufgenommen, abgesaugt und gewaschen. Das verbliebene Rohprodukt wurde nach NMR-Analyse direkt in die folgende Reaktion eingesetzt.

1225	500 mg (1.32 mmol)	1-Methylepigalanthaminiumbromid (LIII)
	260 mg (3.96 mmol) = 3 eq.	Kaliumcyanid
	50 ml	Wasser

Die Reinigung erfolgte mittels Säulenchromatographie ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ ).

1230

Ausbeute: 220 mg (0.67 mmol = 51% d. Th.) weißer Schaum

$\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}_3$  [326.39]

1235 DC:  $R_f = 0.70/0.60$  (Diastereomergemisch;  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )

$^1\text{H}$ -NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.57 (s, 1 H), 6.26 (d,  $J = 10.4$  Hz, 1 H), 5.82 (d,  $J = 10.4$  Hz, 1 H), 4.94 und 4.82 (s, 1 H), 4.74-4.55 (m, 1 H), 4.50 und 4.45 (m, 1 H), 3.87 und 3.84 (s, 3 H), 3.55-3.32 (m, 1 H), 3.05-2.68 (m, 2 H), 2.58 und 2.57 (s, 3 H), 2.33 und 2.30 (s, 3 H), 2.23-2.07 (m, 1 H), 1.93-1.63 (m, 2 H);  $^{13}\text{C}$ -NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  146.0 (s), 145.8


1240

(s), 144.5 (s), 144.1 (s), 135.0 (s), 133.0 (s), 132.2 (d), 131.7 (d), 129.5 (d), 128.5 (s), 127.6 (s), 127.1 (d), 122.4 (s), 122.2 (s), 116.4 (s), 114.8 (s), 113.9 (d), 113.8 (d), 88.5 (d), 88.4 (d), 63.0 (d), 62.6 (d), 57.2 (d), 56.4 (d), 56.0 (q), 55.8 (q), 50.7 (t), 50.0 (t), 48.4 (s), 47.3 (s), 46.7 (q), 36.9 (t), 34.1 (t), 31.7 (t), 19.8 (q), 18.8 (q)

1245

**Allgemeine Arbeitsvorschrift zur Herstellung von 12-Methylgalanthaminderivaten**

(Beispiel 114-117)




1250	1 eq.	Galanthaminiumderivat
	2-4 eq.	Methylmagnesiumiodid (3M in Diethylether)
	20 ml	abs. Diethylether / 1 g Galanthaminiumderivat

Das gesamte Grignardreagens wurde unter N<sub>2</sub>-Atmosphäre vorgelegt und anschließend das feste Galanthaminiumderivat ohne Lösungsmittel zugegeben. Nach der jeweils angegebenen Zeit wurde Diethylether zugefügt und eine bestimmte Zeit gerührt, wobei sich die feste Masse auflöste. Dann wurde mit Wasser hydrolysiert, die Reaktionslösung mit konz. Ammoniak basisch gestellt und mit Ethylacetat extrahiert. Die organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen.

260






# Beispiel 114

[4aS-(4aa,6β,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11,12-dimethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 12-Methylgalanthamin (Pi-4)

1265



2.00 g (5.46 mmol)

6.70 ml (20.2 mmol) = 3.7 eq.

1270

40 ml

Galanthaminiumbromid (L)

Methylmagnesiumiodid (3M in Diethylether)

abs. Diethylether

Nach 40 min wurde das Lösungsmittel zugegeben und 5 h gerührt, bevor hydrolysiert wurde.

Ausbeute: 760 mg (2.52 mmol = 46% d. Th.) hellgelber Schaum

1275

C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub> [301.38]

DC: R<sub>f</sub> = 0.65 (CHCl<sub>3</sub>: MeOH = 9:1 + 1% NH<sub>4</sub>OH)

M.p.: 46-48°C


1280

<sup>1</sup>H-NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.66 (d, J = 8.3 Hz, 0.8 H), 6.65 (s, 0.2 H), 6.64 (s, 0.2 H), 6.57 (d, J = 8.3 Hz, 0.8 H), 6.13 (d, J = 10.1 Hz, 0.2 H), 6.07 (d, J = 10.1 Hz, 0.8 H), 5.94 (dd, J = 10.1, 4.4 Hz, 1 H), 4.54 (bs, 1 H), 4.26 (q, J = 7.0 Hz, 0.2 H), 4.08 (t, J = 4.4 Hz, 1 H), 3.88 (q, J = 7.4 Hz, 0.8 H), 3.80 (s, 0.6 H), 3.78 (s, 2.4 H), 3.62 (ddd, J = 14.6, 13.2, 1.0 Hz, 0.8 H), 3.45 (d, 14.2 Hz, 0.2 H), 3.12 (dt, J = 14.8, 3.3 Hz, 0.2 H), 2.85 (td, J = 15.5, 3.5 Hz, 0.8 H), 2.76 (bs, 1 H), 2.63 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 2.43 (s, 3 H), 2.16 (d, J = 2.7 Hz, 0.2 H), 1.98 (dt, J = 15.5, 2.3 Hz, 0.8 H), 1.95 (dd, J = 15.5, 2.3 Hz, 0.2 H), 1.51 (d, J = 7.3 Hz, 2.4 H), 1.47 (d, J = 7.3 Hz, 0.6 H); <sup>13</sup>C-NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 146.1 und 145.6 (s), 143.8 und 143.4 (s), 134.9 und 132.6 (s), 132.4 und 131.3 (s), 129.3 (d), 127.6 und 127.3 (d), 126.9 (d), 122.0 und 119.9 (d), 111.5 und 110.8 (d), 88.6 und 88.5 (d), 64.0 (d), 61.9 und 61.6 (d), 58.3 und 55.7 (q), 48.8 (s), 44.1 (t), 41.3 (q), 31.5 und 31.0 (t), 29.9 und 29.7 (t), 21.8 und 17.5 (q)

1290

Beispiel 115

[4aS-(4a?,6?,8aR\*,12R\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11,12-dimethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol. (=12-Methylgalanthamin); (Hauptisomer)




Das Isomerengemisch wurde säulenchromatographisch über Kieselgel gereinigt (CHCl<sub>3</sub>: MeOH = 9:1 + 1% NH<sub>4</sub>OH), wobei ein reines Isomer erhalten werden konnte.

<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 6.66 (d, J = 8.3 Hz, 1 H), 6.57 (d, J = 8.3 Hz, 1 H), 6.07 (d, J = 10.1 Hz, 1 H), 5.94 (dd, J = 10.1, 4.4 Hz, 1 H), 4.54 (bs, 1 H), 4.08 (t, J = 4.4 Hz, 1 H), 3.88 (q, J = 7.4 Hz, 1 H), 3.78 (s, 3 H), 3.62 (dd, J = 14.6, 13.2 Hz, 1 H), 2.85 (td, J = 15.5, 3.5 Hz, 1 H), 2.63 (d, J = 15.6 Hz, 1 H), 2.43 (s, 3 H), 2.11 (dt, J = 13.3, 2.4 Hz, 1 H), 1.95 (ddd, J = 16.5, 5.0, 1.8 Hz, 1 H), 1.51 (d, J = 7.3 Hz, 3 H), 1.47 (dd, J = 13.3 Hz, 1 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 146.2 (s), 143.5 (s), 135.1 (s), 131.4 (s), 129.4 (d), 127.4 (d), 122.2 (d), 111.6 (d), 88.8 (d), 64.0 (d), 61.8 (d), 55.8 (q), 48.9 (s), 44.2 (t), 41.5 (q), 31.7 (t), 29.8 (t), 21.9 (q)

Beispiel 116

[(±)-(4aα,6β,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-6H-1,11,12-trimethyl-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 1,12-Dimethylgalanthamin (PI-21)



500 mg (1.31 mmol)  
1.00 ml (3.00 mmol) = 2.3 eq.  
15 ml

1-Methylgalanthaminiumbromid (LI)  
Methylmagnesiumiodid (3M in Diethylether)  
absoluter Diethylether

1320 Während der Eduktzugabe wurden 5 ml Diethylether zugefügt, um das Reaktionsgemisch rührbar zu halten. Nach Ende der Eduktzugabe (30 min) wurden weitere 10 ml Diethylether zugegeben. Nach 2.5 Stunden wurde das Reaktionsgemisch hydrolysiert.

Ausbeute: 73 mg (0.23 mmol = 18% d. Th.)

1325

$C_{19}H_{25}NO_3$  [315.41]

DC:  $R_f = 0.50$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1 + 1\% NH_4OH$ )

M.p.: 45-50°C

1330


$^1H$ -NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 200 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.57 (s, 1 H), 6.06 (d,  $J = 10.2$  Hz, 1 H), 5.95 (dd,  $J = 10.2, 4.5$  Hz, 1 H), 4.59-4.44 (m, 1 H), 4.17-4.03 (m, 2 H), 3.81 (s, 3 H), 3.75-3.55 (m, 1 H), 2.97-2.77 (m, 1 H), 2.73-2.55 (m, 1 H), 2.51 (s, 0.5 H), 2.46 (s, 2.5 H), 2.25 (s, 3 H), 2.15-1.87 (m, 2 H),

1335

1.51 (d,  $J = 7.3$  Hz, 3 H), 1.30-1.18 (m, 1 H);  $^{13}C$ -NMR (Gemisch aus 2 Isomeren, 50 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  144.7 (s), 142.9 (s), 132.5 und 131.7 (s), 130.4 und 129.0 (s), 129.3 (d), 127.8 und 126.8 (s), 127.5 (d), 114.3 und 114.0 (d), 88.7 und 88.4 (d), 62.2 und 61.8 (d), 59.3 und 58.8 (d), 56.0 und 55.8 (q), 49.4 und 48.4 (s), 44.3 (t), 41.5 (q), 31.7 (t), 29.9 (t), 19.7 und 19.2 (q), 18.8 (q)

1340 Beispiel 117

[4aS-(4aa,6a,8aR\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11,12-dimethyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 12-Methylepigalanthamin (Pi-22)



1345

300 mg (0.82 mmol)

Epigalanthaminiumbromid (LII)

1.00 ml (3.00 mmol) = 3.70 eq.

Methylmagnesiumiodid (3M in Diethylether)

Das Grignardreagens wurde über 30 min zugegeben, anschließend 5 ml Ether zugefügt. Nach 20 min wurden weitere 15 ml Ether zugegeben und nach 3 h hydrolysiert.

1350

Die Reinigung erfolgte säulenchromatographisch ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ ).

Ausbeute: 60 mg (0.20 mmol = 24% d. Th.)

1355

$C_{18}H_{23}NO_3$  [301.39]

DC:  $R_f = 0.78$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1 + 1\% NH_4OH$ )


1360  $^1H$ -NMR (200 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.65 (d,  $J = 8.3$  Hz, 1 H), 6.53 (d,  $J = 8.3$  Hz, 1 H), 6.04 (d,  $J = 10.4$  Hz, 1 H), 5.76 (d,  $J = 10.4$  Hz, 1 H), 4.70-4.57 (m, 1 H), 4.54 (bs, 1 H), 3.93-3.82 (m, 1 H), 3.81 (s, 3 H), 3.61 (t,  $J = 13.6$  Hz, 1 H), 2.94-2.67 (m, 3 H), 2.41 (s, 3 H), 2.20 (td,  $J = 13.2, 2.4$  Hz, 1 H), 1.69 (ddd,  $J = 13.6, J = 13.6$  Hz, 1 H), 1.52 (d,  $J = 7.3$  Hz, 3 H), 1.59-1.44 (m, 1 H);  $^{13}C$ -NMR (50 MHz,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  147.0 (s), 143.2 (s), 134.5 (s), 131.3 (d), 131.1 (s), 128.9 (d), 121.5 (d), 111.2 (d), 88.6 (d), 64.1 (d), 62.7 (d), 55.6 (q), 48.6 (s), 44.4 (t), 41.2 (q), 32.0 (t + t), 21.8 (q)

1365

### Beispiel 118

**[4aS-(4 $\alpha\alpha$ ,6 $\beta$ ,8 $\alpha$ R\*)]-4 $\alpha$ ,5,9,10-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-12(11H)-on (MH-128)**

1370



200 mg (0.64 mmol)  
0.64 ml (0.64 mmol)

Galanthamin-12-carbonitril (LV)  
Natriumtrimethylsilanolat (1 M in  $CH_2Cl_2$ )  
absolutes Tetrahydrofuran

1375

5 ml

Die Edukte wurden unter  $N_2$ -Atmosphäre bei Raumtemperatur 72 h gerührt, wobei sich ein Niederschlag bildete, der abgesaugt, mit Tetrahydrofuran gewaschen und getrocknet wurde.

1380 Ausbeute: 177 mg (0.59 mmol = 92% d. Th.) hellgelbes Pulver

$C_{17}H_{19}NO_4$  [301.35]

DC:  $R_f = 0.65$  ( $CHCl_3 : MeOH = 9:1$ )

1385

M.p.: 251-255°C

390

**[4aS<sup>-</sup>-(4αα,6β,8αR\*)]-4α,5,9,10-Tetrahydro-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 11-oxid (MH-142)**



65

Demethylgalanthamin wurde unter Ausschluß von Luftfeuchtigkeit in der Oxidationslösung gelöst und auf 0°C gekühlt. Dann wurde SeO<sub>2</sub> zugegeben und zuerst 20 min bei 0°C und dann 4 h bei Raumtemperatur gerührt, wobei ein weißer Niederschlag ausfiel, der abgesaugt, mit Aceton gewaschen und getrocknet wurde. Das Filtrat wurde mit Wasser versetzt, das Aceton im Vakuum abdestilliert und die verbleibende wäßrige Phase mit Methylenchlorid extrahiert. Die gesammelten organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und das Lösungsmittel abgezogen. Der ölige Rückstand wurde in Aceton aufgenommen, wobei ein Niederschlag ausfiel, der als zweite Fraktion gewonnen werden konnte. Durch wiederholtes Einengen des Filtrats und Aufnehmen in Aceton konnten weitere Fraktionen gewonnen werden.

C16H17NO4 [287.31]

1420 DC:  $R_f = 0.42$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1 + 1\% \text{ konz. NH}_4\text{OH}$ )  
M.p.:  $232-233^\circ\text{C}$  ( $\text{CHCl}_3$ ); ab  $215^\circ\text{C}$  Abgabe einer Flüssigkeit


$\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{NO}_4 \times 0.2 \text{ H}_2\text{O}$  [290.91]

	% C	% H	% N
1425 berechnet	66.06	6.03	4.81
gefunden	66.11	6.05	4.73

1430  $^1\text{H-NMR}$  (200 MHz,  $\text{DMSO-d}_6$ ):  $\delta$  7.82 (s, 1 H), 6.90 (s, 2 H), 5.81 (dd,  $J = 10.1, 4.4 \text{ Hz}$ , 1 H), 5.54 (d,  $J = 10.1 \text{ Hz}$ , 1 H), 4.64 (bs, 1 H), 4.36 (d,  $J = 5.5 \text{ Hz}$ , 1 H), 4.14-4.02 (m, 2 H), 3.79 (s, 3 H), 2.39-1.99 (m, 4 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (50 MHz,  $\text{DMSO-d}_6$ ):  $\delta$  146.1 (s), 144.6 (s), 134.6 (d), 131.8 (s), 128.3 (d), 127.6 (d), 122.4 (d), 118.3 (s), 112.6 (d), 86.7 (d), 61.8 (d), 59.1 (t), 55.7 (q), 45.3 (s), 34.2 (t), 29.7 (t)

### Beispiel 119

1435 **[4aS-(4a $\alpha$ ,6 $\beta$ ,8aR\*)]-4a,5,9,10,13,14a-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H,14H-benzofuro[3a,3,2-ef]isoxazolo[3,2-a][2]benzazepin-13(bzw. 14)-carbonsäure, methylester (MH-143)**




1440 175 mg (0.61 mmol)  
0.05 ml (0.61 mmol)  
6 ml  
Galanthaminnitron (LXXXIV)  
Acrylsäuremethylester  
absolutes Toluol

1445 Die Reagenzien wurden 48 h unter Argon-Atmosphäre auf Rückfluß erhitzt, dann das Lösungsmittel abgezogen. Der Rückstand wurde säulenchromatographisch gereinigt ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1 + 1\% \text{ konz. NH}_4\text{OH}$ ).

Ausbeute: 225 mg (0.60 mmol = 99% d. Th.) hellbraunes, glasartig erstarrendes Öl

1450  $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{NO}_6$  [373.40]

DC:  $R_f = 0.74$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1 + 1\% \text{ konz. NH}_4\text{OH}$ )




C<sub>20</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>6</sub> x 0.5 H<sub>2</sub>O [382.40]

455		% C	% H	% N
	berechnet	62.82	6.33	3.66
	gefunden	62.88	6.17	3.65

1460 Gemisch aus Stereo- und Regioisomeren. Die genauere Behandlung der Spektren findet sich in Kapitel 2.2, Strukturaufklärungen

### Beispiel 120

[4aS-(4aα,6β,8aR\*,14aS\*)]-4a,5,9,10-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H,14aH-benzofuro[3a,3,2-ef]isoxazolo[3,2-a][2]benzazepin-14-carbonsäure, methylester (MH-145)



1470 200 mg (0.70 mmol) Galanthaminnitron (LXXXIV)  
 0.06 ml (0.70 mmol) Acetylencarbonsäuremethylester (Propiolsäuremethylester)  
 5 ml absolutes Toluol

1475 Die Reagenzien wurden 10 min unter Argon-Atmosphäre auf Rückfluß erhitzt, wobei sich die Lösung schon beim Aufwärmen orange färbte, dann das Lösungsmittel abgezogen. Der Rückstand wurde säulenchromatographisch gereinigt (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1). Der ölige Rückstand wurde aus Ethanol auskristallisiert, wobei gelbe Nadeln gewonnen werden konnten.

Ausbeute: 261 mg (0.70 mmol = 100% d. Th.) hellgelbe Nadeln

1480

C<sub>20</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>6</sub> [371.39]

DC: R<sub>f</sub> = 0.73 (CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9:1)  
 M.p.: 151-154°C

1485


	% C	% H	% N
berechnet	64.68	5.70	3.77
gefunden	64.59	5.89	3.67

- 1490  $^1\text{H-NMR}$  (200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.54 (s, 1 H), 6.96 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 6.74 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 5.96-5.77 (m, 2 H), 5.67 (s, 1 H), 4.55 (bs, 1 H), 4.10 (bs, 1 H), 3.85 (s, 3 H), 3.68 (s, 3 H), 3.59 (ddd,  $J = 14.3, 6.8, 3.8$  Hz, 1 H), 3.30 (ddd,  $J = 12.9, 9.3, 3.4$  Hz, 1 H), 2.64 (dd,  $J = 15.7, 3.7$  Hz, 1 H), 2.15 (td,  $J = 7.7, 3.4$  Hz, 1 H), 2.01 (ddd,  $J = 15.6, 5.3, 1.9$  Hz, 1 H), 1.54 (ddd,  $J = 15.6, 6.7, 3.5$  Hz, 2 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  163.9 (s), 154.6 (d), 146.8 (s), 145.1 (s), 133.3 (s), 130.3 (d), 126.9 (d), 125.3 (s), 123.3 (d), 111.3 (d), 109.9 (s), 89.1 (d), 68.7 (d), 61.4 (d), 55.8 (q), 52.4 (t), 51.4 (q), 47.2 (s), 29.2 (t), 28.0 (t)
- 1495

### Beispiel 121

[4aS-(4a $\alpha$ ,6 $\beta$ ,8aR\*)]-4a,5,9,10,13,14a-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H,14H-benzofuro[3a,3,2-ef]isoxazolo[3,2-a][2]benzazepin-13(bzw. 14)-carbonitril (MH-146)

1500



200 mg (0.70 mmol)  
0.05 ml (0.70 mmol)  
5 ml

Galanthaminnitron (LXXXIV)  
Acrylnitril  
absolutes Toluol

1505

Die Reagenzien wurden 2 h unter Argon-Atmosphäre auf Rückfluß erhitzt, dann das Lösungsmittel abgezogen. Der Rückstand wurde säulenchromatographisch gereinigt ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ ).

1510

Ausbeute: 230 mg (0.68 mmol = 97% d. Th.) hellgelbes Öl

$\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_4$  [340.38]

1515

DC:  $R_f = 0.74$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )

$\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_4 \times 0.2 \text{ H}_2\text{O}$  [343.98]

% C

% H

% N




berechnet	66.34	5.98	8.14
gefunden	66.22	6.03	7.86

Gemisch aus 4 Stereo- und Regioisomeren. Die genauere Behandlung der Spektren findet sich in Kapitel 2.2, Strukturaufklärungen

### Beispiel 122

**[4aS-(4aα,6β,8aR\*,14aS\*)]-4a,5,9,10,13,14a-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H,14aH-benzofuro[3a,3,2-ef]isoxazolo[3,2-a][2]benzazepin-6,13-diol, 13-acetat (MH-153)**



530

200 mg (0.70 mmol)  
0.24 ml (2.10 mmol) = 4 eq.  
5 ml

Galanthaminnitron (LXXXIV)  
Essigsäurevinylester  
absolutes Toluol

535

Die Reagenzien wurden 4 Tage unter  $N_2$ -Atmosphäre auf Rückfluß erhitzt, wobei jeden Tag 1 eq. Essigsäurevinylester zugegeben wurde. Dann wurde das Lösungsmittel abgezogen und der Rückstand säulenchromatographisch gereinigt ( $CHCl_3$  : MeOH = 9:1). Das gereinigte Öl wurde aus Methanol kristallisiert.

1540

Ausbeute: 256 mg (0.69 mmol = 98% d. Th.) beige Kristalle

$$\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{NO}_6 \text{ [373.41]}$$

1545 DC:  $R_f = 0.70$  (CHCl<sub>3</sub>: MeOH = 9:1)  
M.p.: 132-134°C


$$\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{NO}_6 \times 0.6 \text{ H}_2\text{O} [384.21]$$

		$C_{20}H_{23}NO_6 \times 0.6 H_2O$ [504.21]		
		% C	% H	% N
1550	berechnet	62.52	6.35	3.65
	gefunden	62.59	6.12	3.61

5  $^1\text{H-NMR}$  (Gemisch aus 2 Isomeren, 200 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.76 und 6.73 (d,  $J = 8.3$  Hz, 1 H), 6.68 und 6.60 (d,  $J = 7.7$  Hz, 1 H), 6.36 (d,  $J = 4.1$  Hz, 1 H), 6.30 (d,  $J = 10.6$  Hz, 1 H), 6.08-5.91 (m, 1 H), 4.60 und 4.50 (bs, 1 H), 4.32 (dd,  $J = 11.3, 5.6$  Hz, 1 H), 4.13 (bs, 1 H), 3.84 (s, 3 H), 3.80 (dd,  $J = 19.1, 9.8$  Hz, 1 H), 3.22 (ddd,  $J = 10.0, 6.8, 2.8$  Hz, 1 H), 2.92 (dd,  $J = 12.3, 5.8$  Hz, 1 H), 2.78-2.57 (m, 2 H), 2.09 (s, 3 H), 2.07-1.79 (m, 2 H);  $^{13}\text{C-NMR}$  (Gemisch aus 2 Isomeren, 50 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  169.6 (s), 145.8 (s), 143.8 (s), 134.1 (s), 129.8 (d), 128.0 und 127.7 (d), 127.0 (s), 118.7 und 118.5 (d), 111.4 und 110.9 (d), 95.3 und 94.5 (d), 88.7 und 88.2 (d), 61.4 (d + d), 55.7 und 55.5 (q), 54.5 (t), 47.3 (s), 41.7 (t), 29.7 (t), 29.3 (t), 21.0 und 20.9 (q)

### Beispiel 123

1565  $[4aS-(4a\alpha,6\beta,8aR^*,14aS^*)]-4a,5,9,10\text{-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H,14aH-benzofuro}[3a,3,2\text{-ef}]\text{isoxazolo}[3,2\text{-a}][2]\text{benzazepin-14-carbonitril (MH-159)}$



1570 500 mg (1.74 mmol)  
90 mg (1.74 mmol)  
10 ml

Galanthaminnitron (LXXXIV)  
Acetylenecarbonitril  
absolutes Toluol

1575 Die Reagenzien wurden 7 Tage unter Argon-Atmosphäre bei Raumtemperatur gerührt, wobei sich die Lösung gelb färbte, dann das Lösungsmittel abgezogen. Der Rückstand wurde aus Methanol kristallisiert, abgesaugt und mit Methanol gewaschen. Das Filtrat wurde eingeeengt und aus dem Rückstand säulenchromatographisch ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ ) eine 2. Produktfraktion gewonnen.

Ausbeute: 570 mg (1.68 mmol = 97% d. Th.) farblose Kristalle

1580

$\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_4$  [338.37]

DC:  $R_f = 0.60$  ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$ )  
M.p.: 137-139°C

85

	% C	% H	% N
berechnet	67.45	5.36	8.28
gefunden	67.17	5.41	8.19

590



<sup>1</sup>H-NMR (200 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 7.09 (d, J = 8.6 Hz, 1 H), 6.76 (d, J = 8.6 Hz, 1 H), 5.98 (s, 2 H), 5.54 (s, 1 H), 4.52 (bs, 1 H), 4.11 (bs, 1 H), 3.83 (s, 3 H), 3.75-3.59 (m, 1 H), 3.42-3.25 (m, 1 H), 2.64 (dd, J = 15.9, 3.2 Hz, 1 H), 2.44 (d, J = 11.5 Hz, 1 H), 2.11-1.94 (m, 2 H), 1.71-1.52 (m, 1 H); <sup>13</sup>C-NMR (50 MHz, CDCl<sub>3</sub>): δ 156.5 (d), 147.1 (s), 145.5 (s), 132.7 (s), 129.6 (d), 127.9 (d), 123.8 (s), 120.8 (d), 114.0 (s), 111.7 (d), 88.9 (d), 88.6 (s), 68.4 (d), 61.3 (d), 55.9 (q), 52.5 (t), 47.2 (s), 29.3 (t), 28.3 (t)

595


5 Beispiel 125:

Schritt 1:

1-Brom-5-methoxy-2-(2-methoxyethen-1-yl)-4-(1-methylethoxy)benzol



273.14 g/mol



301.18 g/mol

10

Zu einer Suspension von (Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid (50.0 g, 152 mmol) in absolutem THF (330 ml) wird unter Eiskühlung Kaliumtertiärbutylat (20.5 g, 183 mmol) zugegeben. Nach 15 min wird portionweise 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzaldehyd (33.1 g, 121 mmol) zugegeben.

15

Nach 15 min wird der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand zwischen Wasser (300 ml) und Ether (300 ml) verteilt. Die organische Phase wird getrocknet (Natriumsulfat), filtriert und der nach Eindampfen erhaltene Rückstand (37.3 g) mittels MPLC (Petrolether:Essigsäureethylester = 2 : 1, Fluß 70 ml/min) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (32.5 g, 85%).

20

Schmelzpunkt: 43-45°C

DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 2 : 1  $R_f$  = 0.75

$^1H$ -NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  7.00 (s, 1H); 6.90 (s, 1H), 6.83 (d,  $J$  = 12.7 Hz, 1H<sub>trans</sub>), 6.13 (d,  $J$  = 7.6 Hz, 1H<sub>cis</sub>), 5.98 (d,  $J$  = 12.7 Hz, 1H<sub>trans</sub>), 5.50 (d,  $J$  = 7.6 Hz, 1H<sub>cis</sub>), 4.49 (Septett,  $J$  = 6.4 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.74 (s, 3H<sub>trans</sub>), 3.70 (s, 3H<sub>cis</sub>), 1.35 (d,  $J$  = 6.4 Hz, 6H);



25

$^{13}C$ -NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  149.2 und 149.6 (s), 147.6 und 148.9 (s), 146.0 und 146.7 (d), 127.5 und 128.4 (s), 115.7 und 117.2 (d), 113.6 und 116.2 (d), 113.3 und 113.7 (s), 103.8 und 104.2 (d), 71.5 und 71.9 (d), 56.1 und 56.4 (q), 56.0 und 60.6 (q), 21.9 und 22.0 (q)



30

Schritt 2:

2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzaldehyd



301.18 g/mol







287.16 g/mol


5. 1-Brom-5-methoxy-2-(2-methoxyethen-1-yl)-4-(1-methylethoxy)benzol (20.0 g, 66.4 mmol) werden in Tetrahydrofuran (250 ml) / 2N HCl (10 ml) drei Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Nach Abziehen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer wird der Rückstand zwischen Wasser (200 ml) und Ether (200 ml) verteilt, die wäßrige Phase mit Ether (3 x 100 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen mit Wasser (4 x 150 ml), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 200 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert. Nach Eindampfen erhält man das Produkt als gelbes Öl (18.7 g, 98%).
- 10 DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 4 : 1  $R_f = 0.77$
- 1H: NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  9.71 (t,  $J = 1.71$  Hz, 1H), 7.06 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 4.49 (Septett,  $J = 6.4$  Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.73 (d,  $J = 1.71$  Hz, 2H), 1.35 (d,  $J = 6.4$  Hz, 6H);
- 45 13C NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  191.8 (d), 146.6 (s), 145.1 (s), 125.4 (s), 118.1 (s), 115.8 (d), 113.7 (d), 71.5 (d), 56.4 (q), 49.8 (t), 21.8 (q)

### Schritt 3:

#### 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzolethanol



287.16 g/mol



289.17 g/mol

- 55 2-Brom-5-(1-methylethoxy)-4-methoxybenzaldehyd (2.60 g, 9.05 mmol) werden bei 15°C innerhalb von 30 min zu einer Suspension von Natriumborhydrid (0.341 g, 9.05 mmol) in absolutem Ethanol (40 ml) zugegeben und zwei Stunden bei dieser Temperatur gerührt.

Der Ethanol wird am Rotationsverdampfer entfernt und der Rückstand zwischen gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (200 ml) und Ether (200 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (3 x 50 ml) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (3 x 200 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) getrocknet und filtriert. Nach Eindampfen erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (2.60 g, 99%).

DC: PE : EE = 9 : 1, 0.25

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  6.98 (s, 1H), 6.80 (s, 1H), 4.47 (Septett,  $J$  = 6.3 Hz, 1H), 3.82 (t,  $J$  = 7.0 Hz, 2H), 3.80 (s, 3H), 2.90 (t,  $J$  = 7.0 Hz, 2H), 1.32 (d,  $J$  = 7.3 Hz, 6H);

$^{13}\text{C NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  149.7 (s), 146.4 (s), 129.6 (s), 118.5 (d), 116.3 (d), 114.8 (s), 71.8 (d), 62.2 (t), 56.1 (q), 38.8 (t), 21.9 (q)

MT-163 JOS 1682


$\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{BrO}_3$

Berechnet: C, 49.84; H, 5.93

Gefunden: C, 49.69; H, 5.79

#### Schritt 4:


#### 1-Brom-2-(2-iodoethyl)-5-methoxy-4-(1-methylethoxy)benzol



$\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{BrO}_3$

289.17 g/mol

$\text{I}_2/\text{Imidazol}/$   
Triphenylphosphin



$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{BrIO}_2$

399.07 g/mol

80

Triphenylphosphin (24.7 g, 94.0 mmol), Imidazol (12.8 g, 188.0 mmol) und Iod (23.06 g, 90.9 mmol) werden in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (150 ml) eine Stunde bei  $15^\circ\text{C}$  gerührt.

2-Brom-5-(1-methylethoxy)-4-methoxybenzoethanol (18.0 g, 62.2 mmol) in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (100 ml) werden bei dieser Temperatur innerhalb von 10 min zugetropft und das Gemisch

85

zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt.

Das Gemisch wird filtriert und das Filtrat mit Wasser (1 x 200 ml) gewaschen. Die wäßrige Phase wird mit  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (2 x 50 ml) extrahiert und die vereinigten organischen Phasen mit Natriumthiosulfatlösung (1 x 200 ml), Wasser (1 x 200 ml), Kupfersulfatlösung (1 x 200 ml), Wasser (1 x 200 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 ml) gewaschen, getrocknet

90


(Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt.

95

$$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{BrIO}_2$$

100

2-[2-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]ethyl]propandisäuredimethylester



**399.07 g/mol**

$$\text{C}_{17}\text{H}_{23}\text{BrO}_6$$

403.27 g/mol

115

120

MT-165 JOS 1771

### Schritt 6:



145



$$\text{C}_{27}\text{H}_{35}\text{BrO}_7$$

Berechneter: C, 58.97; H, 6.24  
Gefunden: C, 59.03; H, 6.24


### Schritt 7:

Schritt 7:  
4-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)]- $\alpha$ -[4-(1-methylethoxy)-phenylmethyl]benzolbutansäure





551.48 g/mol



479.42 g/mol

155

2-[2-[2-Brom-5-(1-methylethoxy)-4-methoxyphenyl]ethyl]-2-[4-(1-methylethoxy)phenylmethyl]propandisäuredimethylester (18.1 g, 32.8 mmol) und Kaliumhydroxid (17.5 g, 312 mmol) werden in einem Gemisch aus Ethanol (100 ml) und Wasser (20 ml) 12 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

Das Reaktionsgemisch wird mit konzentrierter Salzsäure bis auf einen pH von 1 angesäuert und eine Stunde unter Rückfluß gehalten.

Der nach Entfernen des Lösungsmittels verbliebene Rückstand wird zwischen Wasser (250 ml) und Ether (250 ml) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (2 x 100 ml) extrahiert, die vereinigten, organischen Phasen mit Wasser neutralgewaschen, mit gesättigter Kochsalzlösung (150 ml) gewaschen und getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle). Der nach Entfernen des Lösungsmittels verbliebene Rückstand wird im Kugelrohr 30 min bei 160°C am Hochvakuum decarboxyliert und anschließend bei 210°C/0.008 mbar destilliert. Auf diese Weise wird das Produkt in Form farbloser Kristalle (13.3 g, 84%) erhalten.

165



170

$^1H$ : NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  7.04 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 6.99 (s, 1H), 6.80 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 6.77 (s, 1H), 4.60-4.39 (m, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.09-2.58 (m, 5H), 2.09-1.72 (m, 2H), 1.43-1.29 (m, 1H);  
 $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ): 181.0 (s), 156.2 (s), 149.3 (s), 146.3 (s), 132.3 (s), 130.7 (s), 129.6 (d), 117.6 (d), 116.1 (d), 115.7 (d), 114.3 (s), 71.6 (d), 69.6 (d), 55.9 (q), 46.7 (d), 37.0 (t), 33.1 (t), 31.7 (t), 21.8 (q).


175

#### Schritt 8:

**4-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)]- $\alpha$ -[4-(1-methylethoxy)-phenylmethyl]benzolbutansäureamid**



479.42 g/mol



478.43 g/mol

180

Zu 4-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)]- $\alpha$ -[4-(1-methylethoxy)-

phenylmethyl]benzolbutansäure (24.0 g, 50.1 mmol) in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (200 ml) wird Oxalsäuredichlorid (15 ml) bei  $0^\circ\text{C}$  innerhalb von 15 min zugetropft und das Gemisch zwei Stunden bei dieser Temperatur gerührt.

185 Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer entfernt, der Rückstand in absolutem THF (100 ml) aufgenommen und bei  $0^\circ\text{C}$  zwei Stunden lang Ammoniak eingeleitet. Das Gemisch wird eine Stunde bei  $0^\circ\text{C}$  gerührt und auf Wasser (1000 ml) gegossen.

Die ausgefallenen Kristalle werden abfiltriert und mit Wasser (4 x 500 ml) digeriert. Auf diese Art wird das Produkt in Form farbloser Kristalle (19.9 g, 83%) erhalten.

190  $^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  7.04 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 6.96 (s, 1H), 6.72 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 6.70 (s, 1H), 6.00 (b, 1H), 5.55 (b, 1H), 4.60-4.30 (m, 2H), 3.77 (s, 3H), 2.96-2.52 (m, 4H), 2.51-2.28 (m, 1H), 2.03-1.60 (m, 2H), 1.36-1.20 (m, 12H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ): 1774. (s), 156.2 (s), 149.2 (s), 146.4 (s), 132.7 (s), 131.1 (d), 129.7 (d), 117.5 (s), 116.1 (d), 115.7 (d), 114.4 (d), 71.6 (d), 69.6 (d), 56.0 (q), 48.6 (d), 38.0 (t), 33.3 (t), 32.5 (t), 21.9 (q).

195 MT-168 JOS 1770

$\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{BrNO}_4$


Berechnet: C, 60.25; H, 6.74; N, 2.93

Gefunden: C, 60.15; H, 6.55; N, 2.77

200

#### Schritt 9:

#### 4-(2-Brom-5-hydroxy-4-methoxy)- $\alpha$ -(4-hydroxyphenylmethyl)-benzolbutansäureamid



$\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{BrNO}_4$

478.43 g/mol

$\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{BrNO}_4$

394.27 g/mol

205

4-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)]- $\alpha$ -[4-(1-methylethoxy)-

phenylmethyl]benzolbutansäu-

reamid (10.0 g, 20.9 mmol) in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (150 ml) wird bei  $-78^\circ\text{C}$  Bortrichlorid (45 ml, 1.6 M in  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ ) zugetropft und eine Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Danach wird das Gemisch


210 auf Raumtemperatur erwärmt und zwei Stunden gerührt.

Man versetzt mit Wasser (400 ml) und destilliert das organische Lösungsmittel am Rotationsverdampfer ab, wobei das Rohprodukt kristallin ausfällt, das abfiltriert und mit Wasser (6 x 200 ml) und Diisopropylether (2 x 40 ml) digeriert wird. Dabei erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (7.11 g, 86%).

215

MT-171 JOS 1714

$\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{BrNO}_4 \cdot 0.25 \text{ H}_2\text{O}$





Berechnet: C, 54.22; H, 5.18; N, 3.51  
Gefunden: C, 54.05; H, 4.95; N, 3.54


220

**Schritt 10:**

**1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-oxa-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-10-carbonsäureamid (SPH-1478)**



394.27 g/mol



392.25 g/mol

225

$\alpha$ -[[2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl]methyl]-4-hydroxybenzolsäureamid (3.00 g, 7.61 mmol) werden in Chloroform (300 ml) suspendiert und mit einer Lösung von Kaliumhexacyanoferrat (III) (13.2 g, 40.0 mmol) in Kaliumcarbonatlösung (75 ml, zehnpromig) versetzt.

230

Das Gemisch wird bei Raumtemperatur 40 min heftig gerührt und über Hyflo filtriert. Die wäßrige Phase wird mit Chloroform (2 x 50 ml) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (2 x 200 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 150 ml) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Kieselgel) und das nach Eindampfen des Lösungsmittels erhaltene Rohprodukt über Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Essigsäureethylester) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (179 mg, 6%).

235

DC: Essigsäureethylester,  $R_f = 0.6$

240

$^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.95 (s, 1H), 6.71 (dd,  $J = 12.1$  Hz,  $J = 2.0$  Hz, 1H), 6.02 (d,  $J = 12.1$  Hz, 1H), 5.70 (b, 2H), 4.82 (s, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.58 (dd,  $J = 16.5$  Hz,  $J = 6.0$  Hz, 1H), 3.13 (dd,  $J = 6.0$  Hz,  $J = 16.5$  Hz, 1H), 2.82 – 2.57 (m, 3H), 2.48 – 2.15 (m, 2H), 2.12 – 1.62 (m, 2H);

$^{13}C$  NMR ( $DMSO-d_6$ ):  $\delta$  196.7 (s), 178.2 (s), 147.3 (d), 145.6 (s), 143.9 (s), 132.5 (s), 131.4 (s), 127.5 (d), 117.0 (s), 114.8 (d), 88.3 (d), 53.5 (q), 49.7 (s), 43.7 (d), 40.9 (t), 39.7 (t), 38.0 (t), 32.1 (t);

245


$^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  193.8 (s), 176.7 (s), 146.7 (d), 143.5 (s), 143.2 (s), 131.0 (s), 129.9 (s), 127.7 (d), 116.5 (s), 115.1 (d), 87.6 (d), 56.1 (q), 49.1 (s), 44.2 (d), 39.4 (t), 37.0 (t), 32.0 (t), 31.7 (t)

**Beispiel 126:**

250


**1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-**

benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-10-carbonsäureamid (SPH-1479)



$C_{18}H_{18}BrNO_4$   
392.25 g/mol

L-Selectride  
→



$C_{18}H_{20}BrNO_4$   
394.27 g/mol

255

Zu einer Suspension von 1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-oxa-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-10-carbonsäureamid (160 mg, 0.41 mmol) in absolutem THF (5 ml) wird bei 0°C L-Selektide<sup>®</sup> (2.0 ml, 2.0 mmol, 1 M in THF) innerhalb von 15 min zugegeben und das Gemisch 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man hydrolysiert mit Wasser (2 ml) und verteilt zwischen Wasser (10 ml) und Essigsäureethylester (10 ml), extrahiert die wässrige Phase mit Essigsäureethylester (3 x 5 ml), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 1 N Salzsäure (3 x 10 ml), Wasser (2 x 10 ml), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (1 x 10 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 10 ml), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und reinigt das nach Abdestillieren des Lösungsmittels erhaltene Rohprodukt mittels Säulenchromatographie (10 g Kieselgel, Essigsäureethylester). Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (137 mg, 85%).

260

265

MT-194 JOS 1712

$C_{18}H_{20}BrNO_4$

270

Berechnet: C, 54.84; H, 5.11; N, 3.55  
Gefunden: C, 54.55; H, 5.22; N, 3.34


DC: Essigsäureethylester,  $R_f = 0.5$

275


$^1H$  NMR (MeOH- $d_4$ ):  $\delta$  6.99 (s, 1H), 6.03 (d,  $J = 16.5$  Hz, 1H), 5.94 (dd,  $J = 16.5$  Hz,  $J = 5.9$  Hz, 1H), 4.52 (s, 1H), 4.16 (s, 1H), 3.76 (s, 3H), 3.49 (dd,  $J = 19.8$  Hz,  $J = 5.9$  Hz, 1H), 2.90 (t,  $J = 17.5$  Hz, 1H), 2.77 (t,  $J = 17.5$  Hz, 1H), 2.46 (d,  $J = 17.6$  Hz, 1H), 2.22 - 2.10 (m, 2H), 1.98 - 1.53 (m, 3H);

280

$^{13}C$  NMR (MeOH- $d_4$ ):  $\delta$  181.6 (s), 148.1 (s), 145.4 (s), 135.4 (s), 132.3 (s), 129.5 (d), 128.7 (d), 117.8 (d), 115.4 (s), 89.0 (d), 70.3 (d), 62.6 (d), 57.2 (q), 45.7 (s), 42.5 (t), 33.5 (t), 33.1 (t), 31.9 (t)



# Schema zu Beispiel 125 und 126




285

## Beispiel 127

### Stufe 1

5-(6-Acetoxy-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on

290



$\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NO}$

173.22 g/mol

$\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{NO}_4$

329.40 g/mol

Zu einer Suspension von wasserfreiem Aluminiumchlorid (61.5 g, 461.6 mmol) in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (500 mL) wird 6-Acetoxyhexansäurechlorid (16.7 g, 86.6 mmol) in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (50 mL) bei

- 295 0°C innerhalb von 10 Minuten zugetropft und 15 Minuten bei dieser Temperatur gerührt.  
 5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on (10.0 g, 57.7 mmol) in absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (100 mL)  
 wird innerhalb von 15 Minuten bei 0°C zugetropft, dann wird auf Siedetemperatur erhitzt und 30  
 Minuten gerührt. Man kühlt auf 0°C ab, hydrolysiert mit Eis und verteilt zwischen Wasser (300 mL)  
 und CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (100 mL). Die wässrige Phase wird mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (2 x 100 mL) extrahiert, die vereinigten  
 organischen Phasen werden mit 2 N Salzsäure (2 x 250 mL), Wasser (2 x 250 mL),  
 300 halbkonzentrierter wässriger Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung (2 x 250 mL), konzentrierter wässriger Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung  
 (2 x 250 mL) und konzentrierter Kochsalzlösung (1 x 250 mL) gewaschen, getrocknet  
 (Natriumsulfat/Aktivkohle) und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer entfernt.  
 Nach dem Umkristallisieren aus Methanol (150 mL) erhält man das Produkt in Form hellgelber  
 305 Kristalle (14.3 g, 75.5 %).

MT-304 JOS 1675


C<sub>19</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>4</sub>

Berechnet: C, 69.28; H, 7.04; N, 4.25


310 Gefunden: C, 69.27; H, 6.99; N, 4.25

- <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.72 (s, 2H), 4.06 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.72 (t, J = 5.7 Hz, 2H), 3.54 (s, 2H), 2.90 (t, J =  
 7.0 Hz, 2H), 2.80 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.09 – 1.93 (m, 5H), 1.85 – 1.56 (m, 4H), 1.50 – 1.30 (m, 2H);  
 315 <sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 198.9 (s), 174.2 (s), 171.1 (s), 145.5 (s), 131.3 (s), 127.8 (d), 122.9 (s), 122.4  
 (d), 119.5 (s), 64.3 (t), 38.9 (t), 38.0 (t), 36.1 (t), 28.5 (t), 25.7 (t), 24.4 (t), 24.1 (t), 21.0 (q), 20.9 (t)

Stufe 2 5-(6-Hydroxy-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on



TosOH/EtOH



C<sub>19</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>4</sub>

320 329.40 g/mol

C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>3</sub>


287.36 g/mol

320

- 5-(6-Acetyloxy-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on (10.0 g, 30.6 mmol)  
 wird in wasserfreiem Ethanol (150 mL) suspendiert, mit katalytischen Mengen 4-  
 Methylbenzolsulfonsäuremonohydrat versetzt und fünf Stunden bei Siedetemperatur gerührt.  
 325 Das Lösungsmittelvolumen wird auf ein Drittel eingeeengt und das Produkt in Form hellgelber  
 Nadeln (8.22 g, 93.5 %) durch Kristallisation bei – 20°C gewonnen.

MT-305 JOS 1672


C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>3</sub>



330 Berechnet: C, 71.06; H, 7.37; N, 4.87  
Gefunden: C, 71.30; H, 7.37; N, 4.87

335  $^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.67 (s, 2H), 3.80 – 3.52 (m, 4H), 3.48 (s, 2H), 2.97 – 2.66 (m, 4H), 2.08 – 1.86 (m, 2H), 1.82 – 1.26 (m, 6H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  199.3 (s), 174.2 (s), 145.4 (s), 131.2 (s), 127.8 (d), 122.8 (s), 122.3 (d), 119.4 (s), 62.3 (t), 38.7 (t), 38.0 (t), 36.0 (t), 32.3 (t), 25.4 (t), 24.3 (t), 24.1 (t), 20.8 (t)

340 Stufe 3 5-(6-Iod-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on



345 Triphenylphosphin (2.02 g, 7.74 mmol), Iod (3.08 g, 12.12 mmol) und Imidazol (0.618 g, 9.08 mmol) werden in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (30 mL) 30 Minuten bei  $15^\circ\text{C}$  gerührt.

5-(6-Hydroxy-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on (2.0 g, 6.96 mmol) in wasserfreiem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (10 mL) wird innerhalb von 5 Minuten bei dieser Temperatur zugetropft, dann wird 40 Minuten bei Raumtemperatur gerührt.

350 Man versetzt mit halbgesättigter Natriumsulfit-Lösung (50 mL), trennt die Phasen, extrahiert die wäßrige Phase mit  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ , wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 2 N Salzsäure (3 x 100 mL), Wasser (2 x 100 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 100 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 100 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und kristallisiert das nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rohprodukt aus Methanol (10 mL) um.

355

Variante A:

Der Rückstand wird durch Säulenchromatographie (100 g Kieselgel, Chloroform) gereinigt, wodurch das Produkt in Form hellgelber Kristalle (2.44 g, 88.3 %) erhalten wird.

360 Variante B:

Der Rückstand wird ein weiteres Mal aus Methanol (10 mL) umkristallisiert, wodurch das Produkt in Form hellgelber Kristalle (2.28 g, 82.4 %) erhalten wird.

365 MT-308  
JOS 1670 C<sub>17</sub>H<sub>20</sub>NO<sub>2</sub>  
Berechnet: C, 51.40; H, 5.07; N, 5.53  
Gefunden: C, 51.56; H, 4.97; N, 3.46

370 <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.70 (s, 2H), 3.72 (t, J = 5.7 Hz, 2H), 3.52 (s, 2H), 3.18 (t, J = 6.9 Hz, 2H), 2.91 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 2.80 (t, J = 6.1 Hz, 2H), 2.12 – 1.61 (m, 6H), 1.57 – 1.36 (m, 2H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 198.7 (s), 174.1 (s), 145.5 (s), 131.2 (s), 127.8 (d), 122.9 (s), 122.3 (d), 119.4 (s), 38.8 (t), 37.9 (t), 36.0 (t), 33.2 (t), 30.1 (t), 24.0 (t), 23.3 (t), 20.9 (t), 6.6 (t)

375 Stufe 4 5-(6-Methylsulfonyloxy-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on



C<sub>17</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>3</sub>  
287.36 g/mol

C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>5</sub>S  
365.45 g/mol

380 Zu 5-(6-Hydroxy-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on (1.0 g, 3.48 mmol) und N-Ethyl-diisopropylamin (560 mg, 4.35 mmol) in wasserfreiem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (10 mL) wird innerhalb von 5 Minuten Methansulfonsäurechlorid (458 mg, 4.00 mmol) bei 15°C zugetropft, dann wird zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt.


385 Man versetzt mit Wasser (20 mL), trennt die Phasen, extrahiert die wässrige Phase mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (1 x 10 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 2 N Salzsäure (3 x 10 mL), Wasser (2 x 10 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 10 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 10 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und digeriert das nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rohprodukt mit Diisopropylether (10 mL), wodurch das Produkt in Form hellgelber Kristalle (1.17g, 92.2 %) erhalten wird.

390 <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.70 (s, 2H), 4.22 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 3.71 (t, J = 5.8 Hz, 2H), 3.52 (s, 2H), 2.99 (s, 3H), 2.92 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.80 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.17 – 1.92 (m, 5H), 1.90 – 1.64 (m, 4H), 1.60 – 1.37 (m, 2H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 198.7 (s), 174.2 (s), 145.6 (s), 131.2 (s), 127.8 (d), 123.0 (s), 122.4 (d), 119.5 (s), 69.8 (t), 38.8 (t), 37.8 (t), 37.3 (q), 36.1 (t), 28.9 (t), 25.1 (t), 24.3 (t), 23.7 (t), 20.9 (t)

395

Stufe 5  
5-[6-[(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11-yl]-1-oxohexyl]-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-2(1H)-on (SPH-1500)





Norgalanthamin (1.13 g, 1.64 mmol), 5-(6-Iod-1-oxohexyl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij] chinolin-2(1H)-on (1.50 g, 3.75 mmol) und N-Ethyldiisopropylamin (1.46 g, 11.3 mmol) werden in absolutem Chloroform (20 mL) 54 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

Der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird durch Säulenchromatographie (200 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt, wodurch das Produkt als hellgelber Schaum (1.31 g, 64.3 %) erhalten wird.

$^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  7.63 (s, 2H), 6.68 – 6.46 (m, 2H), 6.00 (d,  $J$  = 10.3 Hz, 1H), 5.90 (dd,  $J$  = 10.3 Hz,  $J$  = 4.6 Hz, 1H), 4.51 (s, 1H), 4.19 – 3.96 (m, 2H), 3.75 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.70 – 3.58 (m, 2H), 3.44 (s, 2H), 3.35 – 2.98 (m, 2H), 2.96 – 6.67 (m, 4H), 2.66 – 2.29 (m, 4H), 2.15 – 1.84 (m, 4H), 1.82 – 1.11 (m, 6H);  
 $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  199.1 (s), 174.1 (s), 145.6 (s), 145.3 (s), 143.8 (s), 133.0 (s), 131.2 (s), 129.3 (s), 127.7 (d), 127.4 (d), 126.8 (d), 122.8 (s), 122.3 (d), 121.7 (d), 119.4 (s), 111.0 (d), 88.5 (d), 61.8 (d), 57.6 (t), 55.7 (q), 51.4 (t), 51.2 (t), 48.2 (s), 38.7 (t), 38.0 (t), 36.0 (t), 32.8 (t), 29.8 (t), 27.1 (t), 26.9 (t), 24.3 (t), 24.2 (t), 20.8 (t)

#### Stufe 6

5-[6-[(4a*S*,6*R*,8a*S*)-4*a*,5,9,10,11,12-hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6*H*-benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benzazepin-11-yl]-1-oxohexyl]-5,6-dihydro-4*H*-pyrrolo[3,2,1-*ij*]chinolin-2(1*H*)-on Fumarat (SPH-1499)

Die Fällung des Fumarats erfolgte analog Beispiel 4.

MT-311 JOS 1762

$C_{37}H_{42}N_2O_9 \cdot H_2O$


Berechnet: C, 65.67; H, 6.55; N, 4.14

Gefunden: C, 65.93; H, 6.54; N, 4.03

#### Beispiel 128a

##### Stufe 1

2-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]methyl]propandisäuredimethylester



- 435 1-(Chlormethyl)-4-(1-methylethoxy)benzol (20.5 g, 111 mmol), Malonsäuredimethylester (102.5 g, 776 mmol) und Kaliumcarbonat (46.5 g, 332 mmol, wasserfrei, frisch vermahlen) werden in absolutem DMF (250 mL) 24 Stunden bei 70°C gerührt.
- 440 Das Gemisch wird filtriert und der nach Eindampfen des Filtrats am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand zwischen Ether (250 mL) und Wasser (250 mL) verteilt. Die organische Phase wird mit Wasser (3 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und das Lösungsmittel abgezogen.
- 445 Der überschüssige Malonsäuredimethylester wird durch Vakuumdestillation (85°C/15 mbar) abgetrennt und das im Rückstand verbliebene Rohprodukt durch Kugelrohrdestillation (130°C/0.001 mbar) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt als farbloses Öl (23.6 g, 78 %).

MT-67 JOS 1774


$\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_5$

Berechnet: C, 64.27; H, 7.19

450 Gefunden: C, 64.28; H, 7.07


Stufe 2:

4-(1-Methylethoxy)benzolpropansäure



455

2-[[4-(1-Methylethoxy)phenyl]methyl]-propandisäuredimethylester (23.6 g, 84.2 mmol) wird in 2 N





460 Kaliumhydroxidlösung (15 mL)/Ethanol (25 mL) 18 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.  
Der Ethanol wird am Rotationsverdampfer abdestilliert, der Rückstand mit konzentrierter  
Salzsäure auf einen pH von 1 gebracht und mit Ether (3 x 150 mL) extrahiert. Die vereinigten  
organischen Phasen werden mit Wasser (6 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (200 mL)  
gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert. Der nach Eindampfen am  
Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird im Kugelrohr decarboxyliert (140°C/0.08 mbar)  
und anschließend destilliert (155°C/0.08 mbar). Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form  
465 farbloser Kristalle (14.4 g, 82 %).

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.12 (d, J = 9.5 Hz, 2H), 6.82 (d, J = 9.5 Hz, 2H), 4.50 (Septett, J = 6.3 Hz, 1H),  
2.89 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 2.63 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 1.32 (d, J = 6.3 Hz, 6H);  
470 <sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 178.8 (s), 156.4 (s), 132.1 (s), 129.2 (d), 116.0 (d), 69.9 (d), 35.8 (t), 29.7 (t), 22.1  
(q)


### Stufe 3

#### 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)benzolacetonitril

475



293.59 g/mol



284.15 g/mol

480 1-Brom-2-(chloromethyl)-5-methoxy-4-(1-methylethoxy)benzol (7.00 g, 23.8 mmol) und  
Kaliumcyanid (1.70 g, 26.1 mmol, frisch vermahlen) werden in absolutem DMSO (70 mL) 12  
Stunden bei Raumtemperatur gerührt.  
Das Gemisch wird auf Wasser (700 mL) gegossen, die wäßrige Phase mit Ether (3 x 150 mL)  
extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (5 x 150 mL) und gesättigter  
Kochsalzlösung (1 x 200 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und der  
nach Eindampfen erhaltene Rückstand mit Diisopropylether (15 mL) digeriert. Auf diese Weise  
485 erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (6.46 g, 95 %).

MT-72 JOS 1695

$\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{BrNO}_2$



Berechnet: C, 50.72; H, 4.97; N, 4.93

490 Gefunden: C, 50.73; H, 4.84; N, 4.89


<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.02 (s, 1H), 6.97 (s, 1H), 4.50 (Septett, J = 6.3 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.72 (s, 2H), 1.36 (d, J = 6.3 Hz, 6H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 150.8 (s), 147.1 (s), 121.5 (s), 117.3 (s), 116.7 (d), 116.3 (d), 113.9 (s), 72.1 (d), 56.2 (q), 24.2 (t), 21.9 (q)

#### Stufe 4

#### 4-(1-Methylethoxy)benzolpropansäure-(1-methyl)ethylester



166.18 g/mol



250.34 g/mol

4-Hydroxybenzolpropansäure (50.0 g, 300 mmol), Kaliumcarbonat (210 g, 1.5 mol, wasserfrei, frisch vermahlen) und 2-Brompropan (221 g, 1.8 mol) werden in absolutem DMF (500 mL) 24 Stunden bei 60°C gerührt.

Die Lösung wird filtriert und der nach Eindampfen am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand zwischen Ether (500 mL) und 2 N Natronlauge (500 mL) verteilt. Die organische Phase wird mit 2 N Natronlauge (2 x 200 mL), Wasser (3 x 500 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (200 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert. Der nach Abdestillieren des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird durch Kugelrohrdestillation (139 – 142°C/ 0.025 mbar) gereinigt, wodurch das Produkt als farbloses Öl (70.8 g, 94 %) erhalten wird.

MT-159 JOS 1768

$\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_3$

Berechnet: C, 71.97; H, 8.86


Gefunden: C, 71.84; H, 8.75

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.10 (d, J = 9.5 Hz, 2H), 6.81 (d, J = 9.5 Hz, 2H), 4.99 (Septett, J = 6.3 Hz, 1H), 4.48 (Septett, J = 6.3 Hz, 1H), 2.87 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 2.54 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 1.20 (d, J = 6.3 Hz, 6H), 1.31 (d, J = 6.3 Hz, 6H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 172.4 (s), 156.2 (s), 132.4 (s), 129.1 (d), 115.8 (d), 69.7 (d), 67.4 (d), 36.4 (t), 30.1 (t), 22.0 (q), 21.7 (q)

#### Stufe 5

#### 4-(1-Methylethoxy)benzolpropanol

1. Aus 4-(1-Methylethoxy)benzolpropansäure



530

4-(1-Methylethoxy)benzolpropansäure (7.57 g, 36.3 mmol) in absolutem THF (80 mL) wird bei 0°C zu einer Suspension von Lithiumaluminiumhydrid (4.17 g, 110 mmol) in absolutem THF (80 mL) innerhalb von 30 Minuten zugetropft und 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt.


535

Man hydrolysiert mit Wasser (30 mL) und versetzt mit konzentrierter Salzsäure, bis die Lösung klar wird, verteilt zwischen Wasser (30 mL) und Ether (60 mL), extrahiert die wäßrige Phase mit Ether (2 x 20 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 2 N Salzsäure (3 x 100 mL), Wasser (1 x 100 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 100 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 100 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert.

540

Nach Abdestillieren des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (6.84 g, 97 %).

2. Aus 4-(1-Methylethoxy)benzolpropansäure-(1-methyl)ethylester



550

4-(1-Methylethoxy)benzolpropansäure-(1-methyl)ethylester (10.0 g, 39.9 mmol) in absolutem THF (100 mL) wird bei 0°C zu einer Suspension von Lithiumaluminiumhydrid (3.04 g, 80 mmol) in absolutem THF (100 mL) innerhalb von 30 Minuten zugetropft und 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt.

Man hydrolysiert mit Wasser (30 mL) und versetzt mit konzentrierter Salzsäure, bis die Lösung klar wird, verteilt zwischen Wasser (30 mL) und Ether (60 mL), extrahiert die wäßrige Phase mit Ether (2 x 20 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 2 N Salzsäure (3 x 100 mL), Wasser (1 x 100 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 100 mL) und gesättigter

555

Kochsalzlösung (1 x 100 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und filtriert.

Nach Abdestillieren des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (7.04 g, 99 %).


MT-89 JOS 1700

560  $C_{12}H_{18}O_2$   
Berechnet: C, 74.19; H, 9.34  
Gefunden: C, 73.93; H, 9.07

$^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  7.10 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 6.82 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 4.50 (Septett,  $J = 6.3$  Hz, 1H), 3.68 (t,  $J = 7.9$  Hz, 2H), 2.66 (t,  $J = 7.9$  Hz, 2H), 2.0 (b, 1H), 1.93 – 1.78 (m, 2H), 1.32 (d,  $J = 6.3$  Hz, 6H);  
565  $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  155.9 (s), 133.7 (s), 129.2 (d), 115.9 (d), 69.9 (d), 62.0 (t), 34.3 (t), 31.1 (t), 22.0 (q)

Stufe 6

570 1-(3-Iodpropyl)-4-(1-methylethoxy)benzol




575 Triphenylphosphin (13.1 g, 49.9 mmol), Iod (19.9 g, 78.4 mmol) und Imidazol (4.0 g, 58.8 mmol) werden in absolutem  $CH_2Cl_2$  (250 mL) 20 Minuten bei Raumtemperatur gerührt. Man tropft bei 15°C 4-(1-Methylethoxy)benzolpropanol (8.74 g, 45.0 mmol) in  $CH_2Cl_2$  (100 mL) zu und rührt 12 Stunden bei Raumtemperatur.  
Man verteilt zwischen Wasser (300 mL) und  $CH_2Cl_2$  (150 mL), extrahiert die wässrige Phase mit  $CH_2Cl_2$  (2 x 50 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit Wasser (1 x 200 mL),  
580 halbgesättigter Kupfer(II)sulfat-Lösung (2 x 200 mL), Wasser (1 x 200 mL), zehnpromzentiger Natriumsulfatlösung (1 x 200 mL), gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und nimmt den nach Eindampfen am Rotationsverdampfer erhaltenen Rückstand in Diisopropylether (200 mL) auf. Man filtriert und reinigt den aus dem Filtrat nach Abziehen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltenen Rückstand durch  
585 Säulenchromatographie (900 g Kieselgel; Petrolether : Essigsäureethylester = 95 : 5). Auf diese Weise erhält man das Produkt als farbloses Öl (10.9 g, 79 %).

MT-151 JOS 1755



590  $C_{12}H_{17}IO$   
Berechnet: C, 47.39; H, 5.63  
Gefunden: C, 47.37; H, 5.41

$^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  7.11 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 6.82 (d,  $J = 9.5$  Hz, 2H), 4.53 (Septett,  $J = 6.3$  Hz, 1H), 3.18 (t,  $J = 7.9$  Hz, 2H), 2.67 (t,  $J = 7.9$  Hz, 2H), 2.10 (Quintett,  $J = 7.9$  Hz, 2H), 1.35 (d,  $J = 6.3$  Hz, 6H);  
595  $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  156.2 (s), 132.2 (s), 129.4 (d), 115.9 (d), 69.8 (d), 35.2 (t), 35.0 (t), 22.1 (q), 6.5 (t)




# Stufe 7


## $\alpha$ -[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]4-(1-methylethoxy)-benzolpentannitril



284.15 g/mol



304.17 g/mol



460.42 g/mol

Zu einer Lösung von Diisopropylamin (3.55 g, 35.08 mmol) in absolutem THF (50 mL) wird n-Butyllithium (12.7 mL, 27.5 mmol, 2.2 M in Hexan) innerhalb von 15 Minuten bei einer Temperatur von  $-78^\circ\text{C}$  zugegeben, dann wird das Gemisch auf  $-30^\circ\text{C}$  erwärmt und 30 Minuten bei dieser Temperatur gerührt.

Die Lösung wird auf  $-78^\circ\text{C}$  abgekühlt, mit 2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)-benzylacetonitril (7.94 g, 27.9 mmol) in absolutem THF (100 mL) versetzt, 20 Minuten bei dieser Temperatur gerührt, auf Raumtemperatur erwärmt und eine weitere Stunde gerührt. Das Gemisch wird auf  $-78^\circ\text{C}$  gekühlt, danach wird 1-(3-Iodpropyl)-4-(1-methylethoxy)benzol (8.50 g, 27.9 mmol) in absolutem THF (50 mL) innerhalb von 15 Minuten zugetropft und das Gemisch 45 Minuten gerührt.

Man versetzt mit gesättigter Ammoniumchloridlösung (50 mL) und erwärmt auf Raumtemperatur. Der nach Eindampfen erhaltene Rückstand wird zwischen 2 N Salzsäure (200 mL) und Ether (200 mL) verteilt. Die wässrige Phase wird mit Ether (3 x 50 mL) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (3 x 200 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (1 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer verbleibende Rückstand säulenchromatographisch (1000 g Kieselgel, Petrolether : Essigsäureethylester = 98 : 2) gereinigt. So erhält man das Produkt als farbloses Öl (11.46 g, 71 %).

MT-158 JOS 1699



$\text{C}_{24}\text{H}_{30}\text{BrNO}_3$

Berechnet: C, 62.61; H, 6.57; N, 3.04




Gefunden: C, 62.32; H, 6.31; N, 2.97

# Stufe 8

## $\alpha$ -[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]-4-(1-methylethoxy)-benzylpentansäureamid



460.42 g/mol



478.43 g/mol

630

α-[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]-4-(1-methylethoxy)benzopentannitril (30.0 g, 65.2 mmol) in Ethanol (600 mL) wird mit Kaliumhydroxid (60.0 g, 1.07 mol) in Wasser (100 mL) versetzt und 6 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

635

Der nach Eindampfen erhaltene Rückstand wird zwischen 2 N Salzsäure (200 mL) und Ether (300 mL) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (3 x 75 mL) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (3 x 200 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (1 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 mL) gewaschen, getrocknet

640

(Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und der nach Entfernen des Lösungsmittels verbleibende Rückstand säulenchromatographisch (1000 g Kieselgel, Petrolether : Ether = 1 : 2) gereinigt. Die höherlaufende Fraktion wird in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (100 mL) aufgenommen, bei 0°C mit Oxalsäuredichlorid (3 mL) und einem Tropfen DMF versetzt und zwei Stunden gerührt. Der nach Abziehen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird in absolutem THF (100 mL) suspendiert, worauf 2 Stunden Ammoniak unter die Oberfläche eingeleitet werden.

645

Das Gemisch wird filtriert und der nach Eindampfen erhaltene Rückstand zwischen Wasser (100 mL) und Ether (100 mL) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether (3 x 50 mL) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (3 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) getrocknet, filtriert, und der nach Eindampfen erhaltene Rückstand mit der durch Säulenchromatographie erhaltenen

650



tieferlaufenden Fraktion vereinigt, unter Diisopropylether kristallisiert und mit Diisopropylether (100 mL) digeriert. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (26.0 g, 83.5 %).

655

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.01 (d,  $J$  = 8.9 Hz, 2H), 6.98 (s, 1H), 6.92 (s, 1H), 6.75 (d,  $J$  = 8.9 Hz, 2H), 5.98 (b, 1H), 5.52 (b, 1H), 4.47 (Septett,  $J$  = 6.3 Hz, 2H), 3.91 (t,  $J$  = 7.0 Hz, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.74 – 2.40 (m, 2H), 2.22 – 2.00 (m, 1H), 1.91 – 1.36 (m, 3H), 1.35 – 1.22 (m, 6H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  175.2 (s), 155.8 (s), 149.9 (s), 147.0 (s), 133.9 (s), 130.8 (s), 129.1 (d), 115.7 (d), 114.8 (d), 114.7 (d), 71.4 (d), 69.7 (d), 56.0 (q), 49.7 (d), 34.6 (t), 31.9 (t), 29.1 (t), 22.0 (q), 21.8 (q), 21.7 (q)



## Stufe 9

660  $\alpha$ -[2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl]-4-hydroxybenzopentansäureamid

478.43 g/mol



394.27 g/mol

$\alpha$ -[2-Brom-4-methoxy-5-(1-methylethoxy)phenyl]-4-(1-methylethoxy)benzopentansäureamid (24.0 g, 50.2 mmol) in absolutem  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  (300 mL) werden bei  $-78^\circ\text{C}$  mit Bortrichlorid (150 mL, 150 mmol, 1 M in  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ ) versetzt und vier Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Wasser (200 mL) wird zugetropft und die organische Phase am Rotationsverdampfer entfernt. Die ausgefallenen Kristalle werden mit Wasser (6 x 200 mL) digeriert, wodurch das Produkt in Form farbloser Kristalle erhalten wird (19.8 g, quant.).

MT-161-JOS 1713



 $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{BrNO}_4$ 

Berechnet: C, 54.84; H, 5.11; N, 3.55


Gefunden: C, 54.56; H, 5.40; N, 3.25

## Stufe 10

## 1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-oxa-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-12-carbonsäureamid (SPH-1484)



394.27 g/mol



392.25 g/mol

$\alpha$ -[2-Brom-5-hydroxy-4-methoxyphenyl]-5-hydroxybenzopentansäureamid (3.00 g, 7.61 mmol) wird in Chloroform (300 mL) suspendiert und mit einer Lösung von Kaliumhexacyanoferrat(III) (13.2 g, 40.0 mmol) in Kaliumcarbonatlösung (75 mL, zehnprozentig) versetzt.

Das Gemisch wird bei Raumtemperatur 40 Minuten heftig gerührt und über Hyflo filtriert. Die wäßrige Phase wird mit Chloroform (2 x 50 mL) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen

werden mit 2N Salzsäure (2 x 100 mL), Wasser (2 x 200 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 150 mL) gewaschen, getrocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle) und das nach Eindampfen des Lösungsmittels erhaltene Rohprodukt über Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Essigsäureethylester) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt als Gemisch aus zwei diastereomeren Enantiomerenpaaren, wobei das tieferlaufende zum höherlaufenden isomerisiert.

Durch Säulenchromatographie (Chloroform : Methanol = 96 : 4) erhält man das Enantiomerenpaar mit dem höheren R<sub>f</sub>-Wert in Form farbloser Kristalle (0.24 g, 8 % d. Th.).

MT-162/OF JOS 1679

C<sub>18</sub>H<sub>18</sub>BrNO<sub>4</sub>

Berechnet: C, 55.12; H, 4.63; N, 3.57


Gefunden: C, 55.15; H, 4.71; N, 3.38

<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 7.57 (s, 1H), 7.48 (d, J = 14.5 Hz, 1H), 7.14 (s, 2H), 5.89 (d, J = 14.5 Hz, 1H), 4.66 (s, 1H), 4.32 (s, 1H), 4.01 (q, J = 7.7 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.02 (d, J = 19.6 Hz, 1H), 2.79 (d, J = 19.6 Hz, 1H), 2.52 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 2.16 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 1.96 – 1.67 (m, 2H), 1.14 (t, J = 7.7 Hz, 1H)

<sup>13</sup>C NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 195.6 (s), 174.6 (s), 149.5 (d), 147.9 (s), 144.4 (s), 133.6 (s), 130.6 (s), 126.5 (d), 117.5 (s), 117.1 (d), 88.4 (d), 56.8 (q), 52.1 (s), 51.6 (d), 37.9 (t), 36.6 (t), 33.3 (t), 21.5 (t)


#### Beispiel 128b

(6R)-1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-12-carbonsäureamid (SPH-1483)



Zu einer Suspension von 1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-oxa-6H-

benzo[a]cyclohepta[hi]benzofuran-12-carbonsäureamid (600 mg, 1.52 mmol) in absolutem THF (5 mL) wird bei 0°C L-Selectride® (4.6 mL, 4.6 mmol, 1 M in THF) innerhalb von 15 Minuten zugegeben und das Gemisch 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man hydrolysiert mit Wasser (3 mL) und verteilt zwischen Wasser (10 mL) und Essigsäureethylester (10 mL), extrahiert die wässrige Phase mit Essigsäureethylester (3 x 5 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 1 N Salzsäure (3 x 10 mL), Wasser (2 x 10 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (1 x 10 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 10 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und reinigt das nach Abdestillieren des Lösungsmittels



erhaltene Rohprodukt mittels Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Essigsäureethylester). Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (798 mg, 83 %).

725

MT-169/OF JOS 1677

$C_{18}H_{20}BrNO_4$

Berechnet: C, 54.84; H, 5.11; N, 3.55

Gefunden: C, 54.67; H, 5.10; N, 3.46

730

$^1H$  NMR ( $CDCl_3/DMSO-d_6$ ):  $\delta$  6.97 (s, 1H), 6.79 (b, 1H), 6.49 (b, 1H), 6.12 (d,  $J = 11.4$  Hz, 1H), 5.83 (dd,  $J = 11.4$  Hz,  $J = 5.1$  Hz, 1H), 4.42 (s, 1H), 4.31-4.21 (m, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.42 – 3.18 (m, 2H), 2.68 – 2.29 (m, 2H), 2.14-1.38 (m, 5H);


$^{13}C$  NMR ( $CDCl_3/DMSO-d_6$ ):  $\delta$  173.4 (s), 146.3 (s), 143.6 (s), 134.2 (s), 128.8 (d), 128.6 (d), 126.8 (s),

735

116.1 (s), 115.6 (d), 87.1 (d), 60.1 (q), 55.6 (d), 50.1 (s), 49.5 (d), 37.5 (t), 31.0 (t), 29.8 (t), 20.3 (t)

Beispiel 128c

(6R)-10-Amino-1-brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[h]benzofuran-6-ol (SPH-1482)



Bis(trifluoroacetoxy)iodbenzol (300 mg, 0.76 mmol) wird Acetonitril (1.5 mL, HPLC-Qualität) gelöst und mit Wasser (1.5 mL, HPLC-Qualität) versetzt. Danach wird (6R)-1-Brom-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[h]benzofuran-12-carbonsäureamid (338 mg, 0.76 mmol) innerhalb von 2 Stunden in Substanz zugegeben und das Gemisch 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wird am Rotationsverdampfer abdestilliert, der Rückstand in Chloroform (5 mL) aufgenommen, filtriert und durch Säulenchromatographie (30 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (161 mg, 58 %).

MT-170 JOS 1705

$C_{17}H_{20}BrNO_3 \cdot 0.66 H_2O$

Berechnet: C, 54.02; H, 5.68; N, 3.71



Gefunden: C, 53.96; H, 5.52; N, 3.60

$^1H$  NMR (MeOH- $d_4$ ):  $\delta$  7.08 (s, 1H), 6.41 (d,  $J = 14.5$  Hz, 1H), 5.8883 (dd,  $J = 14.5$  Hz,  $J = 5.1$  Hz, 1H), 4.72 (s, 1H), 4.58 (s, 1H), 4.13 (t,  $J = 3.6$  Hz, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.49 (d,  $J = 17.2$  Hz, 1H), 2.45 – 2.07 (m, 4H), 1.92 – 1.58 (m, 4H);

$^{13}C$  NMR (MeOH- $d_4$ ):  $\delta$  147.2 (s), 144.7 (s), 134.5 (s), 133.3 (s), 130.9 (d), 126.4 (d), 116.6 (d), 115.5 (s), 87.8 (d), 61.2 (d), 57.3 (q), 54.0 (d), 48.6 (s), 38.3 (t), 35.2 (t), 30.1 (t), 17.9 (t)

Beispiel 128d

(6R)-10-Amino-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-6-hydroxy-6H-benzo[a]cyclohepta[h]benzofuran-6-ol



### 1. Synthese in Lösung:

795 Norgalanthamin (1.13 g, 4.13 mmol), 8-(6-Iodo-1-oxohexyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-4-on (1.50 g, 3.75 mmol) und N-Ethyl-diisopropylamin (1.46 g, 11.3 mmol) werden in absolutem Chloroform (20 mL) 54 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird durch Säulenchromatographie (200 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt, wodurch das Produkt als hellgelber Schaum (1.87 g, 92 %) erhalten wird.

800

DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH : NH<sub>3</sub> = 89 : 10 : 1, R<sub>f</sub> = 0.5

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.62 (s, 1H), 7.67 (s, 1H), 6.68 – 6.43 (m, 2H), 6.00 (d, J = 9.7 Hz, 1H), 5.93 – 5.81 (m, 1H), 4.51 (s, 1H), 4.22 – 3.91 (m, 4H), 3.92 – 3.64 (m, 4H), 3.48 – 2.28 (m, 13 H), 2.20 – 1.12 (m,

805 10H);

<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 198.7 (s), 167.5 (s), 145.5 (s), 145.1 (s), 143.7 (s), 132.8 (s), 132.6 (s), 129.1 (s), 128.9 (s), 127.2 (d), 126.7 (d), 126.3 (d), 123.6 (d), 121.6 (d), 119.3 (s), 110.8 (d), 88.3 (d), 61.6 (d), 57.4 (t), 55.6 (q), 51.2 (t), 51.0 (t), 48.1 (s), 45.4 (t), 38.0 (t), 32.6 (t), 31.1 (t), 29.7 (t), 27.0 (t), 26.8 (t), 24.2 (t), 23.9 (t)

810

Herstellung des Fumarats (SPH-1519) analog Beispiel 4

MT-407 JOS 1761

C<sub>37</sub>H<sub>42</sub>N<sub>2</sub>O<sub>9</sub>·H<sub>2</sub>O

Berechnet: C, 65.67; H, 6.55; N, 4.14

815 Gefunden: C, 65.69; H, 6.49; N, 4.02

## 2. Durch Festphasensynthese

0.300 g (0.102 mmol) Norgalanthamin-6-yloxy-1,5-dioxopentylloxymethyl-Merrifieldharz werden in einer beiderseits verschlossenen 5-ml-Polyethylenfritte 30 Minuten in 3 ml


820 Dimethylformamid/Aceton (1/1) gequollen und nach dem Filtrieren in einer Lösung von 0.125 g (0.315 mmol) 8-(6-Iodo-1-oxohexyl)-1,2,5,6-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2,1-ij]chinolin-4-on und 54 µl (0.041 g, 0.315 mmol) Ethyl-diisopropylamin in 3 ml Dimethylformamid/Aceton (1/1) suspendiert.

Die Suspension wird bei Raumtemperatur 19 Stunden geschüttelt. Ein negativer Chloranil-Test zeigt den vollständigen Umsatz des sekundären Amins an. Das Harz wird dreimal mit

825 Dimethylformamid (2 min, 3 ml) und sechsmal mit Tetrahydrofuran/Methanol (4/1, 2 min, 3 ml) gewaschen. Das Harz wird nachfolgend in einer Lösung aus 0.113 g (0.63 mmol) 30 %iger Natriummethanolat-Methanol-Lösung und 3.0 ml Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) suspendiert.


Nach 15 Stunden wird die Lösung abfiltriert, und das Harz sechsmal mit jeweils 3 ml Dichlormethan extrahiert.

830 Die vereinigten Filtrate werden mit methanolischer Salzsäure neutralisiert, mit 10 ml Dichlormethan verdünnt, zweimal mit 15 ml gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und im Rotationsverdampfer unter verminderten Druck eingeeengt. Das Rohprodukt wird mittels MPLC (200 g Kieselgel, v = 285 nm, Chloroform-



35 /Methanol/conc. Ammoniak = 96/3/1) getrennt. Nach dem Einengen erhält man ein gelbes Öl,  
welches beim Stehen kristallisiert: 0.043 g (0.041 g, 0.075 mmol, 74 %), gelbliche Kristalle ( $M_w =$   
542.7), HPLC, DC ident mit einer Referenzprobe:  
DC  $R_f = 0.55$  (Chloroform/Methanol = 8/2 + 2 % conc. Ammoniak)  
HPLC:  $t_{Ret} = 13.7$  min, 95.7 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5.0  $\mu$ m, 1  
ml/min, 285 nm, Acetonitril/ 20 mM  $Cl_3CCO_2H$  in  $H_2O$  (5/95 v/v für 5 min, 5/95  $\rightarrow$  60/40  
40 v/v in 18 min (konvex), 60/40 v/v für 5 min)

Beispiel 130a  
345 (4 $\alpha$ S,6R,8 $\alpha$ S)-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-  
ef][2]benzazepin-6-ol, Galanthamin (HM 424)



850 Zu einer Suspension von Galanthaminiumbromid HM 407 (1.0 g, 2.73 mmol) in absolutem  
Tetrahydrofuran (50 mL) wurde Lithiumaluminiumhydrid (104 mg, 2.73 mmol) hinzugefügt und für  
3 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Danach wurde überschüssiges Lithiumaluminiumhydrid  
mit Ethylacetat vernichtet mit Wasser (49 mg, 2.73 mmol) zur Bildung eines filtrierbaren  
Niederschlags zugegeben. und gefällt. Das entstandene  $Al_2O_3$  wurde abfiltriert, das Filtrat über  
855 Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel am Rotavapor entfernt. Es wurden 750 mg (96 %  
d. Th.) an Galanthamin als weißer Schaum erhalten.

DC:  $CHCl_3$ : MeOH/ $NH_3$  (9:1)


860  $^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.66-6.58 (m, 2H), 6.08-5.94 (m, 2H), 4.58 (b, 1H), 4.15 (b, 1H), 4.06 (d,  $J = 15.2$   
Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 3.66 (d,  $J = 15.2$  Hz, 1H), 3.25 (ddd,  $J = 14.4, 2.2, 1.9$  Hz, 1H), 3.05 (ddd,  $J =$   
14.9, 3.1, 3.1 Hz, 1H), 2.68 (ddd,  $J = 15.7, 1.8, 1.8$  Hz, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.15-1.90 (m, 2H), 1.55 (ddd,  $J =$   
13.7, 4.1, 2.0 Hz, 1H);  $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  145.8 (s), 144.1 (s), 133.1 (s), 129.2 (s), 127.6 (d), 126.8 (d),  
122.1 (d), 111.1 (d), 88.7 (d), 62.0 (d), 60.4 (t), 55.8 (q), 53.7 (t), 48.2 (s), 41.9 (q), 33.4 (t), 29.9 (t)

865

#### Beispiel 130b:

(4 $\alpha$ S,6R,8 $\alpha$ S)-4 $\alpha$ ,5,9,10,11-Pentahydro-12-deutero-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-

ef][2]benzazepin-6-ol, (12-Deuterogalanthamin, SPH-1520)



870

Zu einer Suspension von Galanthaminiumbromid HM 407 (250 mg, 0.683 mmol) in absolutem Tetrahydrofuran (15 mL) wurde Lithiumaluminiumdeuterid (28 mg, 0.68 mmol) hinzugefügt und für 3 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Danach wurde überschüssiges Lithiumaluminiumdeuterid mit Ethylacetat zersetzt und mit Deuteriumoxid (12 mg, 0.68 mmol)  $\text{Al}_2\text{O}_3$  gefällt. Das entstandene  $\text{Al}_2\text{O}_3$  wurde abfiltriert, das Filtrat über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel am Rotavapor entfernt. Es wurden 100 mg (51% d. Th.) an HM 427 als weißer Schaum erhalten.

880 DC:  $\text{CHCl}_3$ :  $\text{MeOH}/\text{NH}_3$  (9:1)

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  6.66-6.58 (m, 2H), 6.08-5.94 (m, 2H), 4.58 (b, 1H), 4.14 (b, 1H), 4.06 (d,  $J = 15.2$  Hz, 0.5H), 3.78 (s, 3H), 3.66 (d,  $J = 15.2$  Hz, 0.5H), 3.25 (ddd,  $J = 14.4, 2.2, 1.9$  Hz, 1H), 3.05 (ddd,  $J = 14.9, 3.1, 3.1$  Hz, 1H), 2.68 (ddd,  $J = 15.7, 1.8, 1.8$  Hz, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.15-1.90 (m, 2H), 1.55 (ddd,  $J = 13.7, 4.1, 2.0$  Hz, 1H);  $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  145.8 (s), 144.1 (s), 133.1 (s), 129.2 (s), 127.6 (d), 126.8 (d), 122.1 und 122.0 (d), 111.1 (d), 88.7 (d), 62.0 (d), 60.4 (t), 55.8 (q), 53.8 und 53.7 (t), 48.2 (s), 42.1 und 41.9 (q), 33.8 und 33.7 (t), 29.9 (t)

885



LC/MS: 30\*2.1 mm Zorbax SB C18 3 $\mu\text{m}$ , 40% MeOH für 2 Min. auf 100% @ 10 Min. für 10 Min; Rest  $\text{H}_2\text{O}$  bei 0.5 ml/Min, UV 210, 250, 280 und 310 nm, ein einziger Peak (RT ca. 6.0 min). PI-MS  $m/z$  289 ( $[\text{M}+\text{H}]^+$ ), 271 ( $[\text{M}+\text{H}-\text{H}_2\text{O}]^+$ ). NI-MS  $m/z$  287 ( $[\text{M}-\text{H}]^-$ ), 269 ( $[\text{M}-\text{H}-\text{H}_2\text{O}]^-$ ).

890

Beispiel 131:

Norsanguinine (SPH-1486)





895

Eine Lösung von Norgalanthamin (1.0 g, 3.66 mmol) in 40 ml absolutem THF wird bei Raumtemperatur mit 17 ml L-Selectrid<sup>®</sup> (1 M in THF) versetzt und 24 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

900

Man kühlt auf Raumtemperatur ab, versetzt mit Essigsäureethylester (20 ml), dann mit Wasser (100 ml) und trennt die Phasen. Die organische Phase wird mit Wasser (4 x 20 ml) extrahiert, die vereinigten wäßrigen Phasen mit Essigsäureethylester (2 x 20 ml) extrahiert und der nach Eindampfen verbliebene Rückstand über Säulenchromatographie (100 g) Kieselgel, Chloroform : Ammoniak = 90 : 9 : 1) gereinigt und unter Aceton kristallisiert. Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (0.78 g, 82.3%).

905


<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6.52-6.37 (m, 2H), 6.03 (d, J = 10.3 Hz, 1H), 5.78 (dd, J = 10.3 Hz, J = 4.6 Hz, 1H), 4.43 (s, 1H), 4.09 (s, 1H), 3.90 (d, J = 16 Hz, 1H), 3.71 (d, J = 16 Hz, 1H), 3.25-2.92 (m, 2H), 2.24-2.90 (m, 2H), 2.39 (d, J = 14 Hz, 2H);

<sup>13</sup>C NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 145.6 (s), 140.4 (s), 133.0 (s), 132.3 (s), 127.7 (d), 127.6 (d), 119.6 (d), 114.8 (d), 86.5 (d), 60.1 (d), 53.1 (t), 48.3 (s), 46.6 (t), 40.2 (t), 30.8 (t)

910

#### Beispiel 132:

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (SPH-1487)



920

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-trifluormethylsulfonyloxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol (200 mg, 0.49 mmol), Tetramethylstannan (106 mg, 0.59 mmol), wasserfreies Lithiumchlorid (62 mg, 1.47 mmol) und Tetrakis(triphenylphosphin)palladium (28 mg, 0.025 mmol),

0.05 Äquivalente) werden in absolutem DMF (3 ml) 24 Stunden bei 100°C gerührt. Man verteilt zwischen Wasser (20 ml) und Essigsäureethylester (30 ml), extrahiert, die wäßrige Phase mit Essigsäureethylester (5 x 30 ml), wäscht die vereinigten, organischen Phasen mit Wasser (3 x 10 ml) und gesättigter Kochsalzlösung (15 ml) und reinigt den nach Eindampfen erhaltenen Rückstand durch Säulenchromatographie (20 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1). Auf diese Weise erhält man das Produkt in Form farbloser Kristalle (102 mg, 77%).

MT-298 JOS 1711

$C_{17}H_{21}NO_2 \cdot 0.25 H_2O$

930 Berechnet: C, 74.02; H, 7.86; N, 5.08  
Gefunden: C, 73.77; H, 7.67; N, 5.04


$^1H$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  6.90 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 6.46 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 6.08 (d, J = 11.5 Hz, 1H), 6.00 (dd, J = 8.5 Hz, J = 5.2 Hz, 1H), 4.54 (s, 1H), 4.13 (s, 1H), 4.11 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 3.70 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 3.30 (t, J = 12.7 Hz, 1H), 3.08 (d, J = 12.7 Hz), 2.66 (dd, J = 15.2 Hz, J = 5.0 Hz, 1H), 2.42 (s, 3H), 2.18 (s, 3H), 2.17-2.00 (m, 2H), 1.57 (dd, J = 13.3 Hz, J = 5.0 Hz, 1H);  
 $^{13}C$  NMR ( $CDCl_3$ ):  $\delta$  156.4 (s), 135.3 (s), 131.6 (s), 130.1 (d), 127.7 (d), 127.6 (d), 122.0 (d), 119.8 (s), 88.1 (d), 62.7 (d), 61.3 (t), 54.2 (t), 48.5 (s), 42.4 (d), 33.9 (t), 30.4 (t), 15.3 (q).

940

5 **Beispiel 136:**

**SPH-1146** TK 66/1

(-) Cyclopropylmethylgalanthaminiumbromid



10


Herstellung analog Beispiel 90-99, Schmp. 230 – 237°

$\alpha_D^{20} = -110^\circ$  (C=1,5 in Wasser)

15 **Beispiel 137:**

**SPH-1149** HM 104

(-) (3-Methylbut-2-en-1-yl)-galanthaminiumbromid



20


Herstellung analog Beispiel 90-99, Schmp. 198-201°

$\alpha_D^{20} = -118.2^\circ$  (1,5 in Wasser)

**Beispiel 138:**

**SPH-1162** Cl 2-1 3au

25 3-([6R]-1-Brom-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)propansäureethylester



Herstellung analog Beispiel 143

Reaktionszeit: 8 h, Ausbeute: 80% farbloser Schaum

30

Gleiches Grundgerüst wie Beispiel 143, hier nur Angabe der dazu unterschiedlichen Signale:  
<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ 4.13 (q, J = 6.0 Hz, 2H), 2.85 (t, 7.0 Hz, 2H), 2.58 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.27 (t, J = 6  
 Hz, 3H);

<sup>13</sup>C-NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ 172.4 (s), 60.3 (t), 57.3 (t), 32.9 (t), 14.1 (q).

35

**Beispiel 139:**

(-) (4-Bromphenyl)methylgalanthaminiumbromid hemihydrat

Chemical structure of a tropane derivative, specifically 1-(3,4-dibromophenyl)-N-methyl-8-methoxy-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol. The structure shows a tropane core with a methoxy group at position 8, a hydroxyl group at position 3, and an N-methyl group. The nitrogen is also substituted with a 3,4-dibromophenyl group. A bromide ion ( $\text{Br}^-$ ) is shown as a counterion.

45 Gef.: C 52.45, H 5.15, N 2.52


(-) (3-Chlorpropyl)-galanthaminiumbromid . 1.25 H<sub>2</sub>O

CN(C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]1Cc3ccc(OC)cc3O[C@H]2[C@H](O)C=C

55 Gef.: C 51.08, H 6.07, N 2.92

(6R)-1-Brom-6-hydroxy-N<sup>11</sup>-isopropyl-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-carbonsäureamid

60 ef] [2]benzazepin-11(12H)-carbonsäureamid



65 Herstellung analog Beispiel 142, Ausbeute: 96 %:

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  6.87 (s, 1H), 6.04 (dd,  $J = 16.0; 10.0$  Hz, 2H), 4.88 (d,  $J = 18.0$  Hz, 1H), 4.61 (m, 1H), 4.28 (d,  $J = 18.0$ , 1H), 4.13 (b, 1H), 3.90 (m, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.26 (t,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 2.67 (dd,  $J = 16.0; 3.0$  Hz, 1H), 2.29 (d,  $J = 10.0$  Hz, 1H), 1.99 (m, 2H), 1.72 (d,  $J = 17$  Hz, 1H); 1.12 (dd,  $J = 20.0; 5.0$  Hz, 6H);  $^{13}\text{C-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  156.0 (s), 146.5 (s), 144.9 (s), 133.8 (s), 128.6 (d), 128.2 (s), 127.5 (s), 125.8 (d), 115.1 (d), 112.3 (d), 88.5 (d), 61.6 (d), 56.1 (q), 50.3 (t), 49.1 (s), 45.2 (t), 42.7 (d), 36.6 (t), 29.6 (t)

70

23.4 (q), 23.0 (q). Anal. ( $\text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{BrN}_2\text{O}_4 \cdot 0.3 \text{ H}_2\text{O}$ )

Ber. C 54.26 H 5.83 N 6.33

Gef. C 54.28 H 5.79 N 6.14


75

**Beispiel 142:**

**SPH-1209** CB 5

(6R)- 1-Brom-6-hydroxy-3-methoxy- N11-methyl 5,6,9,10-tetrahydro-4aH- [1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-thiocarbonsäureamid

80



Zu einer gerührten Lösung von Bromnorgalanthamin (0.2 g, 0.57 mmol) in Toluol (10 mL) wurde Methyliisothiocyanat (42.0 mg, 0.57 mmol) zugetropft und 3 Stunden unter Rückfluß erhitzt.


Nach Eindampfen wurde der Rückstand in in 2 N HCl (20 mL) aufgenommen und mit AcOEt (1 x 10 mL) gewaschen. Die wäßrige Lösung wurde mit konzentriertem Ammoniak auf einen pH > 8.5

85

gebracht und mit AcOEt (3 x 10 mL) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, getrocknet ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) and eingedampft, wo durch das Produkt in Form farbloser Kristalle vom Schmelzpunkt 183 – 185°C erhalten wurde (0.22 g, 99 %);

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  7.35 (b, 1H), 6.89 (m, 1H), 6.10 (m, 2H), 5.50 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 5.11 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 4.69 (b, 1H), 4.52 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 4.17 (b, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.60 (t,  $J = 18.0$  Hz, 1H), 3.10

90



(d,  $J = 3.4$  Hz, 3H), 2.72 (dd,  $J = 18.8; 2.0$  Hz, 1H), 2.13 (m, 2H), 1.79 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H);  $^{13}\text{C}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  181.5 (s), 146.8 (s), 145.4 (s), 133.9 (s), 128.9 (d), 128.2 (s), 125.5 (d), 115.3 (d), 112.5 (d), 88.6 (d), 61.5 (d), 56.2 (q), 51.7 (t), 51.2 (t), 48.9 (s), 35.8 (t), 33.0 (q), 29.6 (t).

Anal. ( $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{BrN}_2\text{O}_3 \cdot 0.5 \text{ H}_2\text{O}$ )


95 Ber. C 50.83 H 4.98 N 6.59

Get. C 50.73 H 5.02 N 6.63

### Beispiel 143:

SPH-1210 CB 4

100 3-[(6R)-1-Brom-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl]propionitril



105 Zu einer Lösung von Norgalanthamin (200 mg, 0.57 mmol) in 50% EtOH (20 mL) wurde Acrylnitril (0.05 mL, 0.85 mmol) und Calciumchlorid (200 mg, 1.80 mmol) zugefügt und die Reaktion 3 h unter Rückfluß erhitzt. Die Reaktion wurde aufkonzentriert, der Rückstand in 2 N HCl (50 mL) aufgenommen und mit EtOAc (3 x 25 mL, organische Phase verwerfen) gewaschen. Die wäßrige Lösung wurde mit konz.  $\text{NH}_3$  auf pH >8.5 gebracht und mit Methylenchlorid (3 x 25 mL) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit gesättigter Natriumchloridlösung (200 mL) gewaschen, getrocknet ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) und eingedampft und das Produkt als fälbloser Schaum 110 220mg (95.7%) erhalten.

115  $^1\text{H}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  6.90 (s, 1H), 6.04 (dd,  $J_1 = 16.0$  Hz,  $J_2 = 10.0$  Hz, 2H), 4.60 (b, 1H), 4.38 (d,  $J = 16.0$ , 1H), 4.12 (b, 1H), 4.08 (d,  $J = 16.0$  Hz, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.47 (t,  $J = 10.0$  Hz, 1H), 3.18 (d,  $J = 18.0$  Hz, 1H), 2.80 (t,  $J = 10.0$  Hz, 2H), 2.63 (m, 2H), 2.61 (m, 1H), 2.03 (m, 2H), 1.60 (d,  $J = 10.0$  Hz, 1H);  $^{13}\text{C}$ -NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  145.6 (s), 144.5 (s), 134.1 (s), 128.4 (d), 127.1 (s), 126.1 (d), 118.6 (s), 115.8 (d), 114.3 (d), 88.7 (d), 61.7 (d), 56.1 (q), 54.9 (t), 52.0 (t), 48.9 (s), 47.2 (t), 33.3 (t), 29.7 (t), 16.8 (t).

Anal. ( $\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{BrN}_2\text{O}_3$ )

Ber. C 56.31 H 5.22 N 6.91

Gef. C 56.53 H 5.44 N 6.64


120

### Beispiel 144

SPH-1227


125 [4aS-(4 $\alpha$ ,6 $\alpha$ ,8 $\alpha$ R\*)]-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-amin

Schritt 1



- 130 Eine Lösung von 300 mg (1.05 mmol) Galanthamin, 208 mg (1.20 mmol) Azadicarbon-  
säurediethylester, 314 mg (1.20 mmol) Triphenylphosphin und 1.20 mmol Phthalimid in 30 ml  
absolutem Tetrahydrofuran wird 24 Stdn. bei Raumtemp. gerührt. Anschließend wird das  
Tetrahydrofuran abrotiert, der Rückstand in 30 ml 2 N Salzsäure aufgenommen, dreimal mit je 30  
ml Essigsäureethylester gewaschen und mit konzentriertem wäßrigen Ammoniak basisch  
gemacht. Danach wird die Lösung dreimal mit je 30 ml Essigsäureethylester extrahiert, die  
vereinigten organischen Phasen einmal mit gesättigter wäßriger Natriumchloridlösung  
gewaschen, getrocknet ( $Na_2SO_4$ ), filtriert und eingedampft. Das Rohprodukt wird mittels FLC (15  
g Kieselgel, Laufmittel:  $CHCl_3$  : MeOH = 97:3) gereinigt.
- 140 83 % farblose Kristalle, Schmp.: 60 - 63°C  
DC:  $CHCl_3$  : MeOH = 9:1

#### Schritt 2



- 145 Zu einer auf -5°C gekühlten Lösung von 0.72 mmol Edukt in 5 ml absolutem Methanol werden 146  
mg (1.44 mmol) Triethylamin sowie 162 mg (1.58 mmol) 3-(Dimethylamino)propylamin zugetropft.  
Anschließend läßt man das Reaktionsgemisch bei Raumtemp. 24 Stdn. rühren und rotiert sodann  
Methanol, Triethylamin und 3-(Dimethylamino)propylamin ab. Das erhaltene Rohprodukt wird  
über FLC (15 g Kieselgel, Laufmittel:  $CHCl_3$ : MeOH = 9:1 mit 0.5 % konzentriertem wäßrigen  
Ammoniak) gereinigt, wodurch farblose Kristalle vom Schmp. 119 - 121°C mit einem Drehwert



von  $\alpha_D^{20}[c = 0.1, \text{CHCl}_3] = -264^\circ$  an Produkt erhalten werden.

155

DC:  $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 9:1$

160


$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.56 - 1.89, m, 2H; 2.78, m, 1H; 3.02, m, 1H; 3.24, m, 1H; 3.48, m, 1H; 2.32, s, 1H; 3.83, s, 1H; 3.63, d, 1H; 4.07, d, 1H; 4.62, b, 1H; 4.98, b, 1H; 5.74, d, 1H; 6.11, d, 1H; 6.54, d, 1H; 6.64, d, 1H.

#### Beispiel 145:

SPH-1273 CB 99

165

(4aS,6R,8aS)-11-Methyl-3-phenoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol



170

Zu einer Lösung von 1.0g (3.6mmol) O-Demethylgalanthamin in 50 ml Dichlormethan wurden 0.44 g (3.6 mmol) Benzolborsäure, 2.5ml (9mmol) Triethylamin, 0.67 g (3.6 mmol) Kupfer(II)acetat und 1 g Molsieb (4Å, zerkleinert) gegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 44h bei Raumtemperatur gerührt. Der Feststoffe wurde abfiltriert. Das Filtrat wurde 2 mal mit je 30 ml gesättigter Natriumhydrogencarbonat – Lösung extrahiert. Die wäßrige Phase wurde mit 3 mal mit je 30 ml Methylenchlorid rückextrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel wurde abdestilliert. Das Rohprodukt (0.55 g 43.7 % d. Th.) wurde mittels Säulenchromatographie ( $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} = 95:5$ ) gereinigt.  
Ausbeute : 0.3 g (23.8% d. Th.)

180

DC:  $\text{CHCl}_3 : \text{CH}_3\text{OH} = 9:1$

CB 99:

185

$^1\text{H-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.29 (m, 2H), 7.04 (t,  $J = 7.2$  Hz, 1H), 6.89 (d,  $J = 8.7$  Hz, 2H), 6.73 (dd,  $J_1 = 31.6$  Hz,  $J_2 = 8.7$  Hz, 2H), 6.03 (m, 2H), 4.59 (s, 1H), 4.51 (b, 1H), 4.17 (d,  $J = 15.3$  Hz, 1H), 3.77 (d,  $J = 15.3$  Hz, 1H), 3.33 (t,  $J = 13.0$  Hz, 1H), 3.10 (d,  $J = 14.5$  Hz, 1H), 2.53 (m, 1H), 2.43 (s, 3H), 2.15 (m, 1H), 1.89 (m, 1H), 1.62 (d,  $J = 13.8$  Hz, 1H);  $^{13}\text{C-NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  157.3 (s), 148.1 (s), 139.6 (s), 134.2 (s), 129.6 (2\*d), 128.1 (d), 126.2 (d), 122.8 (d), 122.7 (d), 120.2 (d), 116.8 (d), 88.7 (d), 61.7 (d), 59.9 (t), 53.2 (t), 48.1 (s), 41.2 (q), 32.8 (t), 29.7 (t).


Anal. ( $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{NO}_3 \cdot 0.2 \text{CHCl}_3$ )

Ber. C 71.43H 6.26 N 3.75  
190 Gef. C 71.43H 6.61 N 3.84

**Beispiel 146:**

**SPH-1288** HM 112, DD 13

(6R)-3,6-Dihydroxy-N<sup>11</sup>-isopropyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-  
195 11(12H)-carbonsäureamid




Zu einer Lösung von 1.6 mmol Edukt in 17 ml absolutem Dichlormethan wurde unter Argon  
200 bei -5°C eine Lösung von 0,42 ml (4,3 mmol) Bortribromid in 4 ml absolutem Dichlormethan langsam  
zugetropft. Nach 3 Stunden Rühren bei -5 bis 0°C wurde das Reaktionsgemisch auf 20 ml Wasser  
gegossen und mit Natriumhydrogencarbonat gesättigt. Die wäßrige Phase wurde 4 mal mit je 15 ml  
n-Butanol extrahiert und das Lösungsmittel wurde abdestilliert. Der Rückstand wurde mittels  
Säulenchromatographie (LM: CHCl<sub>3</sub>:CH<sub>3</sub>OH = 97:3) gereinigt und bei 50°C/50 mbar getrocknet.  
205 <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 6.57 (dd, J<sub>1</sub> = 18.7 Hz, J<sub>2</sub> = 8.0 Hz, 2H), 5.94 (dd, J<sub>1</sub> = 21.4 Hz, J<sub>2</sub> = 10.4 Hz, 2H), 4.90  
(dd, J<sub>1</sub> = 10.6 Hz, J<sub>2</sub> = 6.0 Hz, 1H), 4.36 (m, 3H), 3.85 (m, 1H), 3.33 (t, J = 12.1 Hz, 1H), 2.93 (m, 1H), 2.25  
(m, 1H), 1.87 (m, 2H), 1.24 (m, 1H), 1.06 (dd, J<sub>2</sub> = 21.3 Hz, J<sub>2</sub> = 6.5 Hz, 6H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 156.7 (s),  
146.5 (s), 141.0 (s), 131.5 (s), 130.1 (s), 128.1 (d), 127.1 (d), 120.1 (d), 115.5 (d), 88.2 (d), 51.6 (t), 48.0 (s),  
45.9 (t), 42.8 (d), 42.0 (d), 36.8 (t), 34.2 (t), 23.5 (q), 23.1 (q).  
210 Anal. (C<sub>19</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>\* 0.8 CHCl<sub>3</sub>) (JOS 1622).  
Ber. C 54.0 H 5.68 N 6.37  
Gef. C 54.08 H 5.61 N 6.33

**Beispiel 147:**

215 **SPH-1302** HM 203

(4aa,6β,8aR\*)-4a,5,9,10-Tetrahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-  
11(12H)-carbonsäure-1,1-dimethylethylester (8d)




230

235

24

SPH-1339      HM 264-1



## 2

Prozedur:  
Eine Lösung von 250 mg (0.92 mmol) (-)-Norgalanthamin und 160 mg (2.76 mmol) Propylmagnesiumbromid in 20 ml absolutem Acetonitril wurden portionsweise mit 145 mg (2.3 mmol) Natriumcyanoborhydrid versetzt und für 12 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wurden nochmals 145 mg (2.3 mmol) Natriumcyanoborhydrid portionsweise hinzugefügt und das Reaktionsgemisch für weitere 6 Stunden

gerührt. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels erfolgte die Aufarbeitung nach Vorschrift A1.  
Die weitere Reinigung erfolgte mittels MPLC (Laufmittel: Chloroform : Methanol/NH<sub>3</sub> = 95 : 5). Es  
wurden 200 mg (70 % d. Th.) an HM 264 erhalten.

DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH/NH<sub>3</sub> 9 : 1

260 Methode 2:

Eine Lösung von 200 mg (0.73 mmol) (-) Norgalanthamin und 120 mg (1.46 mmol) Natriumacetat in  
12 ml Wasser, 4 ml absolutem Ethanol und 0.62 ml Eisessig wurde auf 0°C gekühlt, mit 211 mg (3.65  
mmol) Propanal versetzt und für 5 Minuten gerührt. Anschließend wurden 138 mg (3.65 mmol)  
Natriumborhydrid in 10 mg Portionen zugegeben. Nach 20 Minuten wurden weitere 211 mg (3.65  
mmol) Propanal und 138 mg (3.65 mmol) Natriumborhydrid zugegeben und für 30 Minuten gerührt.  
Dann wurde das Reaktionsgemisch wie in Vorschrift A1 beschrieben aufgearbeitet. Es wurden 210  
mg (91 % d. Th.) an HM 264 erhalten.

DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH/NH<sub>3</sub> 9 : 1


270

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>, 200.13 MHz): δ 0.88 (t, J = 7.2, 3H), 1.96-2.11 (m, 2H), 2.45 (sextett, J = 7.8, J = 4.6, J =  
5.0 Hz, 2H), 2.68 (ddd, J = 15.7, J = 1.8, J = 1.8, 1H), 3.18 (ddd, J = 14.9, J = 3.1, J = 3.1 Hz, 1H), 3.35  
(ddd, J = 14.4, J = 2.2, J = 1.9, 1H), 3.80 (d, J = 15.3 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 4.10 (d, J = 15.3, 1H), 4.12 (b,  
1H), 4.60 (b, 1H), 5.96-6.13 (m, 2H), 6.61 (d, J = 8.2, 1H), 6.68 (d, J = 8.2, 1H); <sup>13</sup>C-NMR (CDCl<sub>3</sub>, 50.32  
MHz): δ 11.8 (q), 20.5 (t), 29.9 (t), 32.9 (t), 48.4 (s), 51.4 (t), 53.5 (t), 55.8 (q), 57.7 (t), 62.0 (d), 88.6 (d),  
111.1 (d), 121.9 (d), 127.0 (d), 127.4 (d), 129.6 (s), 133.1 (s), 143.9 (s), 145.7 (s)

275

**Beispiel 150:**

280 **SPH-1340** HM 265-1  
N-Demethyl-N-propargyl-galanthamin (



285 Eine Lösung aus 0.50 g (1.83 mmol) (-)Demethylgalanthamin, 0.51 g (3.66 mmol) Kaliumcarbonat  
und 0.55 g (3.66 mmol) Natriumiodid in 25 ml Dimethylformamid wurde mit 2.20 mmol Reagens

290

295

500

305

SPH-1357



310


315

SPH-1377      BK-34-2

SPH-1377 BK-34-Z  
2-[4-[(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-

ef][2]benzazepin-11-yl]butyl]-5-methoxyindan-1-on, fumarat

325



Herstellung aus Beispiel 151 analog Beispiel 7/Herstellung des Fumarats.

Schp.: 107-110°C

330

$C_{30}H_{35}NO_5 \cdot 5/4 C_4H_4O_4 \cdot 1 H_2O$

Berechnet C, 64.07 H, 6.44

Gefunden C, 64.26 H, 6.41

N, 2.11

N, 2.23

335

$^1H$ -NMR (ppm,  $CDCl_3$ ):  $\delta$  7.56 (d,  $J = 10$  Hz, 1H), 7.10 (s, 1H), 6.98 (d,  $J = 10$  Hz, 1H), 6.80 (m, 2H), 6.63 (s, 2H), 6.13 (d,  $J = 12.0$  Hz, 1H), 5.89 (m, 1H), 4.61 (s, 1H), 4.50 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 4.07 (b, 2H), 3.88 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 3.52 (t,  $J = 12$  Hz, 1H), 3.31 (m, 2H), 2.69 (m, 5H), 2.30 (d,  $J = 12$  Hz, 1H), 2.07 (m, 2H), 1.74 (m, 4H), 1.38 (m, 3H);  $^{13}C$ -NMR (ppm,  $CDCl_3$ ): 206.3 (s), 166.9 (s), 165.3 (s), 157.2 (s), 146.3 (s), 144.6 (s), 133.1 (d), 129.7 (s), 129.4 (s), 126.4 (d), 125.1 (d), 122.5 (d), 115.8 (d), 112.7 (d), 110.3 (d), 86.8 (d), 65.3 (t), 60.0 (t), 56.1 (q), 55.8 (q), 51.1 (t), 47.5 (d), 46.9 (d), 32.5 (t), 32.5 (t), 31.9 (t), 31.2 (t), 30.8 (t), 24.9 (t), 24.2 (t).


340

Beispiel 157:

345


SPH-1515

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-3,6-Dihydroxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benzazepin-11(12*H*)-yl]carbonsäureallylester (ML-7)




350

Zu einer Suspension von 0.788 g (0.552 g, 2.13 mmol) Norsanguinin (HPLC-Reinheit 70 %) und 10 ml absolutem Dichlormethan werden unter Inertgasatmosphäre mittels einer Spritze über ein Septum 2.11 ml (1.538 g, 19.3 mmol) Triethylamin und 0.81 ml (0.693 g, 6.384 mmol)



Trimethylsilylchlorid zugespritzt, und die Suspension wird drei Stunden bei Raumtemperatur  
355 gerührt. Währenddessen fällt ein flockiger Niederschlag aus. Dann werden 0.34 ml (0.385 g, 3.192  
mmol) Chlorameisensäureallylester unter Eisbadkühlung zugegeben (exotherm). Das  
Reaktionsgemisch wird innerhalb von zwei Stunden unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmt,  
indem man das Eisbad auftauen läßt. Die Reaktion wird durch die Zugabe von 13 ml 2 N  
360 Salzsäure gestoppt, und die Phasen werden getrennt. Die organische Phase wird viermal mit  
jeweils 10 ml 2 N Salzsäure und einmal mit Kochsalzlösung gewaschen, die vereinigten wäßrigen  
Phasen werden einmal mit 20 ml Dichlormethan rückextrahiert. Die vereinigten organischen  
Phasen werden über Natriumsulfat getrocknet und filtriert. Nach dem Abdestillieren des  
Lösungsmittels im Rotationsverdampfer wird das Rohprodukt (HPLC-Reinheit 87.5 %) mittels MPLC  
365 gereinigt (50 g Kieselgel,  $\nu = 285$  nm, Chloroform/Methanol = 95/5). Nach dem Einengen und  
dem Trocknen im Hochvakuum wird das Produkt als gelbliches, hochviskoses Öl erhalten,  
welches beim Einengen aus Dichlormethan kristallisiert. Ausbeute: 0.443 g (1.29 mmol, 61 %),  
farbloser kristalliner Feststoff, ( $M_w = 343.4$ ), DC:  $R_f = 0.55$  (Chloroform/Methanol = 9/1),  
Schmp.: 197-198°C (Dichlormethan).  
 $^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)  $\delta$  7.66 (bs, 0.3 H), 6.52 – 6.76 (m, 2 H), 5.95 (bs, 2 H), 5.72 –  
370 5.90 (m, 1 H), 5.06 – 5.36 (m, 2 H), 4.90 (d,  $J = 12.7$  Hz, 0.5 H) und 4.79 (d,  $J = 12.7$  Hz, 0.5 H), 4.51  
(bs, 3 H), 4.00 – 4.41 (m, 3 H), 3.22 – 3.53 (m, 1 H), 3.13 (bs, 0.3 H), 2.58 (bd,  $J = 13.4$  Hz, 1 H), 1.63 –  
2.10 (m, 3 H),  $^{13}\text{C-NMR}$ : (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS),  $\delta$  155.4 und 155.2 (s), 145.4 (s), 140.6 (s),  
132.7 und 132.6 (d), 131.9 und 131.7 (s), 128.3 (s), 127.1 (d), 127.0 (d), 121.6 und 121.1 (d), 117.4  
und 116.8 (t), 115.8 und 115.7 (d), 87.7 (d), 66.1 und 65.9 (t), 61.8 (d), 51.9 und 51.5 (t), 48.4 (s),  
375 45.9 und 45.4 (t), 37.0 und 36.0 (t), 29.5 (t)

Schema zu Beispiel 158 und 159






# Beispiel 158

SPH-1522

(4aS,6R,8aS)-N<sup>11</sup>-(N-tert.-Butoxycarbonyl-6-aminohexyl)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro-[3a,3,2-ef]-[2]benzazepin-11(12H)carboxamid (CK-52-6)



0.600 g (0.426 mmol) N-tert.-Butoxycarbonylnorgalanthamin-6-yloxy-1,5-dioxopentyloxymethyl-Merrifieldharz werden in einer beiderseits verschließbaren 10-ml-Polyethylenfritte 30 Minuten in ausreichend Dichlormethan gequollen und analog der Entschützungs-vorschrift für die Immobilisierung von N-tert.-Butoxycarbonylnorgalanthamin (Beispiel 147) demaskiert und gewaschen (jeweils 6 ml Lösungsmittel). Anschließend wird das Harz analog der obigen Vorschrift mit 730 µl (0.551 g, 4.260 mmol) Ethyldiisopropylamin und 0.379 g (1.278 mmol) Triphosgen in 6 ml absolutem Dichlormethan umgesetzt. Nach dem Waschen und dem Trocknen des Harzes im Vakuum über Nacht erhält man 0.653 g des N-Chlorocarbonylnorgalanthamin-6-yloxy-1,5-dioxopentyloxymethyl-Merrifieldharzes.

Nach dem Quellen des Harzes (0.103 g, 0.065 mmol) und dem Filtrieren wird es in einer Lösung aus 0.164 g (0.650 mmol) N-tert.-Butoxycarbonyl-1,6-diaminohexanhydrochlorid, 222 µl (0.168 g, 1.300 mmol) Ethyldiisopropylamin, 0.053 µl (0.051 g, 0.650 mmol) Pyridin und 2.0 ml Dimethylformamid suspendiert (Um das Hydrochlorid zu lösen, wird die Lösung vorher erwärmt). Anschließend wird die Suspension bei Raumtemperatur 5.5 Stunden geschüttelt. Das Harz wird dreimal mit Dimethylformamid (2 min, 1 ml) und sechsmal mit Dichlormethan (2 min, 1 ml) gewaschen. Nach dem Trocknen im Vakuum wird das Harz in 2 ml Tetrahydrofuran für 30 Minuten geschüttelt und nach dem Filtrieren mit einer Lösung aus 0.059 g (0.018 g, 0.325 mmol) 30 %ger Natriummethanolat-Methanol-Lösung und 1.5 ml Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) versetzt. Nach 9.5 Stunden Schütteln bei Raumtemperatur wird die Lösung abfiltriert, und das Harz dreimal mit jeweils 1.5 ml Dichlormethan/Methanol (1/1) und dreimal mit jeweils 1.5 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit methanolischer Salzsäure neutralisiert, mit 10 ml Dichlormethan verdünnt, einmal mit 15 ml 2 N Salzsäure und zweimal mit jeweils 15 ml gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und im Rotationsverdampfer unter verminderten Druck eingeeengt. Das Rohprodukt (0.051 g) wird mittels Säulenchromatographie (5

g Kieselgel, Chloroform/Methanol = 50/1) getrennt. Nach dem Einengen erhält man ein farbloses Öl.

Ausbeute: 0.030 g (0.058 mmol, 89 %), farbloses Öl ( $M_w = 515.7$ )

DC  $R_f = 0.47$  (Chloroform/Methanol = 9/1)

$^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

6.73 (d,  $J = 8.1$  Hz, 1 H), 6.66 (d,  $J = 8.3$  Hz, 1 H), 5.90 - 6.07 (m, 2 H), 4.23 - 4.70 (m, 5 H), 4.13 (bs, 1 H), 3.82 (s, 3 H), 3.35 (t,  $J = 13.5$  Hz, 1.0 H), 2.96 - 3.20 (m, 4 H), 2.67 (bd,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 1.65 - 2.10 (m, 3 H), 1.42 (s, 9 H), 1.06 - 1.40 (m, 8 H)


$^{13}\text{C-NMR}$ : (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

$\delta$  157.2, 156.0, 147.0, 144.7, 132.5, 129.2, 128.1, 126.5, 120.2, 111.2, 88.4, 61.9, 55.9, 51.7, 48.5, 45.7, 42.1, 40.5, 39.3, 36.6, 30.0, 29.7, 28.4, 26.1, 23.5

HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 17.8$  min, 98.7 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5.0  $\mu\text{m}$ , 1 ml/min, 285 nm, Acetonitril/ 20 mM  $\text{Cl}_3\text{CCO}_2\text{H}$  in  $\text{H}_2\text{O}$  (20/80 für 5 min, 20/80  $\rightarrow$  60/40 in 12 min, 60/40 für 5 min, v/v)

#### Beispiel 159

**N-ferf.-Butyloxycarbonylglycin-[4-[(4aS,6R,8aS)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl]-3-aza-4-oxobutyl]amid (CK-58-2)**



0.199 g (0.102 mmol) Norgalanthamin-6-yloxy-1,5-dioxopentylloxymethyl-Merrifieldharz werden in einer beiderseits verschließbaren 5-ml-Polyethylenfritte 30 Minuten in 2 ml Dichlormethan gequollen und nach dem Filtrieren in einer Lösung von 120  $\mu\text{l}$  (0.091 g, 0.700 mmol) Ethyldiisopropylamin

in 1.5 ml Dichlormethan suspendiert. Anschließend wird die Suspension mit einer auf 0°C gekühlten Lösung aus 0.062 g (0.210 mmol) Triphosgen und 0.5 ml Dichlormethan versetzt und bei Raumtemperatur zwei Stunden geschüttelt. Das Harz wird dreimal mit Dichlormethan (2 min, 2 ml) und dreimal mit Dimethylformamid (2 min, 2 ml) gewaschen. Nachfolgend fügt man eine Lösung aus 47 µl (0.042 g, 0.700 mmol) Ethylendiamin und 2.0 ml Dimethylformamid zu und schüttelt die Suspension bei Raumtemperatur. Nach drei Stunden wird die Lösung abfiltriert, und das Harz sechsmal mit jeweils 2 ml Dimethylformamid (2 min) gewaschen (Der Kaiser-Test ist nicht auswertbar. Die Beads zeigen eine braunrote Färbung). Das Harz versetzt man mit einer Lösung aus 0.037 g (0.210 mmol) N-BOC-Glycin, 0.028 g (0.210 mmol) 1-Hydroxybenzotriazol und 1 ml Dimethylformamid und schüttelt die Suspension fünf Minuten. Anschließend werden 0.043 g (0.210 mmol) Dicyclohexylcarbodiimid, gelöst in 1 ml Dichlormethan, zugesetzt. Man schüttelt die Suspension drei Stunden bei Raumtemperatur, filtriert das Harz und wäscht es dreimal mit Dimethylformamid (2 ml, 2 min) und sechsmal mit Dichlormethan (2 ml, 2 min). Nach dem Trocknen im Vakuum erhält man 0.239 g Harz, welches in Tetrahydrofuran für 30 Minuten geschüttelt und nach dem Filtrieren mit einer Lösung aus 0.076 g (0.023 g, 0.63 mmol) 30 %ger Natriummethanolat-Methanol-Lösung und 2.0 ml Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) versetzt wird. Nach 8.25 Stunden Schütteln wird die Lösung abfiltriert, und das Harz dreimal mit jeweils 2 ml Dichlormethan/Methanol (1/1) und dreimal mit jeweils 2 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit methanolischer Salzsäure neutralisiert, mit 10 ml Dichlormethan verdünnt, zweimal mit 15 ml gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und im Rotationsverdampfer unter verminderten Druck eingeeengt. Das Rohprodukt (0.064 g) wird mittels Säulenchromatographie (5 g Kieselgel, Chloroform/Methanol = 25/1 □ 15/1) getrennt. Nach dem Einengen erhält man ein farbloses Öl.

Ausbeute: 0.030 g (0.025 g, 0.048 mmol, 47 %), farbloses Öl ( $M_w = 516.6$ )

DC  $R_f = 0.38$  (Chloroform/Methanol = 9/1)

$^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

$\delta$  6.90 (bs, 1 H), 6.83 (d,  $J = 8.1$  Hz, 1 H), 6.60 - 6.71 (m, 1 H), 5.88 - 6.08 (m, 2 H), 5.39 (bs, 1 H), 5.19 (bs, 1 H), 4.50 - 4.70 (m, 2 H), 4.04 - 4.34 (m, 3 H), 3.82 (s, 3 H), 3.70 (d,  $J = 6.1$  Hz, 1 H), 3.65 (d,  $J = 5.6$  Hz, 1 H), 3.11 - 3.49 (m, 5 H), 2.68 (d,  $J = 15.9$  Hz, 1 H), 2.41 (d,  $J = 10.9$  Hz, 1 H), 1.65 - 2.09 (m, 3 H), 1.44 (s, 9 H)

HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 15.2$  min, 82.3 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5.0  $\mu\text{m}$ , 1 ml/min, 285 nm, MeOH/ H<sub>2</sub>O (5/95 für 5 min, 5/95  $\rightarrow$  100/0 in 15 min (konvex), 100/0 für 10 min, v/v)

LC/MS:  $t_{\text{Ret}} = 30.6$  min, (Phenomenex Luna-Säule, 3.0 mm x 50 mm, RP-18, 3.0  $\mu\text{m}$ , 0.8 ml/min, Methanol/H<sub>2</sub>O (10/90 für 2 min, 10/90  $\rightarrow$  100/0 in 15 min, 100/0 für 5 min, v/v)


APCI-PI-MS

517 (17), 499 (5), 461 (55), 443 (39), 417 (100), 399 (18), 274 (43), 256 (16)

### Beispiel 160

#### SPH-1524

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-(Benzoyloxy)-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benzazepin-11(12*H*)-yl)carbonsäureallylester (CK-65-1)



0.075 g (0.210 mmol) N-Allyloxycarbonylnorgalanthamin, 0.475 g (2.098 mmol) Benzoesäureanhydrid und 0.013 g (0.105 mmol) Dimethylaminopyridin werden in 2 ml Dichlormethan vorgelegt und anschließend mit 0.185 ml (0.136 g, 1.049 mmol) Ethyldiisopropylamin versetzt. Nach 13 Stunden bei Raumtemperatur wird die Lösung mit 5 ml gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung aufgenommen, dreimal mit jeweils 5 ml Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden mit 10 ml gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung, zweimal mit 10 ml 2 N Salzsäure und zweimal mit 10 ml gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und im Rotationsverdampfer unter verminderten Druck eingeeengt. Der Rückstand wird zweimal jeweils 10 ml Petrolether digeriert, und die Lösung wird abdekantiert. Der Rückstand (0.100 g) wird durch Säulenchromatographie (10 g Kieselgel, Laufmittel = Petrolether/Essigsäureethylester = 2/1) gereinigt.

Ausbeute: 0.066 g (0.080 mmol, 68 %), farbloser Schaum ( $M_w = 461.5$ )

DC:  $R_f = 0.52$  (Essigsäureethylester/Petrolether = 2/1)

mp.:  $45 - 49^\circ\text{C}$  (Essigsäureethylester/Petrolether = 2/1)

IR: KBr

$\nu$  ( $\text{cm}^{-1}$ ) 2946 (m), 1708 (s), 1509 (m), 1483 (m), 1276 (s), 1108 (m), 1056 (m), 714 (m)


$^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

$\delta$  8.06 (d,  $J = 7.1$  Hz, 1 H), 7.29 - 7.61 (m, 3 H), 6.59 - 6.84 (m, 2 H), 6.28 (d,  $J = 10.3$  Hz, 5 H), 6.07 (dd,  $J = 5.0$  Hz,  $J = 10.2$  Hz, 1 H), 5.76 - 5.99 (m, 1 H), 5.59 (t,  $J = 4.4$  Hz, 1 H), 5.09 - 5.35 (m, 2 H), 4.87 (dd,  $J = 15.7$  Hz,  $J = 22.0$  Hz, 1 H), 4.05 - 4.70 (m, 5 H), 3.89 (s, 3 H), 3.29 - 3.60 (m, 1 H), 2.81 (bd,  $J = 16.1$  Hz, 1 H), 1.74 - 2.25 (m, 3 H)

$^{13}\text{C-NMR}$ : (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

$\delta$  166.2 (s), 155.3 und 155.1 (s), 147.4 und 147.3 (s), 144.3 (s), 132.99 und 132.85 (d), 131.7 (d), 131.4 und 131.0 (s), 130.4 (s), 129.9 (d), 128.4 (d), 127.1 (d), 120.7 und 120.2 (d), 117.4 und 116.8 (t), 111.4 und 111.3 (d), 86 (d), 66.1 und 66.0 (t), 63.4 (d), 56.0 (q), 63.8 (d), 51.9 und 51.4 (t), 48.3 (s), 45.8 und 45.4 (t), 37.9 und 37.0 (t), 27.8 (t)


**Schema zu Beispiel 161 und 162**



# Beispiel 161

## SPH-1525

Immobilisierung von (4aS,6R,8aS)-3,6-Dihydroxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef]-[2]benzazepin-11(12H)-yl)carbonsäureallylester an einem *para*-Hydroxymethylphenoxy-Poly-styrolharz (Wang-Harz)



### Methode A (CK-63-2)

0.257 g (0.244 mmol) Wang-Harz<sup>1</sup> werden unter Argonatmosphäre in 3 ml absolutem Dichlormethan für 15 Minuten gerührt. Anschließend tropft man innerhalb von fünf Minuten bei 0°C 86 µl (0.141 g, 1.19 mmol) Thionylchlorid zu. Die Suspension wird bei 0°C eine Stunde lang gerührt. Danach wird das Harz in eine beidseitig verschließbare Polyethylenfritte überführt, fünfmal mit Dichlormethan (2 min, 2.5 ml), zweimal mit Methanol (2 min, 2.5 ml), einmal mit Dichlormethan (2 min, 2.5 ml) und einmal mit Diethylether (2 min, 2.5 ml) gewaschen. Das Harz wird anschließend im Vakuum über Phosphorpentoxid getrocknet.

### Schritt 1

0.2334 g des so hergestellten Chlor-Wang-Harzes, 0.232 g (0.713 mmol) Cäsiumcarbonat, 0.088 g (0.238 mmol) Tetra-n-butylammoniumjodid und 0.245 g (0.713 mmol) N-Alloc-Norsanguinin werden in 3 ml absolutem Dimethylformamid unter Rühren suspendiert. Anschließend rührt man die Suspension für 24 Stunden bei 60°C. Nach fünf Stunden fügt man 1 ml Dimethylformamid hinzu, um den ausgefallenen Niederschlag zu suspendieren. Danach wird das Harz in eine beidseitig verschließbare Polyethylenfritte mit Dimethylformamid/Wasser-Lösung (2/1) überführt, zweimal mit Dimethylformamid/Wasser-Lösung (2/1, 2 min, 2.5 ml), zweimal mit Dimethylformamid/Wasser-Lösung (1/2, 2 min, 2.5 ml), zweimal mit Methanol/Wasser-Lösung (1/1, 2 min, 2.5 ml), zweimal mit Methanol (2 min, 2.5 ml) und sechsmal mit Dichlormethan (2 min, 2.5 ml) gewaschen.

<sup>1</sup> P-Alkoxybenzylalkohol-Resin, D-1250, Bachem Feinchemikalien AG

#### Methode B (CK-63-1)

0.121 ml (0.192 g, 1.247 mmol) Tetrachlorkohlenstoff werden in 2.0 ml absolutem Dichlormethan bei 0°C vorgelegt. Unter Rühren (KPG-Rührer) werden 0.311 g (1.188 mmol) Triphenylphosphin, gelöst in 1.0 ml absolutem Dichlormethan, innerhalb von 15 Minuten bei 0°C zugetropft. Man rührt weitere zehn Minuten bei 0°C und dann weitere zehn Stunden bei Raumtemperatur, bis man dünnschichtchromatographisch kein Triphenylphosphin mehr nachweisen kann. Nachfolgend werden 0.2506 g (0.238 mmol) Wang-Harz<sup>1</sup> und 1.5 ml Dichlormethan zugefügt, und die Suspension wird für 35 Stunden bei Raumtemperatur gerührt (300 s<sup>-1</sup>). Die Aufarbeitung des chlorierten Wang-Harzes erfolgt analog der Methode A. Nach dem Trocknen erhält man 0.2403 g Chlor-Wang-Harz, welches analog dem obigen Schritt 1 mit den gleichen Stoffmengen an Cäsiumcarbonat, Tetra-n-butylammoniumjodid und N-Alloc-Norsanguinin umgesetzt wird.

#### Beispiel 162

##### SPH-1526

**Feststellung der Beladung, (4aS,6R,8aS)-6-(Benzoyloxy)-3-hydroxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)carbonsäureallylester**

#### Schritt 1 (CK-63-2)

Zur Feststellung der Beladung und zum Nachweis, daß das N-Alloc-Norsanguinin über die Phenolfunktion an das Harz gebunden wird, wird das Harz, welches durch die Methode A und Schritt 1 erhalten wird, sukzessive mit einer Lösung bestehend aus 0.537 g (2.375 mmol) Benzoesäureanhydrid und 2 ml Dichlormethan und einer Lösung bestehend aus 0.015 g (0.119 mmol) Dimethylaminopyridin, 0.203 ml (0.154 g, 1.188 mmol) Ethyldiisopropylamin und 0.5 ml Dichlormethan versetzt. Anschließend schüttelt man die Suspension bei Raumtemperatur. Nach 18 Stunden wird das Harz abfiltriert, sechsmal mit jeweils 2.5 ml Dichlormethan (2 min) und einmal mit 2.5 ml Diethylether (2 min) gewaschen und im Vakuum über Phosphorpentoxid getrocknet. Man erhält 0.3085 g substituiertes Harz, welches in absolutem Dichlormethan für 15 Minuten suspendiert wird und anschließend gut filtriert wird.

#### Schritt 2

Zur Abspaltung wird das Harz mit 2.5 ml Trifluoressigsäure/Dichlormethan-Lösung (15/85) versetzt, 30 Minuten bei Raumtemperatur geschüttelt, filtriert und nochmals mit 2.5 ml Trifluoressigsäure/Dichlormethan-Lösung (15/85) in geschüttelt, filtriert und abschließend viermal mit jeweils 2.5 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Filtrate bzw. Extrakte werden mit 10 ml aqua dest aufgenommen und mit Natriumhydrogencarbonat auf pH 6 eingestellt. Die Phasen werden separiert, und die wäßrige Phase wird dreimal mit 10 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden zweimal mit jeweils 10 ml gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewa-



schen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und konzentriert. Die Reinigung des Rohproduktes (0.078 g) erfolgt mittels Säulenchromatographie (10 g Kieselgel, Essigsäureethylester/Petrolether = 2/1). Nach dem Einengen und Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.078 g eines farblosen Schaumes, der laut HPLC-Analyse 95 % rein ist. Der farblose Schaum kann durch Umkristallisation aus Diethylether bei -22°C (Eisfach vom Kühlschrank) gereinigt werden.

Ausbeute: 0.059 g (0.056, 0.0125 mmol, Somit errechnet sich eine Beladung von 0.41 mmol/g, 61 % der theoretischen Maximalbeladung<sup>2</sup>), farbloser Schaum ( $M_w = 447.5$ )

DC:  $R_f = 0.29$  (Essigsäureethylester/Petrolether = 1/1)

mp.: 158 – 159°C (Diethylether)

<sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, d<sub>6</sub>-DMSO)

δ 7.99 (d,  $J = 6.5$  Hz, 2 H), 7.38 – 7.71 (m, 3 H), 6.39 – 6.63 (m, 3H), 5.73 – 6.17 (m, 2 H), 5.47 (t,  $J = 4.3$  Hz, 1 H), 5.04 – 5.33 (m, 2 H), 4.00 – 4.72 (m, 6 H), 2.60 – 2.89 (m, 1 H), 2.55 (bd,  $J = 18.6$  Hz, 1 H) 2.25 (bd,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 1.70 – 1.93 (m, 2 H)

<sup>13</sup>C-NMR: (50.32 MHz, d<sub>6</sub>-DMSO)

δ 165.4 (s), 154.6 und 154.4 (s), 146.3 (s), 141.3 (s), 133.5 (d), 133.3 (d), 133.2 (d), 131.8 (d), 131.5 (s), 130.2 (s), 129.5 (d), 128.6 (d), 128.0 (s), 122.2 (d), 120.4 und 120.0 (d), 117.0 und 116.1 (t), 115.0 (d), 84.7 (d), 65.2 und 65.0 (t), 63.8 (d), 51.0 und 50.5 (t), 48.0 (s), 45.1 und 44.7 (t), 37.3 und 36.4 (t), 27.4 (t)

HPLC:  $t_{Ret} = 21.41$  min, 95.1 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5 µm, 285 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM Cl<sub>3</sub>CCO<sub>2</sub>H in H<sub>2</sub>O (15/85 für 5 min, 15/85 → 60/40 in 12 min, 60/40 für 5 min, v/v)

(CK-63-1)

Das Harz, welches durch die Methode B und Schritt 1 erhalten wird, wird analog Schritt 1 mit Benzoesäureanhydrid umgesetzt, und nach dem Trocknen unter Vakuum erhält man 0.3004 g des substituierten Harzes. Die Abspaltung des Produktes und die wässrige Aufarbeitung erfolgen analog Schritt 2. Nach dem Einengen und dem Trocknen im Vakuum erhält man 0.070 g Rohprodukt, welches mittels Säulenchromatographie (10 g Kieselgel, Essigsäureethylester/Petrolether = 2/1)

<sup>2</sup>  $0.67 \text{ mmol/g} = 0.95 \text{ mmol/g} / (1 \text{ g} + 1 \text{ g} * 0.95 \text{ mol/g} * (447.5 \text{ g/mol} - 18 \text{ g/mol})/1000)$

gereinigt wird. Nach dem Einengen und Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.051 g eines farblosen Schaumes, der laut HPLC-Analyse 93 % rein ist.

Ausbeute: 0.051 g (0.047 g, 0.0106 mmol, Somit errechnet sich eine Beladung von 0.35 mmol/g, 52 % der theoretischen Maximalbeladung<sup>3</sup>), farbloser Schaum ( $M_w = 447.5$ )


HPLC:  $t_{Ret} = 21.41$  min, 92.7 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5  $\mu$ m, 285 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $Cl_3CCO_2H$  in  $H_2O$  (15/85 für 5 min, 15/85  $\rightarrow$  60/40 in 12 min, 60/40 für 5 min, v/v)

---


<sup>3</sup>  $0.67 \text{ mmol/g} = 0.95 \text{ mmol/g} / (1 \text{ g} + 1 \text{ g} * 0.95 \text{ mol/g} * (447.5 \text{ g/mol} - 18 \text{ g/mol})/1000)$

# Beispiel 163: Synthese an der festen Phase / manuell

## Schema zu Beispiel 163



Immobilisierung von (4aR,6S,8aR)-3-Methoxy-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol an einem Hydroxymethyl-Polystyrolharz (Merrifield-Harz)



Methode A (CK-41-1) Schritte 1 – 2 und 5 – 7

5.000 g (5.2 mmol) Hydroxymethyl-Merrifieldharz<sup>4</sup> werden in einem Dreihalsglasreaktor mit einer am Boden eingelassenen Fritte und KPG-Rührer in 60 ml Dichlormethan für eine Stunde gerührt (300 s<sup>-1</sup>). Nach dem Filtrieren wird die Suspension mit einer Lösung von 2.373 g (20.8 mmol) Glutarsäureanhydrid, 4.45 ml (3.362 g, 26.0 mmol) Ethyldiisopropylamin in 30 ml absolutem Dichlormethan versetzt. Die Suspension wird bei Raumtemperatur zehn Stunden gerührt, gefiltert, einmal mit 50 ml Dichlormethan, einmal mit 50 ml Methanol und dreimal mit jeweils 50 ml Dichlormethan gewaschen. Das Harz wird anschließend im Vakuum getrocknet.

4.385 g des so hergestellten 4-Carboxy-1-oxobut-1-yloxymethyl-Merrifield-Harz werden für 30 Minuten in 50 ml absolutem Dichlormethan unter Rühren suspendiert und filtriert. Anschließend fügt man 4.569 g (12.23 mmol) N-terf.-Butoxycarbonylnorgalanthamin und 0.249 g (2.04 mmol) Dimethylaminopyridin, beides gelöst in 15 ml Dichlormethan, und 2.10 ml (1.582 g, 12.23 mmol) Ethyldiisopropylamin, gelöst in 5 ml Dichlormethan, zu. Unter Rühren tropft man eine Lösung aus 1.89 ml (1.544 g, 12.23 mmol) Diisopropylcarbodiimid und 5 ml Dichlormethan innerhalb von fünf Minuten bei Raumtemperatur zu. Nach 24 Stunden wird das Harz abfiltriert, mit 40 ml Methanol gewaschen und filtriert. Dann wird das Harz sechsmal mit jeweils 40 ml Dichlormethan (5 min) gewaschen und im Vakuum getrocknet.

Das Harz wird mit 42 ml absolutem Dichlormethan und 3 ml Anisol versetzt und 30 Minuten gerührt (150 s<sup>-1</sup>) gerührt. Anschließend werden unter Rühren (300 s<sup>-1</sup>) 15 ml Trifluoressigsäure innerhalb von 15 Minuten hinzugefügt. Anschließend wird die Suspension 60 Minuten gerührt (150 s<sup>-1</sup>), filtriert und mit Dichlormethan (2 x 40 ml, 5 min), mit Dichlormethan/Dimethylformamid/Triethylamin (5/4/1) (3 x 40 ml, 5 min) und abschließend mit Dichlormethan (5 x 40 ml, 5 min) gewaschen. Nach dem Trocknen im Vakuum erhält man 4.353 g Harz.

<sup>4</sup> Hydroxymethyl-Resin, D-1160, Bachem Feinchemikalien AG

Zur Feststellung der Beladung werden 0.2384 g des Harzes in 3 ml Dimethylformamid in einer beidseitig verschließbaren Polyethylenfritte suspendiert. Nach dem Filtern wird das Harz in einer Lösung aus 177  $\mu$ l (0.191 g, 1.875 mmol) Essigsäureanhydrid, 180  $\mu$ l (0.136 g, 1.050 mmol) Ethyldiisopropylamin und 2 ml Dimethylformamid neun Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach dem Waschen (Dimethylformamid (3 x 2.5 ml, 2 min) und Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) (5 x 2.5 ml, 2 min)) zeigt das Harz mit dem Chloranil-Test keine Reaktion. Man suspendiert das Polymer in einer 0.3 M Natriummethanolat-Lösung in Tetrahydrofuran/Methanol (4/1). Das Harz wird 8 Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt, filtriert und mit Methanol/Dichlormethan (1/1, 3 x 2.5 ml) und mit Dichlormethan (3 x 2.5 ml) extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit methanolischer Salzsäure neutralisiert. Die Lösung wird mit ca. 10 ml Dichlormethan verdünnt, mit jeweils 25 ml ges. Natriumhydrogencarbonat-Lösung, 1 N Salzsäure und gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und konzentriert. Die Reinigung erfolgt mittels Säulenchromatographie (10 g Kieselgel, Diethylether/Ethanol = 100/15). Nach dem Einengen und Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.028 g eines gelblichen Schaumes, der laut HPLC-Analyse 10 % andere Verunreinigungen enthält.

Ausbeute: 0.025 g (0.080 mmol, Somit errechnet sich eine Beladung von 0.34 mmol/g, 45 % der theoretischen Maximalbeladung<sup>5</sup>), gelblicher Schaum ( $M_w = 315.4$ )

DC:  $R_f = 0.29$  (Diethylether/Ethanol = 100/15)

IR: KBr  
 $\nu$  ( $\text{cm}^{-1}$ ) 3551 (v), 3305 (bm), 2926 (m), 2864 (v), 1650 (m), 1615 (s), 1443 (m), 1257 (m), 1070 (m)

$^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)  
 $\delta$  6.54 - 6.89 (m, 2 H), 5.75 - 6.09 (m, 2 H), 5.14 - 5.33 (m, 0.3 H), 4.32 - 4.74 (m, 3.3 H), 4.12 (bs, 1 H), 3.86 - 4.00 (m, 0.3 H), 3.81 und 3.79 (s, 3 H), 3.56 - 3.76 (m, 0.8 H), 3.23 (bt,  $J = 12.6$  Hz, 0.8 H), 2.67 (bd,  $J = 15.9$  Hz, 1 H), 2.38 (bs, 0.7 H), 2.06 (m, 3 H), 1.62 - 2.00 (m, 3 H).

HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 13.9$  min, 89.8 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5  $\mu$ m, 285 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $\text{Cl}_3\text{CCO}_2\text{H}$  in  $\text{H}_2\text{O}$  (05/95 für 5 min, 05/95  $\rightarrow$  60/40 in 10 min, 60/40 für 10 min, v/v, pH 10)

Methode B (CK-43-2), Schritte 1 und 3 – 7

3.500 g (3.64 mmol) Hydroxymethyl-Merrifield-Harz<sup>5</sup> werden analog der unter Methode A beschriebenen Methode mit 1.661 g (14.6 mmol) Glutarsäureanhydrid, 3.15 ml (2.378 g, 18.39 mmol) Ethyldiisopropylamin und 0.044 g (0.364 mmol) Dimethylaminopyridin in 20 ml absolutem Dichlormethan umgesetzt. Nach dem Waschen wird das Harz sukzessive mit einer Lösung aus 3.15 ml (2.378 g, 18.39 mmol) Ethyldiisopropylamin und 10 ml absolutem Dichlormethan und mit einer Lösung aus 1.34 ml (1.317 g, 10.92 mmol) Pivaloylchlorid und neun Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Waschen (Dichlormethan (4 x 30 ml, 5 min), Tetrahydrofuran (30 ml, 5 min) und Dichlormethan (2 x 30 ml, 5 min) wird das Harz sukzessive mit 4.061 g (10.87 mmol) N-tert.-Butoxycarbonylnorgalanthamin und 0.222 g (1.82 mmol) Dimethylaminopyridin, beides gelöst in 15 ml Dichlormethan, und 3.15 ml (2.378 g, 18.39 mmol) Ethyldiisopropylamin, gelöst in 15 ml Dichlormethan, zu. Nach 24 Stunden bei Raumtemperatur wird die Lösung abfiltriert, und das Harz mit 40 ml einer trockenen Lösung aus Methanol und Dichlormethan versetzt und zehn Minuten bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Filtrieren, dem sechsmaligen Waschen mit Dichlormethan und dem Trocknen im Vakuum wird analog der Methode A das Harz mit 40 ml Trifluoressigsäure/Dichlormethan/Anisol (25/70/5), gewaschen und getrocknet. Man erhält 4.145 g eines gelben Harzes. Davon werden 0.2214 g des Harzes zur Bestimmung der Beladung analog der Methode umgesetzt und gereinigt. Man erhält 0.024 g eines gelblichen Schaumes, der laut HPLC-Analyse 90 % rein ist.

Ausbeute: 0.022 g (0.069 mmol, Das entspricht einer Beladung von 0.31 mmol/g, 41 % der theoretischen Maximalbeladung)

HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 14.4$  min, 89.0 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5  $\mu\text{m}$ , 285 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $\text{Cl}_3\text{CCO}_2\text{H}$  in  $\text{H}_2\text{O}$  (05/95 für 5 min, 05/95  $\rightarrow$  60/40 in 10 min, 60/40 für 10 min, v/v, pH 10)


Beispiel 163/Schritte 8 – 13

SPH-1528

N-p-Methoxybenzoyl-phenylalanyl-phenylalanin-((4aS,6R,8aS)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)amid (CK-47-1)

<sup>5</sup>  $0.75 \text{ mmol/g} = 1.04 \text{ mmol/g} / (1 \text{ g} + 1 \text{ g} * 1.04 \text{ mol/g} * (387.4 \text{ g/mol} - 18 \text{ g/mol})/1000)$

<sup>6</sup> Hydroxymethyl-Resin, D-1160, Bachem Feinchemikalien AG



0.245 g (0.076 mmol) N-tert.-Butoxycarbonylnorgalanthamin-6-yloxy-1,5-dioxopentylloxymethyl-Merrifieldharz werden in einer beiderseits verschlossenen 5-ml-Polyethylenfritte zweimal 15 Minuten in 3 ml Dimethylformamid gequollen und nach dem Filtrieren in einer Lösung von 0.065 g (0.169 mmol) Fmoc-Phenylalanin und 0.062 g (0.169 mmol) 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat in jeweils 1 ml Dimethylformamid suspendiert und fünf Minuten bei Raumtemperatur geschüttelt. Anschließend fügt man 58 µl (0.044 g, 0.338 mmol) Ethyldiisopropylamin in 0.5 ml Dimethylformamid zu. Die Suspension wird bei Raumtemperatur 3 Stunden geschüttelt. Das Harz wird sechsmal mit Dimethylformamid (1 min, 2.5 ml) gewaschen und in einer 20 %igen Piperidin-Lösung in Dimethylformamid für jeweils zwei und zehn Minuten bei Raumtemperatur suspendiert. Nach sechsmaligen Waschen mit Dimethylformamid (1 min, 2.5 ml) wird das Harz analog dem ersten Peptidkupplungsschritt mit 0.065 g (0.169 mmol) Fmoc-Phenylalanin und 0.062 g (0.169 mmol) 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat in jeweils 1 ml Dimethylformamid und 58 µl (0.044 g, 0.338 mmol) Ethyldiisopropylamin in 0.5 ml Dimethylformamid umgesetzt, mit Dimethylformamid gewaschen, in 20 %iger Piperidin-Dimethylformamid-Lösung geschüttelt und wiederum sechsmal mit Dimethylformamid (1 min, 2.5 ml) gewaschen. Anschließend gibt man sukzessive Lösungen von 0.065 g (0.169 mmol) Fmoc-Phe-OH in 1 ml Dimethylformamid, 0.062 g (0.169 mmol) 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat in 1 ml Dimethylformamid und 58 µl (0.044 g, 0.338 mmol) Ethyldiisopropylamin in 0.5 ml Dimethylformamid zu, und schüttelt die Suspension 30 Minuten bei Raumtemperatur. Der Kaiser-Test zeigt vollständige Umsetzung an. Anschließend wird analog der oben beschriebenen Prozedur gewaschen, in Piperidin-Dimethylformamid-Lösung suspendiert und wiederum mit Dimethylformamid gewaschen. Nach erneuter sukzessiver Zugabe von 0.026 g (0.169 mmol) p-Methoxybenzoesäure in 1 ml Dimethylformamid, 0.062 g (0.169 mmol) 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat in 1 ml Dimethylformamid und 58 µl (0.044 g, 0.338 mmol) Ethyldiisopropylamin in 0.5 ml Dimethylformamid wird das Harz über Nacht geschüttelt, da der Kaiser-Test nach 30 Minuten aufgrund einer grünbläulichen Färbung nicht eindeutig gewesen ist. Das Harz wird filtriert, dreimal mit Dimethylformamid, fünfmal mit Dichlormethan und mit Methanol gewaschen und anschließend im Vakuum getrocknet. Das Harz (0.251

g) wird für 30 Minuten in THF suspendiert, filtriert und in einer Lösung aus 0.250 g (1.39 mmol) 30 %iger Natriummethanolat-Methanol-Lösung und 2.5 ml Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) suspendiert. Nach acht Stunden wird die Lösung abfiltriert, und das Harz sechsmal mit jeweils 3 ml Dichlormethan/Methanol extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit 106 µl (0.158 g, 1.39 mmol) Trifluoressigsäure neutralisiert, konzentriert und mit präparativer Dünnschichtchromatographie (Kieselgel, Chloroform/Methanol = 100/5) getrennt. Die produktthaltige Kieselgelfraktion wird mit Chloroform/Methanol (9/1) extrahiert, und die vereinigten Extrakte werden nochmals über einen Filter (Porendurchmesser 0.2 µm) gefiltert, eingeeengt und im Vakuum getrocknet.

Ausbeute: 0.041 g (0.029 g, 0.041 mmol, 53 %), rosafarbenes Wachs ( $M_w = 701.8$ ). Das Produkt enthält ein Nebenprodukt (0.006 g, 0.008 mmol, 10 %), daß laut LC/MS ein Diastereomer des Hauptprodukt ist.

DC  $R_f = 0.43$  (Chloroform/Methanol = 20/1)

HPLC:  $t_{Ret} = 2.7$  min, 70.4 % (Phenomenex Luna-Säule, 3.0 mm x 50 mm, RP-18, 3.0 µm, 0.5 ml/min, 285 nm, Methanol/ 20 mM  $Cl_3CCO_2H$  in  $H_2O$  (30/70 v/v))

LC/MS:  $t_{Ret} = 30.6$  min, 73 %, (Phenomenex Luna-Säule, 3.0 mm x 50 mm, RP-18, 3.0 µm, 0.5 ml/min, Methanol/ $H_2O$  (5/95 v/v für 2 min, 5/95 → 40/60 v/v in 15 min, 40/60 v/v für 5 min)

APCI-PI-MS

702 (56), 421 (100), 274 (6), 256 (13)

APCI-NI-MS

700

$t_{Ret} = 35.6$  min, 8 %, (diastereomere Nebenprodukt)

APCI-PI-MS

702 (56), 421 (100), 274 (6), 256 (13)


APCI-NI-MS

700



# Beispiel 163 – 167: Synthese am Roboter

**N-p-Carboxyl-dipeptoyl-((4*a*S,6*R*,8*a*S)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4*a*H-[1]benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benzazepin-11(12*H*)-yl)amid (CK-59-1)**



Jeweils 0.300 g (0.102 mmol) Norgalanthamin-6-yloxy-1,5-dioxopentyloxymethyl-Merrifieldharz werden in Polyethylenreaktoren mit Fritte eines Syntheseroboters (Syrro II MultiSynTech) vorgelegt und mit 3 ml absolutem Dimethylformamid versetzt. Nach fünfminütigen Stehen werden die Suspensionen 25 Minuten bei 23°C in Intervallen gerührt. Alle folgenden Operationen erfolgen bei dieser Temperatur. Danach werden die Harze einmal mit 3 ml Dimethylformamid gewaschen und sukzessive mit einer Lösung bestehend aus 0.119 g (0.306 mmol) Fmoc-Phenylalanin bzw. 0.117 g (0.306 mmol) N-Fmoc-O-*tert*-Butylserin und 1.5 ml Dimethylformamid und mit einer Lösung aus 0.112 g (0.306 mmol) 2-(1*H*-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluroniumtetrafluoroborat und 1 ml Dimethylformamid versetzt. Anschließend werden die Harzsuspensionen fünf Minuten gerührt. Dann fügt man 105 µl (0.079 g, 0.612 mmol) Ethyldiisopropylamin in 0.5 ml Dimethylformamid zu. Die Suspensionen werden 3 Stunden gerührt, für zwei Minuten abgesaugt und jeweils mit einer Lösung bestehend aus 241 µl (0.260 g, 2.550 mmol) Essigsäureanhydrid, 437 µl (0.330 g, 2.550 mmol) Ethyldiisopropylamin und 3 ml Dimethylformamid versetzt. Nach 15-minütigen Rühren und zweiminütigen Abfiltrieren werden die Harze sechsmal mit Dimethylformamid (3 ml, 2 min) gewaschen, in einer 20 %igen Piperidin-Lösung in Dimethylformamid für jeweils sechs und 15 Minuten suspendiert bzw. gerührt. Nach sechsmaligen Waschen mit Dimethylformamid (2 min, 3 ml) werden die Harze analog dem ersten Peptidkupplungsschritt mit Fmoc-Phenylalanin bzw. N-Fmoc-O-*tert*-Butylserin umgesetzt, die nicht umgesetzten Aminfunktionen mit Essigsäureanhydrid maskiert und mit 20 %iger Piperidin-Dimethylformamid-Lösung die Fmoc-Schutzgruppe abgespalten. Anschließend wird analog der oben beschriebenen Prozedur gewaschen, mit Lösungen bestehend aus 0.047 g (0.306 mmol) *p*-Methoxybenzoesäure bzw. 0.038 g (0.306 mmol) Isonicotinsäure in 2.5 ml Dimethylformamid versetzt und fünf Minuten gerührt. Dann werden jeweils Lösungen von 48 µl (0.039 g, 0.306 mmol) Diisopropylcarbodiimid 241 µl und 0.5 ml 1,2-Dichloroethan zugefügt. Es wird für drei Stunden gerührt. Die Harze werden filtriert (2 min), dreimal mit Dimethylformamid (2 min, 3

ml), sechsmal mit Dichlormethan (2 min, 3 ml) gewaschen, für zehn Minuten bei 40°C trocken gesaugt und anschließend im Vakuum über Phosphorpentoxid getrocknet. Der Kaiser-Test ist bei allen Harzen (0.250 bis 0.377 g) negativ.

Die Harze, die O-tert.-butylgeschützte Serin-Reste enthalten, werden sukzessive mit 1 ml Dichlormethan, 0.125 ml Phenol, 0.125 ml Anisol und 3.75 ml Trifluoressigsäure versetzt und drei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Dann werden die Lösungen abfiltriert, und die Harze werden dreimal mit Dichlormethan (2 min, 3 ml), dreimal mit Dichlormethan/Ethyläthylisopropylamin (95/5, 2 min, 3 ml), dreimal mit jeweils Dichlormethan (2 min, 3 ml) und dreimal mit Tetrahydrofuran (2 min, 3 ml) gewaschen und unter verminderten Druck getrocknet.

Die Harze werden in beidseitig verschließbare 5 ml-Polyethylenfritten transferiert, für 30 Minuten in THF suspendiert, filtriert und in einer Lösung aus 0.092 g (0.028 g, 0.510 mmol) 30 %iger Natrium-methanolat-Methanol-Lösung und 3 ml Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) suspendiert. Nach sechs Stunden wird die Lösung abfiltriert, und das Harz fünfmal mit jeweils 3 ml Tetrahydrofuran/Methanol (4/1) extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit Dowex 50W (eine Spatelspitze) und NaHCO<sub>3</sub> (eine Spatelspitze) neutralisiert. Die Suspensionen werden über etwas Cellite filtriert, die Filtercellite wird zweimal mit 5 ml Dichlormethan nachgespült. Die Filtrate werden konzentriert und mit präparativer Dünnschichtchromatographie (Laufmittel: Chloroform/Methanol = (10/1) für CK-49-1-IPP-3, CK-59-MPP-1, CK-59-IPP-2, CK-59-AcPP-3, Chloroform/Methanol = (4/1) für CK-59-IPP-4 und Chloroform/Methanol = (6/1) für CK-59-MPP-5) gereinigt. Die produkthaltigen Kieselgelfractionen werden mit Chloroform/Methanol (9/1) extrahiert und filtriert. Die eingeeengten Extrakte werden nochmals über einen Filter (Porendurchmesser 0.2 µm) gefiltert, weiter eingeeengt und im Vakuum getrocknet.

HPLC Phenomenex Synergi Polar-RP-Säule, 4.6 mm x 150 mm, 4.0 µm, 1.0 ml/min, Methanol/20 mM Cl<sub>3</sub>CCO<sub>2</sub>H in H<sub>2</sub>O (20/80 für 5 min, 20/80 → 80/20 in 20 min, 80/20 für 10 min, v/v)

LC/MS Phenomenex Luna-Säule, 3.0 mm x 50 mm, RP-18, 3.0 µm, 0.8 ml/min, Methanol/H<sub>2</sub>O (10/90 für 2 min, 10/90 → 100/0 in 15 min, 100/0 für 5 min, v/v)

# Ergebnis

	Bei- spiel	SPH-Nummer	Aminosäure 1 und 2	Carboxylrest 3	R <sub>t</sub> -Wert
CK-59- MPP-1-1	163	SPH-1528	Ph, Ph	4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	0.60 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 10/1)
CK-59- MPP-1-2			Ph, Ph	4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	0.45 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 10/1)
CK-49-1- IPP-3-1	166	SPH-1528	Ph, Ph	p-NC <sub>5</sub> H <sub>4</sub>	0.40 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 9/1)

CK-59-AcPP-3-1	164	SPH-1528	Ph, Ph	Me	0.52 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 10/1)
CK-59-AcPP-3-2			Ph, Ph	Me	0.43 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 10/1)
CK-59-ISS-4-1	165	SPH-1528	OH, OH	p-NC <sub>5</sub> H <sub>4</sub>	0.22 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 6/1)
CK-59-ISS-4-2			OH, OH	p-NC <sub>5</sub> H <sub>4</sub>	0.17 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 6/1)
CK-59-MSS-5-1	167	SPH-1528	OH, OH	4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	0.37 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 6/1)
CK-59-MSS-5-2			OH, OH	4-MeOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub>	0.27 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 6/1)


Ausbeuten

Beispiel	Code	HPLC (t <sub>Ret</sub> , Reinheit)	LC/MS	Ausbeute und Bemerkung
163	CK-59-MPP-1-1	29.90 min (71 %)	t <sub>Ret</sub> = 10.90 min APCI, Neg 700 (100) APCI, Pos 702 (63), 684 (8), 421 (100), 274 (5), 256 (15)	0.021 g (0.015 g, 0.021 mmol, 21 %)
	CK-59-MPP-1-2	29.35 min (24 %)	t <sub>Ret</sub> = 10.90 min APCI, Neg 700 (100), 682 (7), 606 (13) APCI, Pos 702 (63), 684 (26), 608 (28), 421 (100), 274 (11), 256 (19)	0.014 g (0.003 g, 0.005 mmol, 5 %); racemisiertes Produkt
166	CK-49-1-IPP-3-1	24.91 min (59 %)	t <sub>Ret</sub> = 20.22 min APCI, Neg 671 (100) APCI, Pos 673 (100), 655 (18), 421 (7), 274 (6), 256 (53)	0.067 g (0.040 g, 0.059 mmol, 58 %)
164	CK-59-AcPP-3-1	26.50 min (50 %)	t <sub>Ret</sub> = 10.08 min APCI, Neg 608 (100) APCI, Pos 610 (100), 592 (15), 421 (17), 274 (8), 256 (40)	0.058 g (0.029 g, 0.048 mmol, 47 %)
	CK-59-AcPP-3-2	26.09 min (54 %)	t <sub>Ret</sub> = 10.01 min APCI, Neg 608 (100) APCI, Pos 610 (100), 592 (24), 421 (20), 274 (18), 256 (69)	0.019 g (0.011 mmol, 0.017 mmol, 17 %); racemisiertes Produkt
165	CK-59-ISS-4-1	14.67 min (92 %)	t <sub>Ret</sub> = 7.49 min APCI, Neg 551 (100), 533 (26), 521 (17), 491 (6) APCI, Pos 553 (100), 535 (36), 403 (6), 385 (9), 256 (100)	0.009 g (0.008 g, 0.015 mmol, 15 %)
	CK-59-	15.90 min	t <sub>Ret</sub> = 7.63 min	0.004 g (0.002 g,

	ISS-4-2	(48 %)	APCI, Neg 551 (100), 533 (25), 521 (19), 491 (5) APCI, Pos 553 (100), 535 (70), 517 (7), 274 (9), 256 (57)	0.003 mmol, 3 %; racemisiertes Produkt
167	CK-59-MSS-5-1	21.12 min (27 %) und 21.57 min (26 %)	$t_{Ret} = 8.35$ min APCI, Neg 580 (100), 562 (17), 550 (15), 520 (6) APCI, Pos 582 (49), 564 (43), 546 (67), 361 (100), 256 (55) $t_{Ret} = 8.49$ min APCI, Neg 580 (100), 562 (21), 550 (16), 520 (9) APCI, Pos 582 (43), 564 (47), 546 (51), 361 (100), 256 (64)	0.013 g (0.007 g, 0.012 mmol, 12 %); racemisiertes Produkt
	CK-59-MSS-5-2	21.27 min (10 %) und 21.58 (15 %)	$t_{Ret} = 8.39$ min APCI, Neg 580 (100) $t_{Ret} = 8.64$ min APCI, Neg 580 (100), 562 (35), 550 (14) APCI, Pos 582 (63), 564 (77), 546 (77), 361 (100), 256 (63)	0.008 g (0.002 g, 0.003 mmol, 3 %); racemisiertes Produkt

**Beispiel 167b**  
**SPH-1543**

Als Nebenprodukt wurde N-Acetyl-phenylalanin-((4aS,6R,8aS)-6-hydroxy-3-methoxy-5,6,-9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzo-furo-[3a,3,2-ef]-[2]benzazepin-11(12H)-yl)amid erhalten:



	Code	HPLC ( $t_{Ret}$ , Reinheit)	LC/MS und R <sub>f</sub> -Wert	Ausbeute und Bemerkung
	CK-59-IPP-2-1	23.49 min (67 %)	$t_{Ret} = 9.37$ min APCI, Neg 461 (100) APCI, Pos 463 (100), 445 (8), 274 (17), 256 (31) 0.50 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 10/1)	0.036 g (0.031 g, 0.077 mmol, 76 %)
	CK-59-IPP-2-2	23.60 min (66 %)	$t_{Ret} = 9.40$ min APCI, Neg	0.012 g (0.008 g, 0.17 mmol, 17 %)

			461 (100) APCI, Pos 463 (100), 445 (17), 274 (32), 256 (60) 0.36 (CHCl <sub>3</sub> /CH <sub>3</sub> OH = 10/1)	); racemisiertes Produkt
--	--	--	--	--------------------------

**Beispiel 170****SPH-1371**

**(4a $\alpha$ ,6 $\beta$ ,8 $\alpha$ R\*)-4 $\alpha$ ,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-[3-(1-piperidinyl)propyl]-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, Dihydrobromid, Dihydrat**

Herstellung aus der freien Base durch Behandeln mit HBr/EtOH

$[\alpha]_D^{20} = -92.5^\circ$  (c 0.24, H<sub>2</sub>O)

**Allgemeine Vorschrift – "Thiophen-Derivate" (Beispiel 171-172)**


1.1 Äquivalente Norgalanthamin und 1 Äquivalent des entsprechenden Thienyl-halogenides wurden zusammen mit 3 Äquivalenten fein gepulvertem, wasserfreiem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in trockenem Acetonitril (10 Gew%-ige Lösung) 24 h auf Rückflußtemperatur erhitzt. Der vollständige Umsatz wurde mittels DC geprüft.

Nach Abkühlen der Lösung wurde filtriert und der K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Rückstand mehrmals unter DC Kontrolle mit trockenem Acetonitril gewaschen. Das nach dem Eindampfen erhaltene Rohprodukt wurde mittels Flash-Chromatographie gereinigt.

**Beispiel 171****SPH-1490**

**6,7-Dihydro-5-(4-((4 $\alpha$ S,6R,8 $\alpha$ S)-6-hydroxy-3-methoxy-4 $\alpha$ ,5,9,10-tetrahydro-6H-benzofuro[3 $\alpha$ ,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)-butyl)-benzo[b]thiophen-4(5H)-on**

C<sub>28</sub>H<sub>33</sub>NO<sub>4</sub>S (479.64)



SPH-1490


Norgalanthamin:	500 mg (1.83 mmol)
5-(4-Brombutyl)-6,7-dihydro-benzo[b]thiophen-4(5H)-on:	479 mg (1.67 mmol)
K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> :	693 mg (5.01 mmo)
ca. 4 ml Acetonitril	

Rohprodukt: 450 mg

Flash-Chromatographie: Ethylacetate : Triethylamin = 100 : 2

Ausbeute: 440 mg (50 %) hellgelbes Pulver

<sup>1</sup>H (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>):  
 $\delta$  7.34 (d, J = 5.26, 1H), 7.04 (d, J = 5.26, 1H), 6.66 (d, J = 8.18, 1H), 6.62 (d, J = 8.18, 1H), 6.09 (m, 2H), 4.61 (m, 1H), 4.25-4.07 (m, 2H), 3.92-3.84 (m, 1H), 3.84-3.79 (m, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.46-3.56 (m, 1H), 3.30-3.18 (m, 1H), 3.13-3.03 (m, 1H), 3.02-2.91 (m, 1H), 2.73-2.65 (m, 1H), 2.64-2.47 (m, 2H), 2.45-2.36 (m, 1H), 2.32-2.23 (m, 1H), 2.11-1.83 (m, 4H), 1.63-1.09 (m, 6H)



<sup>13</sup>C (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>):


δ 195.2 (s), 154.8 (2\*s), 145.8 (s), 144.4 (s), 136.8 (s), 132.9 (s), 127.9 (d), 126.4 (d), 125.1 (d), 123.2 (d), 122.4 (d), 111.3 (d), 88.6 (d), 61.9 (d), 58.1 (t), 55.9 (q), 51.4 (t), 51.3 (t), 48.2 (s), 46.2 (d), 29.9 (t), 29.5 (t), 28.9 (t), 28.8 (t), 28.5 (t), 24.8 (t), 24.2 (t)

# Beispiel 172

SPH-1491

6,7-Dihydro-5-(5-((4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-hydroxy-3-methoxy-4a,5,9,10-tetrahydro-6*H*-benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benzazepin-11(12*H*)-yl)-pentyl)-benzo[*b*]thiophen-4(5*H*)-on

C<sub>29</sub>H<sub>35</sub>NO<sub>4</sub>S (493.67)



SPH-1491

Norgalanthamin:

200 mg (0.73 mmol)

5-(5-Brompentyl)-6,7-dihydro-benzo[*b*]thiophen-4(5*H*)-on:

201 mg (0.67 mmol)

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>:

277 mg (2.00 mmol)

ca. 4 ml Acetonitril

Rohprodukt: 430 mg

Flash-Chromatographie: Ethylacetate : Triethylamine = 100 : 2

Ausbeute: 240 mg (66.3 %) hellgelbes Pulver

<sup>1</sup>H NMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>):

δ 7.35 (d, *J* = 5.2 Hz, 1H), 7.03 (d, *J* = 8.1 Hz, 1H), 6.64 (d, *J* = 8.1 Hz, 1H), 6.61 (d, *J* = 8.1 Hz, 1H), 6.05 (d, *J* = 10.2 Hz, 1H), 5.99 (dd, *J* = 10.2, 4.6 Hz, 1H), 4.60 (m, 1H), 3.83 (d, *J* = 15.2, 1H), 4.14-4.10 (m, 1H), 3.83 (d, *J* = 15.2 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.41-3.31 (m, 1H), 3.22-3.14 (m, 1H), 3.07 (dt, *J* = 17.2, 5.2 Hz, 1H), 2.96 (ddd, *J* = 17.2, 9.1, 4.7 Hz, 1H), 2.70-2.62 (m, 1H), 2.56-2.34 (m, 4H), 2.26 (m, 1H), 2.10-1.8 (m, 4H), 1.61-1.21 (m, 8H)

<sup>13</sup>C NMR: (100 MHz, CDCl<sub>3</sub>):

δ 195.7 (s), 155.1 (2\*s), 146.2 (s), 144.5 (s), 137.3 (s), 133.5 (s), 128.0 (d), 127.3 (d), 125.5 (d), 123.6 (d), 122.5 (d), 111.5 (d), 89.1 (d), 62.5 (d), 58.1 (t), 56.3 (q), 51.3 (t), 48.8 (s), 46.7 (d), 33.2 (t), 30.3 (t), 30.0 (t), 29.9 (t), 29.4 (t), 27.8 (t), 27.6 (t), 27.5 (t), 24.6 (t)

# **Allgemeine Vorschrift – "Azacycloalkyl-Derivate" (Beispiel 173-176)**


1 Äquivalent Norgalanthamine und 3 Äquivalente des entsprechenden Aminoalkylhalogenides wurden zusammen mit 3 Äquivalenten fein gepulvertem, trockenem  $K_2CO_3$  in trockenem Acetonitril (ca. 10 Gew%-ige Lösung) für 24 Stunden auf Rückflußtemperatur erhitzt. Der vollständige Umsatz wurde mittels DC kontrolliert. Nach Abdestillieren des Lösungsmittels wurde der verbleibende Rückstand in 2n HCl aufgelöst. Nach 2-maliger Extraktion mit Diethylether wurde mit 10% NaOH-Lösung alkalisch gestellt und erschöpfend mit Chloroform extrahiert. Nach Trocknen über  $Na_2SO_4$  wurde eingedampft und mittels Flash-Chromatographie gereinigt ( $CHCl_3 : MeOH : NH_3 = 10 : 1 : 0.5$ ).

Die angegebenen Ausbeuten der Reaktionen beziehen sich auf 500 mg (1.83 mmol) Norgalanthamin als Ausgangsprodukt und wurden nach Flash-Chromatographie bestimmt

## **Beispiel 173** **SPH-1492**

**(4aS,6R,8aS)-3-methoxy-11-(6-piperidin-1-yl-hexyl)-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol**

$C_{27}H_{40}N_2O_3$  (440.63)



SPH-1492

Ausbeute: 161 mg (20 %) gelbliches Öl


$^1H$  (400 MHz,  $CDCl_3$ ):  
 $\delta$  6.66 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 6.62 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 6.10 (d,  $J = 10.0$  Hz, 1H),  
 6.01 (dd,  $J = 10.0, 5.4$  Hz, 1H), 4.62 (m, 1H), 4.14 (m, 1H), 4.13 (d,  $J = 15.6$ , 1H), 3.84 (s, 3H), 3.81  
 (d,  $J = 15.6$ , 1H), 3.4-3.3 (m, 1H), 3.2-3.15 (m, 1H), 2.69 (ddt,  $J = 15.7, 3.4, 1.6$  Hz, 1H) 2.55-2.25  
 (m, 8H), 2.10-2.0 (m, 1H), 2.01 (ddd,  $J = 12.9, 5.0, 2.6$  Hz, 1H), 1.65-1.2 (m, 16H)  
 $^{13}C$  (100 MHz,  $CDCl_3$ ):  
 $\delta$  146.2 (s), 144.4 (s), 133.6 (s), 129.9 (s), 127.9 (d), 127.4 (d), 122.4 (d), 111.5 (d), 89.1 (d), 62.5  
 (d), 59.9 (t), 58.1 (t), 56.3 (q), 54.9 (4t), 51.9 (t), 48.8 (s), 33.3 (t), 30.3 (t), 28.0 (t), 27.9 (t), 27.8  
 (t), 27.1 (t), 26.2 (t), 24.8 (t)

## **Beispiel 174** **SPH-1493**

**(4aS,6R,8aS)-3-methoxy-11-(6-(4-methylpiperazin)-1-yl-hexyl)-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol**

$C_{27}H_{41}N_3O_3$  (455.65)





SPH-1493

Ausbeute: 208 mg (25 %) gelbliches Öl

$^1\text{H}$  (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  6.66 (d,  $J = 8.18$ , 1H), 6.61 (d,  $J = 8.18$ , 1H), 6.09 (d,  $J = 10.23$ , 1H), 6.0 (dd,  $J = 9.94$ , 4.97, 1H), 4.61 (m, 1H), 4.20-4.08 (m, 2H), 3.84 (s, 3H), 3.80 (d,  $J = 15.8$ , 1H), 3.40-3.30 (m, 1H), 3.23-3.10 (m, 1H), 2.73-2.63 (m, 1H), 2.63-2.30 (m, 12H), 2.29 (s, 3H), 2.10-1.94 (m, 2H), 1.57-1.17 (m, 10H)


$^{13}\text{C}$  (100 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  146.2 (s), 144.4 (s), 133.6 (s), 129.9 (s), 127.9 (d), 127.4 (d), 122.4 (d), 111.5 (d), 89.1 (d), 62.5 (d), 59.1 (t), 58.2 (t), 56.3 (q), 55.5 (2\*t), 53.6 (3\*t), 51.9 (t), 48.8 (s), 46.5 (q), 33.3 (t), 30.4 (t), 27.98 (t), 27.83 (t), 27.74 (t), 27.23 (t)

#### Beispiel 175 SPH-1494

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-3-methoxy-11-(6-(4-hydroxypiperidin)-1-yl-hexyl)-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol

$\text{C}_{27}\text{H}_{40}\text{N}_2\text{O}_4$  (456.63)



SPH-1494

Ausbeute: 200 mg (24 %) gelbliches Öl

$^1\text{H}$  (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  6.64 (d,  $J = 8.1$  Hz, 1H), 6.59 (d,  $J = 8.1$  Hz, 1H), 6.07 (d,  $J = 10.2$  Hz, 1H), 5.97 (dd,  $J = 10.2$ , 4.9 Hz, 1H), 4.58 (m, 1H), 4.11 (m, 1H), 4.07 (m, 1H), 3.81 (s+m, 4H), 3.71-3.61 (m, 1H), 3.35 (m, 1H), 3.15 (m, 1H), 2.81-2.71 (m, 2H), 2.67 (d,  $J = 15.4$ , 1H), 2.52-2.36 (m, 4H), 2.34-2.26 (m, 2H), 2.20-2.08 (m, 2H), 2.06-1.94 (m, 2H), 1.93-1.84 (m, 2H), 1.63-1.53 (m, 2H), 1.52-1.38 (m, 5H), 1.32-1.20 (m, 4H)


$^{13}\text{C}$  (100 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  146.2 (s), 144.5 (s), 133.6 (s), 129.9 (s), 127.9 (d), 127.4 (d), 122.4 (d), 111.5 (d), 89.1 (d), 62.5 (2\*d), 58.9 (2\*t), 58.2 (t), 56.3 (q), 51.9 (2\*t), 51.3 (t), 48.8 (s), 34.6 (t), 33.4 (t), 30.4 (t), 28.0 (t), 27.8 (2\*t), 27.7 (t), 27.3 (t)

**Beispiel 176**  
**SPH-1521**


**1-(6-((4aS,6R,8aS)-6-hydroxy-3-methoxy-4a,5,9,10-tetrahydro-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11(12H)-yl)-hexyl)-piperidin-4-on**

$C_{27}H_{38}N_2O_4$  (454.61)



Ausbeute: 125 mg (15 %) gelbliches Öl


$^1H$  (400 MHz,  $CDCl_3$ ):  
 $\delta$  6.65 (d,  $J = 8.18$  Hz, 1H), 6.60 (d,  $J = 8.18$  Hz, 1H), 6.07 (d,  $J = 10.8$  Hz, 1H), 5.99 (dd,  $J = 10.8$ , 4.5 Hz, 1H), 4.60 (m, 1H), 4.18-4.08 (m, 2H), 3.82 (s, 3H), 3.79-3.76 (m, 1H), 3.40-3.30 (m, 1H), 3.22-3.10 (m, 1H), 2.74-2.68 (m, 4H), 2.67-2.62 (m, 1H), 2.53-2.34 (m, 8H), 2.09-1.93 (m, 2H), 1.57-1.42 (m, 6H), 1.37-1.21 (m, 4H)  
 $^{13}C$  (100 MHz,  $CDCl_3$ ):  
 $\delta$  209.7 (s), 146.2 (s), 144.5 (s), 133.5 (s), 129.7 (s), 128.1 (d), 127.4 (d), 122.4 (d), 111.5 (d), 89.0 (d), 62.4 (d), 58.1 (2\*t), 57.9 (2\*t), 56.4 (q), 56.3 (t), 53.4 (t), 52.2 (t), 51.9 (t), 48.8 (s), 41.5 (t), 33.4 (t), 30.4 (t), 27.9 (t), 27.8 (t), 27.7 (t)



# Beispiel 180

SPH-1363

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3a,3,2-*ef*][2]benzazepin-11(12*H*)-yl)methyl-azodicarbonsäuredi-*tert*.-butylester (CK-24-2)



Eine Lösung aus 0.300 g (0.104 mmol) Galanthamin in 3 ml Dichlormethan wird bei Raumtemperatur vorgelegt, mit 0.264 g (1.150 mmol) Di-*tert*.-butylazodicarboxylat versetzt und vier Tage bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Einengen am Rotationsverdampfer wird der Rückstand (0.258 g) mittels Flashchromatographie über Kieselgel (25 g, Laufmittel Dichlormethan/Petrolether = 2/3 + 4 % Triethylamin) gereinigt. Nach dem Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.292 g eines weißen Schaumes.

Ausbeute: 0.292 g (0.56 mmol, 54 %), farbloser Schaum, ( $M_w = 517.6$ )

DC:  $R_f = 0.71$  (Dichlormethan/Methanol = 9/1 + 2 % conc.  $NH_3$ -Lösung)

mp.: 59 – 62°C (Petrolether/Dichlormethan = 1/1 + 4 % Triethylamin)

IR: KBr

$\nu$  ( $cm^{-1}$ ) 3557 (v), 3340 (bm), 2932 (s), 2915 (s), 1726 (s), 1711 (s)

$^1H$ -NMR: (200.13 MHz,  $CDCl_3$ , TMS)

$\delta$  6.49 – 6.66 (m, 2 H), 6.39 (s, 0.6 H), 5.84 – 6.06 (m, 2 H), 4.52 (s, 1 H), 4.35 (bs, 1 H), 3.99 – 4.17 (m, 2 H), 3.71 – 3.88 (m, 1 H), 3.76 (s, 3 H), 3.07 – 3.40 (m, 2 H), 2.61 (bd,  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 2.40 (bd,  $J = 11.8$  Hz, 0.3 H), 1.79 – 2.05 (m, 2 H), 1.56 – 1.72 (m, 1 H), 1.46 (s, 9 H), 1.45 (s, 9 H)

$^{13}C$ -NMR: (50.32 MHz,  $CDCl_3$ , TMS)

$\delta$  156.7 (s), 155.9 (s), 145.9 (s), 144.0 (s), 132.8 (d), 129.8 (s), 127.6 (d), 126.7 (d), 121.5 (d),


111.1 (d), 88.5 (d), 68.9 (t), 62.4 (t), 61.8 (t), 61.8 (d), 56.6 (t), 55.8 (q), 49.7 (t), 48.1 (s),  
35.2 (t), 29.8 (t), 14.32 (q), 14.26 (q)

40 LC/MS:  $t_{\text{Ret}} = 9.56$  min, (Zorbax SB-Säule, 2.1 mm x 30 mm, RP-18, 3  $\mu$ m, 0.5 ml/min, Methanol/H<sub>2</sub>O  
(40/60  $\rightarrow$  100/0 (v/v) in 2 min)  
APCI-PI-MS  
518 (100), 500 (25), 462 (9), 285 (13), 274 (11), 256 (26)  
APCI-NI-MS  
45 516

### Beispiel 181

SPH-1362

50 (4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3a,3,2-*ef*][2]benz-  
azepin-11(12*H*)-yl)methyl-azodicarbonsäurediethylester (CK-21-3)



55 Zu einer Lösung aus 0.150 g (0.52 mmol) Galanthamin in 2 ml Dichlormethan werden 89  $\mu$ l (0.100 g, 0.57 mmol) Diethylazodicarboxylat zugefügt, und die Lösung wird 72 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Einengen am Rotationsverdampfer wird der Rückstand (0.258 g) mittels Flashchromatographie über Kieselgel (25 g, Laufmittel Dichlormethan/Petrolether = 1/1 + 4 % Triethylamin) gereinigt. Nach dem Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.168 g eines weißen Schaumes.


60

Ausbeute: 0.168 g (0.36 mmol, 70 %), weißer Schaum, ( $M_w = 461.6$ )

DC:  $R_f = 0.66$  (Dichlormethan/Methanol = 9/1 + 2 % conc. NH<sub>3</sub>-Lösung)

65 mp.: 40 - 42°C (Petrolether/Dichlormethan = 1/1 + 4 % Triethylamin)

IR: KBr



$\nu$  (cm<sup>-1</sup>) 3553 (v), 3305 (m), 2981 (s), 2935 (s), 1742 (s), 1722 (s)

70 <sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)

$\delta$  6.77 (bs, 1 H), 6.64 (d,  $J$  = 8.3 Hz, 1 H), 6.58 (d,  $J$  = 8.1 Hz, 1 H), 5.84 - 6.06 (m, 2 H), 4.53 (s, 1 H), 3.98 - 4.23 (m, 6 H), 3.69 - 3.87 (m, 1 H), 3.76 (s, 3 H), 3.01 - 3.42 (m, 2 H), 2.66 (bd,  $J$  = 15.7 Hz, 1 H), 2.33 (bs, 0.2 H), 1.65 - 1.77 (m, 2 H), 1.35 - 1.47 (m, 1 H), 1.09 - 1.35 (m, 6 H)

75

<sup>13</sup>C-NMR: (50.32 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)

$\delta$  155.1 (s), 145.9 (s), 143.9 (s), 132.8 (d), 130.2 (s), 127.5 (d), 126.9 (d), 121.4 (d), 111.1 (d), 81.2 (s), 80.9 (s), 69.5 (t), 61.9 (d), 56.8 (t), 55.8 (q), 49.8 (t), 48.1 (s), 35.6 (t), 29.8 (t), 28.1 (q), 28.0 (q)

LC/MS:  $t_{\text{Ret}}$  = 8.08 min, (Zorbax SB-Säule, 2.1 mm x 30 mm, RP-18, 3  $\mu$ m, 0.5 ml/min, Methanol/H<sub>2</sub>O (40/60  $\rightarrow$  100/0 (v/v) in 2 min)

APCI-PI-MS


462 (100), 444 (32), 286 (34), 274 (12), 256 (29)

85

APCI-NI-MS

460

### Verfahren zur Synthese von Norgalanthamin



90

#### Methode A

20 g (70 mmol) Galanthamin wird mit 14.206 g (0.07 mol) *m*-Chlorperbenzoesäure (85 %) in 350 ml Dichlormethan und anschließender Zugabe von 9.730 g (35 mmol) Fe(II)SO<sub>4</sub>·7 H<sub>2</sub>O in 100 ml Methanol umgesetzt. Die Reaktion wird nach 20 Minuten mit 200 ml 2 N Salzsäure terminiert. Nach dem Abdestillieren der leicht flüchtigen Lösungsmittel, der Säure-Base-Trennung und Abfiltration des Fe(OH)<sub>x</sub>-Niederschlages mittels einer Hyflo-Nutsche wird Filtrat über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingeeengt. Man erhält ca. 18 g des Rohprodukts in Form eines gelben Schaumes.

100

Aufarbeitung Variante 1 (CK-1-1)

Das Rohprodukt (18.46 g) wird in ca. 200 ml Essigsäureethylester/Methanol/Triethylamin (90/10/2)

unter leichten Erwärmen aufgenommen. Beim Abkühlen fällt erneut  $\text{Fe}(\text{OH})_x$  aus, welches abfiltriert wird. Die Reinigung erfolgt mittels MPLC-Chromatographie (Kieselgel,  $h = 25 \text{ cm}$ ,  $d = 3.6 \text{ cm}$ ,  $v = 300 \text{ nm}$ ) mit einem geänderten Laufmittelgemisch (Essigsäureethylester/Methanol/Triethylamin = 95/5/2  $\rightarrow$  90/10/2  $\rightarrow$  80/20/2). Der Norgalanthamin-Gehalt beträgt laut einer HPLC-Quantifizierung (Coffein als interner Standard) nur 68 %.

Ausbeute: 10.34 g (38 mmol, 54 %), gelblicher, amorpher Feststoff ( $M_w = 273.3$ )

#### 110 Aufarbeitung Variante 2 (CK-1-11)

Das Rohprodukt (16.48 g) wird in 100 ml Methanol gelöst, mit einer Lösung aus 12.86 g (102 mmol) Oxalsäure Dihydrat in 100 ml Methanol versetzt und vorsichtig erwärmt, um die Lösung zu homogenisieren. Danach läßt man die Lösung auf Raumtemperatur und dann auf ca.  $5^\circ\text{C}$  abkühlen und filtriert das auskristallisierte Produkt ab und wäscht den Niederschlag mit Methanol. Die

115 vereinigten eingeeengten Methanollösungen werden erneut einer Umkristallisation unterworfen.

Ausbeute: 16.108 g (43 mmol, 62 %), farbloser kristalliner Feststoff  
Ber. für  $\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{NO}_3 \cdot \text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 0.5 \text{ H}_2\text{O}$  C, 58.06 H, 5.95 N, 3.76  
Gef. C, 57.91, H, 5.88, N, 3.69

120

#### Methode B (CK-1-10)

2.000 g (6.96 mmol) Galanthamin und 0.981 g (10.44 mmol) Wasserstoffperoxid-Harnstoff-Addukt werden in 25 ml Dichlormethan und 5 ml Methanol bei Raumtemperatur zwei Tage gerührt, anschließend mit 0.030 g Platin/Aktivkohle versetzt und eine Stunde bei Raumtemperatur

125 gerührt. Bei der Zugabe des Katalysators ist eine starke Gasentwicklung zu beobachten. Dann werden 0.967 g (3.48 mmol)  $\text{Fe}(\text{II})\text{SO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}$  in 5 ml MeOH zugesetzt, und die braune Suspension wird stark gerührt. Die Reaktion wird nach 20 Minuten mit 50 ml gesättigter  $\text{NaHCO}_3$ -Lösung

terminiert. Die Reaktionslösung wird mittels einer Hyflo-Filterhilfe filtriert. Die Phasen werden

separiert, und die wäßrige Phase wird erschöpfend mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten

130 organischen Extrakte werden mit gesättigter  $\text{NaHCO}_3$ -Lösung (50 ml) und mit gesättigter NaCl-

Lösung (50 ml) gewaschen, über  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das Rohprodukt

(1.925 g) wird in 10 ml Methanol gelöst, mit einer Lösung aus 1.332 g (10.6 mmol) Oxalsäure Dihydrat in 10 ml Methanol versetzt und vorsichtig erwärmt, um die Lösung zu homogenisieren.

Danach läßt man die Lösung auf Raumtemperatur und dann auf ca.  $5^\circ\text{C}$  abkühlen und filtriert

135 das auskristallisierte Produkt ab und wäscht den Niederschlag mit Methanol. Die vereinigten

eingeeengten Methanollösungen werden erneut einer Umkristallisation unterworfen.

Ausbeute: 1.010 g (2.7 mmol, 39 %), farbloser kristalliner Feststoff ( $M_w = 371.4$ ), laut HPLC 97 %



40 **Methode C:**

**Demethylierung von Norgalanthamin mittels Diethylazodicarboxylat (CK-1-7)**

Zu einer Lösung aus 0.300 g (1.04 mmol) Galanthamin in 3 ml Dichlormethan werden 178 µl (0.199 g, 1.144 mmol) Diethylazodicarboxylat zugefügt, und die Lösung wird drei Tage bei Raum-  
 45 temperatur gerührt. Nach dem Einengen am Rotationsverdampfer bei 40°C wird der Rückstand in 5 ml Ethanol und 5 ml 4 N Salzsäure gelöst und bei 80°C für eineinhalb Stunden gerührt. Die Reaktion kühlt man auf Raumtemperatur ab und verdünnt die Lösung mit 5 ml Wasser. Der Ethanol-Anteil wird im Rotationsverdampfer abdestilliert, und die wäßrige Phase wird dreimal  
 150 jeweils 10 ml Diethylether extrahiert. Die wäßrige Phase wird durch Zugabe Natriumcarbonat und Natriumhydroxid auf pH 10 – 11 eingestellt und viermal mit jeweils 20 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Phasen werden mit 40 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet. Nach dem Filtrieren und dem Einengen wird der Rückstand (0.268 g) mittels MPLC über Kieselgel (60 g, Laufmittel Essigsäureethylester/Ethanol/Triethylamin = 19/1/0.4) gereinigt. Nach dem Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.136 g eines gelblichen Schaumes.

155

Ausbeute: 0.136 g (0.495 mmol, 48 %), weißgelblicher Schaum, (M<sub>w</sub> = 273.3), HPLC identisch mit einer Referenzprobe

HPLC: t<sub>Ret</sub> = 3.79 min, 96.3 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5 µm, 250 nm, 1  
 160 ml/min, Acetonitril/ 20 mM Trichloressigsäure in H<sub>2</sub>O (15/80 v/v)

**Methode D:**

**Demethylierung von Norgalanthamin mittels Di-tert.-butylazodicarboxylat (CK-1-6)**

165 0.300 g (1.04 mmol) Galanthamin und 0.264 g, (1.144 mmol) Di-tert.-butylazodicarboxylat in 3 ml Dichlormethan werden analog der oben beschriebenen Prozedur drei Tage bei Raumtemperatur umgesetzt, eingengt und in 5 ml Ethanol und 5 ml 4 N Salzsäure für 30 Minuten bei 80°C gerührt. Die Reaktion kühlt man auf Raumtemperatur ab, und verdünnt die Lösung mit 5 ml Wasser. Nach der wäßrigen Aufarbeitung wird der Rückstand (0.259 g) mittels MPLC über  
 170 Kieselgel (60 g, Laufmittel Essigsäureethylester/Ethanol/Triethylamin = 19/1/0.4) gereinigt. Nach dem Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.132 g eines weißgelblichen Schaumes.

Ausbeute: 0.132 g (0.48 mmol, 46 %), weißgelblicher Schaum, (M<sub>w</sub> = 273.3), HPLC identisch mit einer Referenzprobe

175

HPLC: t<sub>Ret</sub> = 3.74 min, 100 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5 µm, 250 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM Trichloressigsäure in H<sub>2</sub>O (15/80 v/v)

**Methode E:**

180 **Verseifung von (4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-12-trifluoracetyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol**

**Methode A (CK-40-2)**

185 3.3 ml einer 0.25 M Kaliumhydroxid-Lösung (0.045 g (0.81 mmol), in Dioxan/Methanol/Wasser (10/2/5) werden mit 0.100 g (0.27 mmol) N-Trifluoracetyl-norgalanthamin versetzt und eine Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird die Lösung mit 0.4 ml 2 N Salzsäure verdünnt und die flüchtigen Bestandteile werden im Rotationsverdampfer abdestilliert. Der Rückstand wird mit gesättigter Natriumcarbonat-Lösung aufgenommen und fünfmal mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, 190 über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und im Rotationsverdampfer unter verminderten Druck eingeeengt. Man erhält 0.070 g eines weißgelblichen Schaumes von 95 %iger Reinheit (HPLC, Coffein als interner Standard).

Ausbeute: 0.070 g (0.067, 0.25 mmol, 91 %), weißgelblicher Schaum ( $M_w = 273.3$ )

195


**Methode B (CK-40-3)**

200 Eine Lösung aus 0.100 (0.27 mmol) N-Trifluoracetyl-norgalanthamin und 0.243 g (1.35 mmol) 30 %iger Natriummethanolat-Methanol-Lösung in 3 ml Tetrahydrofuran/Methanol (1/1) wird drei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Die Lösung wird mit 0.7 ml 2 N Salzsäure neutralisiert und die Lösung wird bis zur Trockne eingeeengt, der Rückstand wird mit 25 ml Dichlormethan aufgenommen und mit gesättigter Natriumcarbonat-Lösung und mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und im Rotationsverdampfer unter verminderten Druck eingeeengt. Nach dem Trocknen im Vakuum erhält man einen gelblichen Schaum (0.067 g) von 76 %iger Reinheit (HPLC, Coffein als interner Standard).

205

Ausbeute: 0.067 g (0.051 g, 0.19 mmol, 69 %), weißgelblicher Schaum ( $M_w = 273.3$ )





## Methode G:

### Trennung der (+) und (-) Isomeren von rac. Norgalanthamin (4)

#### Herstellung von (-) Norgalanthamin (8)

Zu einer Lösung von 10.92 g (40.0 mmol) rac. Norgalanthamin (4) in 40 ml Methanol wird eine Lösung von 7.72 g (20.0 mmol) (+)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure in 15 ml Methanol getropft und anschließend mit 1 ml Methanol nachgewaschen. Die Lösung wird mit einem Impfkristall versetzt und zwei Tage bei 4°C stehen gelassen. Dann wird mit einem Glasstab gut durchgerieben und weitere zwei bis fünf Tage bei 4°C stehen gelassen, wobei immer wieder mit einem Glasstab gut durchgerieben wird. Anschließend wird das ausgefallene Salz abgesaugt, dreimal mit eiskaltem Methanol nachgewaschen und in 100 ml Wasser aufgenommen. Die wässrige Phase wird mit konzentriertem wässrigen Ammoniak basisch gemacht und dreimal mit je 60 ml Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden einmal mit gesättigter wässriger Natriumchloridlösung gewaschen, getrocknet (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Aktivkohle), filtriert und eingedampft, wodurch 2.90 g (37.5 % d. Th.) farblose Kristalle mit einem Drehwert von  $\alpha_D^{22}[\text{CHCl}_3] = -62,4$  an (-) Norgalanthamin (8) erhalten werden. Die methanolische Mutterlauge wird eingedampft, der Rückstand in 100 ml Wasser aufgenommen und wie das reine Salz oben behandelt, wodurch 4,1 g (53.1 % d. Th.) Rohprodukt rückgewonnen werden können, die wie folgt zur Gewinnung von (+) Norgalanthamin verwendet werden.

#### Herstellung von (+) Norgalanthamin


Zu einer Lösung von 4.1 g (15.0 mmol) rückgewonnenem Norgalanthamin (dieses ist angereichert an (+) Isomeren) in 21 ml Methanol wird eine Lösung von 2.9 g (7.5 mmol) (-)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure in 5.6 ml Methanol getropft, wobei mit 0.5 ml Methanol nachgewaschen wird. Die Lösung wird mit einem Impfkristall versetzt und wie bei der Gewinnung von (-) Norgalanthamin behandelt, wodurch 3.0 g (39 % d. Th.) farblose Kristalle mit einem Drehwert von  $\alpha_D^{22}[\text{CHCl}_3] = +57,5^\circ$  an (+) Norgalanthamin erhalten werden.

Alternativ wird (+) Norgalanthamin auch durch Umsetzung von rac. Norgalanthamin (4) mit (-)-O,O-Di-p-Toluoylweinsäure analog der obigen Vorschrift mit einem Drehwert von  $\alpha_D^{22}[\text{CHCl}_3] = +60,5^\circ$  erhalten.

#### Beispiel 182

210 SPH-1534

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benz-azepin-11(12*H*)-yl)carbonsäuretriisopropylsilylester (CK-9-2)




- 215 0.200 g (0.732 mmol) Norgalanthamin (68 % (HPLC, CK-1-1)) und 0.47 ml (0.341 g, 3.37 mmol) Triethylamin werden in einem Einhalskolben mit Septum und CO<sub>2</sub>-Ballon, der durch Evakuieren und Spülen mit Kohlendioxid befüllt wird, bei -80° C in 6 ml Dichlormethan vorgelegt. Anschließend wird die Lösung so weit abgekühlt, daß festes Kohlendioxid in der Reaktionslösung
- 220 ausfällt. Nach eineinhalb Stunden bei ca. -80 - -90° C wird mittels einer Spritze Triisopropylsilylchlorid (0.155 ml, 0.141 g, 0.732 mmol) zugegeben. Anschließend erwärmt man die Reaktionslösung langsam über Nacht auf Raumtemperatur. Dabei fällt ein farbloser Niederschlag aus. Die Reaktionslösung wird mit 10 ml 1N Salzsäure aufgenommen, die Phasen werden separiert, und die wäßrige Phase wird zweimal mit 10 ml Dichlormethan extrahiert. Die
- 225 vereinigten organischen Phasen werden mit 10 ml 1N Salzsäure und mit 10 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das gelbe viskose Öl (0.315 g) wird mittels Säulenchromatographie über Kieselgel mit dem Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester gereinigt. Nachdem Einengen erhält man 0.208 g des Produktes in Form eines farblosen Schaumes.
- 230 Ausbeute: 0.208 g (0.44 mmol, 60 %), farbloser Schaum, (M<sub>w</sub> = 473.7)
- DC: R<sub>f</sub> = 0.35 (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)
- 235 mp.: 53 - 54°C (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)
- IR: KBr  
v (cm<sup>-1</sup>) 3556 (m), 3454 (m), 2946 (s), 1679 (s)
- 240 <sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)  
δ 6.60 - 6.85 (m, 2 H), 5.93 - 6.09 (m, 2 H), 4.90 (d, J = 15.3 Hz, 0.4 H), 4.80 (d, J = 15.7 Hz, 0.6 H), 4.57 (s, 1 H), 4.06 - 4.40 (m, 3 H), 3.83 (s, 3 H), 3.27 - 3.57 (m, 0.4 H), 2.70 (bd, J = 16.3 Hz, 1 H), 2.41 (bd, J = 11.0 Hz, 0.6 H), 1.60 - 2.11 (m, 3 H), 1.29 (bh, J = 5.1 Hz, 3 H), 1.05 (d, J = 6.8 Hz, 8 H), 0.98 (d, J = 6.9 Hz, 10 H)

$^{13}\text{C}$ -NMR: (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

250

## SPH-1535

255



	Bedingungen:	wäßrige Aufarbeitung:	Ausbeute ( $M_w = 524.7$ ):
CK-10-1	0.200 g (0.732 mmol) Norgalan- thamin, 0.172 ml (0.181 g, 0.732 mmol) TBDP-Cl	10 ml 1 N Salzsäure	0.282 g (0.538 mmol, 73 %)
CK-10-2	0.200 g (0.732 mmol) Norgalan- thamin, 0.172 ml (0.181 g, 0.732 mmol) TBDP-Cl	10 ml aqua dest	0.196 g (0.37 mmol, 51 %)

CK-10-3	0.400 g (1.46 mmol) Norgalanth-amin, 0.38 ml (0.398 g, 1.606 mmol) TBDP-Cl	20 ml 0.3 M Salzsäure	0.505 g (0.96 mmol, 66 %)
---------	--	-----------------------	---------------------------

DC:  $R_f = 0.40$  (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

mp.: 71 – 80°C °C (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

IR: KBr

$\nu$  (cm<sup>-1</sup>) 3553 (m), 3454 (bm), 2932 (s), 1686 (s), 1625 (m)


<sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)  
 $\delta$  7.20 - 7.68 (m, 10 H), 6.56 - 6.77 (m, 2 H), 4.83 - 5.03 (m, 1 H), 5.03 (s, 1 H), 4.02 - 4.40 (m, 3 H), 3.83 (s, 3 H), 3.63 (bt,  $J = 13.1$  Hz, 0.3 H), 3.41 (bt,  $J = 12.9$  Hz, 0.7 H), 2.70 (bd,  $J = 15.6$  Hz, 1 H), 2.41 (bd,  $J = 19.7$  Hz, 1 H), 1.78 - 2.10 (m, 2 H), 1.54 - 1.76 (m, 1 H), 1.05 (s, 9 H)

<sup>13</sup>C-NMR: (50.32 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)  
 $\delta$  153.7 und 153.2 (s), 146.6 und 146.1 (s), 144.4 und 144.2 (s), 135.0 und 134.7 (d), 132.4 und 132.3 (s), 132.4 (s), 132.3 und 131.8 (s), 129.7 und 129.6 (d), 129.2 und 129.0 (s), 126.5 (s), 121.8 und 121.2 (d), 111.1 und 110.9 (d), 88.3 und 88.1 (d), 61.8 (d), 55.9 (q), 52.7 und 51.8 (t), 48.3 (s), 46.5 und 46.1 (t), 37.4 und 35.8 (t), 29.7 (t), 27.0 und 26.9 (q), 19.1 und 18.9 (d)

#### Beispiel 184

#### SPH-1536

(4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-12-trifluoracetyl-5,6,9,10,11,12-hexahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef]-[2]benzazepin-6-ol



Methode A (CK-32-1)

295 Zu einer Lösung von 1.00 g (3.66 mmol) Norgalanthamin (68 % (HPLC, CK-1-1)), 1.5 ml (1.095 g, 10.8 mmol) Triethylamin in 5 ml absolutem Dichlormethan wird bei 0°C eine Lösung bestehend aus 5 ml Dichlormethan und 4.6 ml (3.333 g, 32.9 mmol) Trifluoressigsäureanhydrid innerhalb von 15 Minuten zugetropft. Anschließend rührt man die Lösung 1.75 Stunden bei 0°C und  
300 separiert, und die wäßrige Phase wird dreimal mit jeweils 20 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 30 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das Rohprodukt (0.866 g) wird mittels MPLC (Kieselgel, h = 25 cm, d = 3.6 cm, v = 300 nm, Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester = 2/1) gereinigt. Nach dem Einengen und dem Trocknen im Vakuum wird das Produkt als weißgelblicher Schaum  
305 (0.866 g) erhalten.

Ausbeute: 0.866 g (1.95 mmol, 53 %), weißgelblicher Schaum, M<sub>w</sub> = 369.3

#### Methode B (CK-32-2)

310 2.52 g Norgalanthamin (≈ 90 %ig, 2.268 g, 8.30 mmol) und 3.45 ml (2.520 g, 24.9 mmol) Triethylamin werden in 20 ml absoluten Dichlormethan gelöst. Anschließend wird eine Lösung aus 1.211 ml (1.830 g, 8.71 mmol) Trifluoressigsäureanhydrid und 10 ml Dichlormethan innerhalb von 30 Minuten bei 0°C zugetropft. Man erwärmt auf Raumtemperatur, gibt portionsweise weiteres Trifluoressigsäureanhydrid (1.2 ml, 1.830 g, 8.71 mmol) zu und rührt die Reaktionslösung über  
315 Nacht. Die Lösung wird mit 120 ml Essigsäureethylester verdünnt und mit jeweils 50 ml 1 N Salzsäure, mit 50 ml gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung und zweimal mit jeweils 50 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet und filtriert. Nach dem Einengen wird der Rückstand in 150 ml Dichlormethan gelöst, und 141.1 g einer 5 %igen NH<sub>3</sub>-Lösung werden  
320 zugefügt. Die zweiphasige Lösung wird bei Raumtemperatur stark gerührt. Nach 30 Minuten werden die Phasen separiert, und die wäßrige Phase wird mit Dichlormethan (zweimal 50 ml) extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 1 N Salzsäure (zweimal 50 ml) und mit gesättigter Kochsalz-Lösung (zweimal 50 ml) gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der Rückstand (2.77 g) wird mittels MPLC (450 g Kieselgel, v = 300 nm, Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1) gereinigt. Nach dem Einengen und dem Trocknen im  
325 Vakuum wird das Produkt als weißgelblicher Schaum (2.6171 g) erhalten.

Ausbeute: 2.6171 g (7.09 mmol, 85 %), weißgelblicher Schaum (M<sub>w</sub> = 369.3)

DC: R<sub>f</sub> = 0.23 (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

330

mp.: 65 - 68°C (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

IR: KBr  
 $\nu$  (cm<sup>-1</sup>) 3546.3 (v), 3417 (bv), 2924 (m), 1690 (s)

<sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)  
 $\delta$  6.62 - 6.92 (m, 2 H), 5.88 - 6.16 (m, 2 H), 5.25 (d,  $J$  = 15.2 Hz, 0.5 H), 4.85 (d,  $J$  = 16.6 Hz, 0.5 H), 4.42 - 4.77 (m, 2 H), 4.02 - 4.34 (m, 2 H), 3.84 (s, 3 H), 3.60 - 3.83 (m, 0.5 H), 3.27 - 3.50 (m, 0.5 H), 2.72 (d,  $J$  = 16.0 Hz, 1.0 H), 2.29 (bs, 0.7 H), 1.80 - 2.13 (m, 3 H)


<sup>13</sup>C-NMR: (50.32 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)  
 $\delta$  156.1 (m), 146.4 und 146.5 (s), 144.8 und 144.7 (s), 132.0 (s), 128.8 und 128.5 (d), 126.6 und 126.1 (s), 125.7 und 125.3 (d), 120.9 und 119.1 (d), 121.9 (q,  $J$  = 288 Hz), 111.3 (d), 88.1 und 88.0 (d), 61.6 (d), 55.8 (q), 52.6 und 51.8 (t), 47.9 (s), 46.5 und 46.3 (t), 38.4 und 35.4 (t), 29.64 und 29.58 (t)

# Beispiel 185

SPH-1537

(4*a*S,6*R*,8*a*S)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4*a*H-[1]benzofuro[3*a*,3,2-*ef*][2]benz-

azepin-11(12*H*)-yl)carbonsäureallylester



## Variante A (CK-17-1)

355 3.000 g (11.0 mmol) Norgalanthamin werden bei 0°C in einer Lösung aus 10 ml absolutem Dichlormethan und 4.6 ml (3.333 g, 32.9 mmol) Triethylamin vorgelegt. Bei 0°C wird eine Lösung, bestehend aus 1.454 g (12.1 mmol) Chlorameisensäureallylester und 5 ml absolutem Dichlormethan, innerhalb von 20 Minuten zugetropft. Die Reaktionslösung wird über Nacht gerührt und dabei auf Raumtemperatur erwärmt. Die Reaktionslösung wird mit 50 ml 1 N Salzsäure und 50 ml Dichlormethan aufgenommen. Die Phasen werden separiert, und die wässrige Phase wird dreimal mit jeweils 50 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 100 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das Rohprodukt (3.2 g) wird mittels MPLC (Kieselgel,  $h$  = 25 cm,  $d$  = 3.6 cm,  $v$  = 300 nm, Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester = 2/1) getrennt. Nach

365 dem Einengen und dem Trocknen im Vakuum erhält man das Produkt als weißgelblichen  
Schaum (2.594 g) und 0.232 g eines Nebenproduktes, welches als N,O-Diallyloxycarbonylnorgalanthamin identifiziert wurde.

Ausbeute: 2.594 g (7.26 mmol, 66 %)

370

DC:  $R_f = 0.30$  (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

mp.: 44 – 46°C (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

375 IR: KBr

 $\nu$  (cm<sup>-1</sup>) 3550 (m), 3458 (m), 1700 (s)<sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS)

$\delta$  6.62 – 6.86 (m, 2 H), 5.95 – 6.09 (m, 2 H), 5.76 – 5.94 (m, 1 H), 5.10 – 5.33 (m, 2 H), 4.93 und 4.83 (d und d,  $J = 15.1$  Hz und  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 4.45 – 4.68 (m, 3 H), 4.05 – 4.44 (m, 3 H), 3.83 (s, 3 H), 3.27 – 3.55 (m, 1 H), 2.70 (bdd,  $J = 15.1$  Hz und  $J = 15.7$  Hz, 1 H), 2.26 (bs, 0.5 H), 1.93 – 2.11 (m, 1 H), 1.69 – 1.92 (m, 1 H)

380

 $^{13}\text{C}$ -NMR: (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)


385      § 155.1 und 155.0 (s), 146.4 (s), 144.3 (s), 132.7 (d), 132.3 und 132.0 (s), 129.1 (s), 128.0 (d),  
126.2 (d), 121.4 und 120.8 (d), 117.3 und 116.7 (t), 111.1 und 110.9 (d), 88.1 und 88.0  
(d), 65.9 und 65.8 (t), 61.7 (d), 55.7 (q), 51.8 und 51.3 (t), 48.2 (s), 45.8 und 45.3 (t), 37.2  
und 36.3 (t), 29.7 (t)

385

390 Beispiel 186

SPH-1538

(4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-(2-Allyloxycarbonyloxy)-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]benzofuro[3a,3,2-*ef*][2]benzazepin-11(12*H*)-yl)carbonsäureallylester



395

Farbloses Wachs, ( $M_w = 441.5$ )

DC:  $R_f = 0.51$  (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1)

400

IR: KBr

$\nu$  ( $\text{cm}^{-1}$ ) 2947 (m), 1739 (s), 1700 (s)

$^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

405

$\delta$  6.56 - 6.81 (m, 2 H), 6.22 (d,  $J = 10.3$  Hz, 1 H), 5.73 - 6.04 (m, 3 H), 5.08 - 5.40 (m, 5 H), 4.90 (d,  $J = 15.5$  Hz, 0.5 H), 4.80 (d,  $J = 15.9$  Hz, 0.5 H), 4.44 - 4.64 (m, 5 H), 4.04 - 4.43 (m, 2 H), 3.82 (s, 3 H), 3.24 - 3.54 (m, 1 H), 2.78 (bd,  $J = 16.4$  Hz, 1 H), 1.65 - 2.21 (m, 3 H)

$^{13}\text{C-NMR}$ : (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

410

$\delta$  155.0 und 154.8 (s), 154.4 (s), 147.2 (s), 144.1 (s), 132.7 (d), 131.5 (d), 130.9 (s), 130.6 (d), 128.9 und 128.8 (s), 122.3 (d), 120.6 und 120.1 (d), 118.3 (t), 117.2 und 116.6 (t), 111.5 und 111.3 (d), 85.3 (d), 68.1 (t), 66.5 (d), 65.8 und 65.7 (t), 55.8 (q), 51.6 und 51.2 (t), 47.8 (s), 45.6 und 45.2 (t), 37.6 und 36.7 (t), 27.5 (t)

#### 415 Variante B (CK-17-2)

1.000 g (3.66 mmol) Norgalanthamin (68 % (HPLC, CK-1-1)), gelöst in 3 ml absolutem Dichlormethan, und 0.441 g (3.66 mmol) Chlorameisensäureallylester, gelöst in 2 ml absolutem Dichlormethan, werden analog der Methode A mit 1.48 ml (1.448g, 18.3 mmol) Pyridin umgesetzt. Nach der wäßrigen Aufarbeitung analog der Methode A und einer

420 Säulenchromatographie (50 g Kieselgel, Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester = 2/1  $\rightarrow$  1/1) erhält man 0.784 g eines farblosen Schaumes und 0.214 g des selben Nebenproduktes.


Ausbeute: 0.784 g (2.19 mmol, 60 %)

425



425 Beispiel 187

Schema zu Beispiel 187



430 Schritt 1 - 4

Immobilisierung von (4a*S*,6*R*,8a*S*)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4a*H*-[1]Benzofuro-[3a,3,2-ef][2]benzoazepin-11(12*H*)-yl)carbonsäureallylester an einem Hydroxymethyl-Polystyrolharz (Merrifield-Harz)

435 In einer beidseits verschlossenen 5-ml-Polyethylenfritte werden 0.200 g (0.208 mmol) Hydroxymethylpolystyrolharz (1.04 mmol/g, Merrifield-Harz<sup>3</sup>) in 3 ml Dichlormethan suspendiert und 30 Minuten ca. 40-mal pro Minute geschüttelt. Nach dem Filtrieren werden 0.095 g (0.832 mmol) Glutarsäureanhydrid, 178 µl (0.134 g, 1.04 mmol) Ethyldiisopropylamin in 2 ml Dichlormethan zugefügt, und die Suspension wird 16 Stunden bei Raumtemperatur ca. 40-mal pro Minute  
440 geschüttelt. Die Reaktionslösung wird abfiltriert, und das Harz wird einmal mit Dichlormethan, einmal mit Methanol und fünfmal mit Dichlormethan mit jeweils 2.5 ml gewaschen. Nachfolgend wird das Harz in 77 µl (0.075 g, 0.624 mmol) Pivaloylchlorid, 178 µl (0.134 g, 1.04 mmol) Ethyldiisopropylamin in 1.75 ml Dichlormethan suspendiert und sechs Stunden bei  
445 Raumtemperatur geschüttelt. Nach dem Filtrieren und dem Waschen mit Dichlormethan (1 x 2.5 ml), Tetrahydrofuran (1 x 2.5 ml) und Dichlormethan (5 x 2.5 ml) wird das Harz in einer Lösung aus 0.230 g (0.624 mmol) N-Allyloxycarbonylnorgalanthamin, 0.013 g (0.104 mmol) 4-Dimethylaminopyridin und 178 µl (0.134 g, 1.04 mmol) Ethyldiisopropylamin in 2 ml Dichlormethan bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach 22 Stunden wird die Reaktion durch Abfiltrieren der  
450 Reaktionslösung terminiert, das Harz mit Dichlormethan (1 x 2.5 ml), mit Dimethylformamid (2 x 2.5 ml) und mit Dichlormethan (5 x 2.5 ml) gewaschen, trocken gesaugt und im Vakuum bei 30 bis 50 mbar über Nacht getrocknet.  
Zur Feststellung der Beladung wird ein Aliquot des Harzes (0.262 g) in 2.5 ml Methanol/Tetrahydrofuran (1/3) 30 Minuten gequollen, filtriert und in einer Lösung von 0.168 g (0.933 mmol) 30 %ger Natriummethanolat-Methanol-Lösung in 0.5 ml Methanol und 1.5 ml  
455 Tetrahydrofuran suspendiert. Die Mischung wird 15.5 Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt, abfiltriert, und das Harz dreimal mit Methanol/Dichlormethan (1/1, 2.5 ml) und dreimal mit Dichlormethan (2.5 ml) extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit 95 µl (0.067 g, 1.248 mmol) Trifluoressigsäure neutralisiert und am Rotationsverdampfer eingeeengt. Der Rückstand wird  
460 mittels Säulenchromatographie (5 g Kieselgel, Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1) gereinigt. Nach dem Einengen und dem Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.048 g eines farblosen, glasigen Feststoffes.

Ausbeute: 0.048 g (0.13 mmol, 65 % bezogen auf den Substitutionsgrad des Hydroxymethylharzes), <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum identisch mit dem Ausgangsmaterial


465

#### Beispiel 187/Schritt 5 – 8

SPH-1539

1-(4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef]-[2]benzazepin-11(12H)-yl)-6-(4-hydroxy-1-piperidyl)hexan-1-on (CK-36-1)

470



0.273 g Harz, dargestellt aus 0.200 g (0.208 mmol) Hydroxymethylpolystyrolharz1 (1.04 mmol/g) nach der oben beschriebenen Methode A, 0.120 g (0.104 mmol) Pd(Ph<sub>3</sub>P)<sub>4</sub>, 0.292 g (2.08 mmol) Dimedon werden in 2.5 ml Tetrahydrofuran in einer beiderseits verschlossenen 5-ml-Polyethylenfritte sechs Stunden bei Raumtemperatur ca. 40-mal pro Minute geschüttelt. Das Harz wird filtriert und mit Dichlormethan (1 x 2.5 ml), mit Dichlormethan/Methanol/Ethyl-diisopropylamin (5/4/1) (3 x 2.5 ml) und abschließend mit Dichlormethan (5 x 2.5 ml) gewaschen. Nachfolgend versetzt man das Harz mit einer Lösung aus 96 µl (0.133 g, 0.624 mmol) 6-Bromocaproylchlorid und 178 µl (0.134 g, 1.04 mmol) Ethyl-diisopropylamin in 2 ml Dichlormethan und schüttelt fünf Stunden bei Raumtemperatur. Nach dem Waschen mit Dimethylformamid (6 x 2.5 ml) wird das Harz in einer Lösung aus 0.210 g (2.08 mmol) 4-Hydroxypiperidin und 2 ml Dimethylformamid zwölf Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt. Das Harz wird dreimal mit jeweils 2.5 ml Dichlormethan und dreimal mit jeweils 2.5 ml Tetrahydrofuran gewaschen und nachfolgend in einer Lösung von 0.168 g (0.933 mmol) 30 %iger Natriummethanolat-Methanol-Lösung in 0.5 ml Methanol und 1.5 ml Tetrahydrofuran suspendiert. Nach zwölf Stunden bei Raumtemperatur wird das Harz filtriert und mit Methanol/Dichlormethan (1/1, 3 x 2.5 ml) und mit Dichlormethan (3 x 2.5 ml) extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit 95 µl (0.067 g, 1.248 mmol) Trifluoressigsäure neutralisiert und am Rotationsverdampfer auf ca. 2 ml Volumen eingeeengt. Das Rohprodukt wird mittels präparativer Dünnschichtchromatographie (PSC-Fertigplatte<sup>2</sup>, Laufmittel Dichlormethan/Methanol = 9/1 + 3 % Triethylamin) gereinigt. Von der eingeeengten Produktfraktion wird anschließend mittels einer Säulenfiltration über Aluminiumoxid (pH 9 - 10, Laufmittel Dichlormethan/Methanol = 20/1) Triethylammoniumtrifluoressigsäure abgetrennt. Nach dem Einengen und Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.012 g des Produktes in Form eines gelblichen Schaumes.

Ausbeute: 0.012 g (0.025 mmol, 12 % bezogen auf den Substitutionsgrad des Hydroxymethylharzes), weißbräunliches Wachs (M<sub>w</sub> = 470.6)

DC: R<sub>f</sub> = 0.32 (Dichlormethan/Methanol = 8/2 + 2 % Triethylamin)

1 Hydroxymethyl-Resin, D-1160, Bachem Feinchemikalien AG

2 PSC-Fertigplatte von Merck, Art.-nr.: 113 895, 20 x 20 cm, 1 mm, Kieselgel 60 F<sub>254</sub>

HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 5.38$  min, 98.6 % (Waters Xterra-Säule, 3.9 mm x 100 mm, RP-18, 3.5  $\mu\text{m}$ , 250 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$  in  $\text{H}_2\text{O}$  (20/80 v/v, pH 10)

05  $^1\text{H-NMR}$ : (200.13 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)  
 $\delta$  6.81 – 6.88 und 6.61 – 6.71 (m, 2 H), 5.90 – 6.10 (m, 2 H), 4.52 – 4.75 (m, 2 H), 4.51 (d,  $J = 16.5$  Hz, 1 H), 4.15 (bs, 1 H), 3.84 (s, 3 H), 3.82 (s, 1 H), 3.40 – 3.60 und 3.10 – 3.30 (m, 1 H), 2.81 – 3.03 (m, 2 H), 2.70 (bd,  $J = 16.3$  Hz, 1 H), 2.33 – 2.62 (m, 4 H), 1.15 – 2.30 (m, 21 H)


510 LC/MS:  $t_{\text{Ret}} = 8.7$  min, 98 %, (Zorbax SB C 13-Säule, 2.1 mm x 30 mm, RP-18, 3  $\mu\text{m}$ , 0.5 ml/min, Methanol/ $\text{H}_2\text{O}$  (40/60  $\rightarrow$  100/0 (v/v) in 2 min)

APCI-NI-MS


470

(  
515

515 **Beispiel 188**  
**Schema zu Beispiel 188**



**Beispiel 188/Schritt 1 - 7**



525

# **Variante A (CK-41-3), Schritte 1, 4 und 6 – 7**

- 0.228 g (0.212 mmol) 4-Carboxy-1-oxobut-1-ylloxymethyl-Merrifieldharz wird in einer beiderseits verschlossenen 5-ml-Polyethylenfritte 30 Minuten in 3 ml Dichlormethan gequollen und nach dem Filtrieren in einer Lösung von 0.234 g (0.628 mmol) N-tert.-Butoxycarbonylnorgalanthamin, 0.013 g (0.105 mmol) 4-Dimethylaminopyridin und 108 µl (0.082 g, 0.628 mmol) Ethyldiisopropylamin in 1 ml Dichlormethan versetzt. Anschließend fügt man 97 µl (0.079 g, 0.628 mmol) Diisopropylcarbodiimid, gelöst in 1 ml Dichlormethan, zu und schüttelt die Suspension 24 Stunden ca. 40-mal pro Minute bei Raumtemperatur. Nach dem Filtrieren wird das Harz zehn Minuten in 2.5 ml Dichlormethan/Methanol (1/1) unter Schütteln suspendiert, filtriert und mit Dichlormethan (5 x 2.5 ml) gewaschen. Nachfolgend suspendiert man das Harz einmal für zehn Minuten und einmal für 50 Minuten jeweils in 2.5 ml einer Lösung aus Trifluoressigsäure, Dichlormethan und Anisol (25/70/5). Nach dem Filtrieren wird mit Dichlormethan (2 x 2.5 ml), mit Dichlormethan/Methanol/Triethylamin (5/4/1, 3 x 2.5 ml) und abschließend mit Dichlormethan (5 x 2.5 ml) gewaschen. Das Harz wird für elf Stunden in einer Lösung aus 0.208 µl (0.245 g, 1.45 mmol) 1-Naphthylisocyanat, 113 µl (0.085 g, 0.657 mmol) Ethyldiisopropylamin und 2 ml Dichlormethan bei Raumtemperatur geschüttelt. Nach jeweils dreimaligen Waschen mit Dichlormethan (2.5 ml) und Tetrahydrofuran (2.5 ml) suspendiert man das Polymer in einer Lösung von 0.188 g (1.045 mmol) 30 %ger Natriummethanolat-Methanol-Lösung in 0.4 ml Methanol und 1.6 ml Tetrahydrofuran. Nachdem das Harz 24 Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt wurde, wird das Harz filtriert und mit Methanol/Dichlormethan (1/1, 3 x 2.5 ml) und mit Dichlormethan (3 x 2.5 ml) extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit konzentrierter Salzsäure neutralisiert. Die Suspension wird über eine Kieselgelsäule (10 g, Dichlormethan/Methanol = 9/1) filtriert, und das Filtrat wird am Rotationsverdampfer eingeeengt. Das Rohprodukt wird mittels präparativer Dünnschichtchromatographie (Kieselgel, Laufmittel Dichlormethan/Methanol = 47/3) gereinigt. Nach dem Einengen und Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.091 g eines gelblichen Schaumes. Um Triethylammoniumsalze zu entfernen, wird der Rückstand in Dichlormethan aufgenommen und zweimal mit 1 N Salzsäure und einmal mit gesättigter Kochsalzlösung extrahiert, über MgSO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingeeengt.
- 555 Ausbeute: 0.042 g (0.095 mmol, 45 % bezogen auf den Substitutionsgrad des 4-Carboxy-1-oxobut-1-ylloxymethyl-Merrifieldharzes), braungelbliches Wachs (M<sub>w</sub> = 442.5)

DC:  $R_f = 0.21$  (Dichlormethan/Methanol = 48/2)

560 HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 5.15$  min, 100 % (Merck Purospher-Säule 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5  $\mu\text{m}$ , 250 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $\text{Cl}_3\text{CCO}_2\text{H}$  in  $\text{H}_2\text{O}$  (40/60 v/v))

<sup>1</sup>H-NMR: (200.13 MHz, CDCl<sub>3</sub>, TMS).

565  $\delta$  7.71 (d,  $J = 6.9$  Hz, 1 H), 7.20–7.66 (m, 6 H), 6.85 (d,  $J = 8.4$  Hz, 1 H), 6.63 (d,  $J = 8.2$  Hz, 1 H), 5.96 (bs, 2 H), 4.91 (d,  $J = 16.7$  Hz, 1 H), 4.25–4.62 (m, 3 H), 4.09 (bs, 1 H), 3.78 (s, 3 H), 3.25–3.50 (m, 2 H), 2.55–2.67 (m, 1 H), 1.87–2.04 (m, 2 H), 1.60–1.75 (m, 1 H)

 $^{13}\text{C}$ -NMR: (50.32 MHz,  $\text{CDCl}_3$ , TMS)

570 8 155.7, 146.9, 144.6, 134.4, 133.8, 132.5, 129.0, 128.7, 128.1, 128.0, 126.3, 125.6, 125.5,  
124.8, 122.1, 120.7, 111.0, 88.2, 62.9, 55.9, 51.8, 48.3, 46.1, 36.4, 29.7

### **Variante B, , Schritte 2 - 5 und 7**

0.250 g (0.233 mmol) 4-Carboxy-1-oxobut-1-yloxymethyl-Merrifieldharz werden in einem Fritten-  
575 reaktor eines Syntheseroboters (Syro II MultiSynTech) vorgelegt. Anschließend wird das Harz im  
Reaktor 30 Minuten in Dichlormethan aufgequollen, abgesaugt, dreimal mit Dichlormethan  
gewaschen und sukzessive mit 0.150 g (1.163 mmol) Ethyldiisopropylamin in 1 ml Dichlormethan  
und 0.084 g (0.698 mmol) Pivaloylchlorid in 1.5 ml Dichlormethan versetzt. Nach sechs stündigen  
Rühren bei 23°C wird die Lösung abgesaugt, und das Polymer wird mit jeweils 3 ml  
580 Dichlormethan (6 x 2 Minuten) gewaschen. Nach der Zugabe von 0.260 g (0.698 mmol) N-tert.-  
Butoxycarbonylnorgalanthamin, 0.014 g (0.116 mmol) 4-Dimethylaminopyridin und 0.150 g (1.163  
mmol) Ethyldiisopropylamin in 2.5 ml Dichlormethan wird die Suspension bei 23°C für 15 Stunden  
gerührt. Nachdem Absaugen wird das Harz in 2.5 ml Dichlormethan/Methanol (1/1) für zehn  
Minuten gerührt, abgesaugt, dreimal mit Dichlormethan/Methanol (1/1) (3 ml, 2 Minuten) und  
585 fünfmal mit Dichlormethan (3 ml, 2 Minuten) gewaschen. Nachfolgend wird das Polymer einmal  
für zehn Minuten und einmal für 50 Minuten jeweils in 2.5 ml einer Lösung aus Trifluoressigsäure,  
Dichlormethan und Anisol (25/70/5) suspendiert. Nach dem Absaugen wird mit Dichlormethan (3  
x 3 ml), mit Dichlormethan/Methanol/Triethylamin (5/4/1, 3 x 3 ml) und abschließend mit  
Dichlormethan (5 x) jeweils für zwei Minuten gewaschen. Danach versetzt man das Harz mit  
590 0.197 g (1.163 mmol) 1-Naphthylisocyanat, 0.150 g (1.163 mmol) Ethyldiisopropylamin und 2.5 ml  
Dimethylformamid und rührt für sechs Stunden bei 50°C. Die Reaktion wird terminiert, indem man  
die Lösung absaugt, das Harz bei 23°C sechsmal für jeweils zwei Minuten mit 3 ml Dichlormethan  
wäscht und bei 40°C für zehn Minuten das Harz trocken saugt. Zur Abspaltung wird das Harz in  
eine beiderseits verschlossene 5-ml-Polyethylenfritte transferiert und in 2.5 ml Tetrahydrofuran 30


595 Minuten gequollen. Nach dem Filtrieren suspendiert man das Polymer in einer Lösung aus 0.209 g  
 (1.163 mmol) 30 %ger Natriummethanolat-Methanol-Lösung in 0.75 ml Methanol und 1.25 ml  
 Tetrahydrofuran, und schüttelt 15 Stunden ca. 40-mal pro Minute bei Raumtemperatur. Das Harz  
 wird filtriert und dreimal mit Methanol/Dichlormethan (1/1, 2.5 ml) und dreimal mit  
 Dichlormethan (2.5 ml) extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden mit konzentrierter Salzsäure  
 600 neutralisiert, filtriert und eingeengt. Anschließend wird das Rohprodukt mittels  
 Säulenchromatographie über 10 g Kieselgel (Laufmittel Dichlormethan/Methanol = 99/1)  
 gereinigt. Nach dem Einengen und Trocknen im Vakuum erhält man 0.029 g eines rosafarbenen  
 Waxes von 75 %iger Reinheit (HPLC), identisch mit dem nach Methode A hergestellten  
 Produkt.

605 Ausbeute: 0.029 g (0.021 g, 0.047 mmol, 20 % bezogen auf den Substitutionsgrad des 4-  
 Carboxy-1-oxobut-1-yloxymethyl-Merrifieldharzes)

( HPLC:  $t_{Ret} = 14.32$  min, 75 % (Merck Purospher-Säule 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5  $\mu$ m, 250 nm, 1  
 610 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $Cl_3CCO_2H$  in  $H_2O$  (30/70 v/v)



Schema zu Beispiel 189-190




Beispiel 189

SPH-1541

615 Schritt 1 - 2

(4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-11-terf.-butoxycarbonyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6(12H)-yloxy)-5-oxopentansäure (CK-48-1)



620 Es werden 5.000 g (18.295 mmol) Norgalanthamin (98 % (HPLC)) und 3.804 ml (2.777 g, 27.442 mmol) Triethylamin in 75 ml absolutem Dichlormethan bei 0° C vorgelegt. Unter Rühren werden innerhalb von 15 Minuten bei 0° C eine Lösung aus 4.393 g (20.124 mmol) Di-tert.-butyldicarbonat zugetropft. Nach 40 Minuten bei 0° C wird die Reaktionslösung drei Tage lang bei Raumtemperatur gerührt. Nach zwei Tagen werden nochmals 1.598 g (7.318 mmol) Di-tert.-butyldicarbonat und 1.27 ml (0.926 g, 9.147 mmol) Triethylamin zugefügt. Die Reaktionslösung wird mit 150 ml Dichlormethan aufgenommen, und die organische Phase wird dreimal mit jeweils 100 ml 1 N Salzsäure, dreimal mit jeweils 100 ml gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung und zweimal mit 100 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und unter verminderten Druck eingeeengt. Der Rückstand (7.065 g, 18.9 mmol, 103 % Rohausbeute) wird in 75 ml absolutem Dichlormethan aufgelöst, und zu dieser Lösung werden 4.175 g (36.590 mmol) Glutarsäureanhydrid, 0.224 g (1.829 mmol) 4-Dimethylaminopyridin und 3.804 ml (2.777 g, 27.442 mmol) Triethylamin zugefügt. Die Lösung wird bei Raumtemperatur drei Tage gerührt. Die Reaktion wird durch die Zugabe von 200 ml Diethylether und 500 ml wäßriger Ammoniaklösung (ph 10 – 11) terminiert. Die trübe wäßrige Phase wird abgetrennt (schlechte Phasentrennung, Zugabe von etwas Methanol, gegebenenfalls vorher die Dichlormethan-Lösung abdestillieren) und dreimal mit 200 ml Diethylether extrahiert und anschließend mit konzentrierter Salzsäure auf pH 2 eingestellt. Dabei wird die trübe Lösung klar. Die wäßrige Phase wird viermal mit jeweils 400 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden dreimal mit jeweils 300 ml aqua dest und zweimal mit 300 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert, mit 50 ml Diisopropylether versetzt und unter verminderten Druck konzentriert, bis das Produkt auskristallisiert. Man läßt die Lösung etwas stehen und filtriert dann den auskristallisierten farblosen Feststoff ab, welcher im Vakuum getrocknet wird.

645 Ausbeute: 7.546 g (15.48 mmol, 84.6 % über beide Stufen), farbloser kristalliner Feststoff. (M<sub>w</sub> = 487.6)

DC: R<sub>f</sub> = 0.45 (Petrolether/Essigsäureethylester = 1/2)

650

IR: KBr

655

$\delta$  6.53 - 6.79 (m, 2 H), 6.13 - 6.29 (m, 1 H), 5.82 - 5.97 (m, 1 H), 5.33 (t,  $J = 4.9$  Hz, 1.0 H), 4.87 (d,  $J = 15.6$  Hz, 0.3 H), 4.67 (d,  $J = 15.7$  Hz, 0.7 H), 4.53 (s, 1 H), 3.99 - 4.38 (m, 2 H), 3.83 (s, 3 H), 3.19 - 3.50 (m, 1 H), 2.68 (d,  $J = 16.0$  Hz, 1.0 H), 2.40 (t,  $J = 7.3$  Hz, 2.0 H), 2.39 (t,  $J = 7.0$  Hz, 2.0 H), 2.01 - 2.17 (m, 1 H), 1.93 (qui,  $J = 7.1$  Hz, 2.0 H), 1.66 - 1.84 (m, 1 H), 1.41 (s, 3 H), 1.37 (s, 6 H)

665


8 178.2 (s), 172.6 (s), 154.9 (s), 147.1 (s), 144.0 (s), 131.3 (s), 130.5 (d), 129.6 (s), 123.0 (d),  
120.2 (d), 111.0 (d), 85.8 (d), 79.9 (s), 63.2 (d), 55.8 (q), 51.8 und 51.2 (t), 48.0 (s), 45.2  
(t), 37.9 und 37.0 (t), 33.4 (t), 32.9 (t), 28.2 (q), 27.5 (t), 19.7 (t)

### Beispiel 190

## SPH-1542

670 (siehe Schema Schritt 3)

**Immobilisierung von (4aS,6R,8aS)-6-Hydroxy-3-methoxy-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro-[3a,3,2-e'] [2]benzoozepin-11(12H)-yl)carbonsäure-terf.-butylester an einem Hydroxymethyl-Polystyrolharz (Merrifield-Harz) (CK-43-5)**



675

5.000 g (5.2 mmol) Hydroxymethylpolystyrolharz (1.04 mmol/g, Merrifield-Harz3) werden in einem

3 Hydroxymethyl-Resin, D-1160, Bachem Feinchemikalien AG


- Dreihalsglasreaktor mit einer am Boden eingelassenen Fritte und KPG-Rührer in 50 ml Dimethylformamid gerührt (300 s<sup>-1</sup>). Nach dem Filtrieren wird zu dem Harz eine Lösung aus N-tert.-Butoxycarbonylnorgalanthamin-6-yloxy-5-oxopentansäure (7.607 g, 15.6 mmol), 4-Dimethylaminopyridin (0.635 g, 5.2 mmol) in 30 ml absolutem Dimethylformamid zugegeben. Bei Raumtemperatur wird anschließend eine Lösung aus Diisopropylcarbodiimid (2.42 ml, 1.969 g, 15.6 mmol) und 10 ml Dimethylformamid portionsweise zugefügt. Nach 20 stündigem Rühren bei Raumtemperatur wird filtriert, das Harz wird sechsmal mit Dichlormethan (40 ml, 5 min) und einmal mit Diethylether (40 ml, 5 min) gewaschen und im Vakuum getrocknet.
- Zur Feststellung der Beladung wird ein Aliquot des Harzes (0.2465 g) in einer beidseitig verschließbaren Polyethylenfritte in 2.5 ml Methanol/Tetrahydrofuran (1/4) 30 Minuten gequollen, filtriert und in einer Lösung von 0.280 g (1.56 mmol) 30 %ger Natriummethanolat-Methanol-Lösung in 0.5 ml Methanol und 2 ml Tetrahydrofuran suspendiert. Die Mischung wird neun Stunden bei Raumtemperatur geschüttelt, abfiltriert, und das Harz dreimal mit Methanol/Dichlormethan (1/1, 2.5 ml) und dreimal mit Dichlormethan (2.5 ml) extrahiert. Die vereinigten Filtrate werden mit 119 µl (0.178 g, 1.56 mmol) Trifluoressigsäure neutralisiert und am Rotationsverdampfer eingeeengt. Der Rückstand wird in 30 ml Essigsäureethylester aufgenommen, zweimal mit gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung (10 ml), mit aqua dest (10 ml) und mit gesättigter Kochsalz-Lösung (10 ml) gewaschen, über Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und erneut eingeeengt. Der Rückstand (0.080 g) wird mittels Säulenchromatographie (10 g Kieselgel, Laufmittel Petrolether/Essigsäureethylester = 1/1 → 1/2) gereinigt. Nach dem Einengen und dem Trocknen im Hochvakuum erhält man 0.0661 g eines farblosen, glasigen Feststoffes.
- Ausbeute: 0.0661 g (0.177 mmol, Somit errechnet sich eine Beladung von 0.718 mmol/g, 103 % der theoretischen Maximalbeladung<sup>4</sup>), <sup>1</sup>H-NMR-Spektrum identisch mit dem Ausgangsmaterial
- HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 9.18 \text{ min}$ , 93.8 % (270 nm), 97.7 % (285 nm), (Phenomenex Luna-Säule, 3.0 mm x 50 mm, RP-18, 3.0 µm, 0.5 ml/min, Methanol/ 20 mM Trichloressigsäure in H<sub>2</sub>O (50/50 v/v)

#### Schritt 4

- Recycling des Überschusses an (4aS,6R,8aS)-3-Methoxy-11-tert.-butoxycarbonyl-5,6,9,10-tetrahydro-4aH-[1]benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6(12H)-yloxy)-5-oxopentansäure aus der Harzimmobilisierung (CK-51-1)

Das Filtrat der Reaktionslösung und die ersten fünf Dichlormethanfiltrate werden vereinigt und mit dreimal 100 ml 1 N Salzsäure, dreimal mit 100 ml aqua dest und zweimal mit gesättigter

$$4 = 1.04 \text{ mmol/g} / (1 \text{ g} + 1 \text{ g} * 1.04 \text{ mol/g} * (487.6 \text{ mol/g} - 18 \text{ mol/g}) / 1000)$$



715 Natriumchlorid-Lösung gewaschen, mit  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  getrocknet, filtriert und eingeeengt. Der amorphe Rückstand (6.806 g) wird in 50 ml Ethanol und 30 ml aqua dest suspendiert, anschließend fügt man 1.97 g (46.9 mmol) Lithiumhydroxid Monohydrat zu. Die Suspension wird drei Tage bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionslösung wird dreimal mit jeweils 100 ml Dichlormethan extrahiert, und die vereinigten Extrakte werden jeweils mit dreimal 100 ml 1 N Salzsäure und zweimal mit 100 ml gesättigter Kochsalz-Lösung extrahiert. Die organische Phase ergibt nach dem Trocknen über  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ , Filtrieren und Einengen unter verminderten Druck 5.06 g eines farblosen Schaumes, der laut HPLC ca. 60% N-*tert*-Butoxycarbonylnorgalanthamin enthält. Der Rückstand wird analog der oben beschriebenen Prozedur mit 0.164 g (1.339 mmol) Dimethylaminopyridin, 3.056 g (26.78 mmol) Glutarsäureanhydrid und 2.8 ml (2.033 g, 20.09 mmol) Triethylamin in 50 ml Dichlormethan umgesetzt. Die Reaktion wird durch die Zugabe von 200 ml Diethylether und 250 ml wäßriger Ammoniaklösung (pH 10 - 11) terminiert. Die trübe wäßrige Phase wird abgetrennt und zweimal mit 200 ml Diethylether extrahiert und anschließend mit konzentrierter Salzsäure auf pH 2 eingestellt. Die wäßrige Phase wird dreimal mit jeweils 200 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden dreimal mit jeweils 200 ml aqua dest und zweimal mit 200 ml gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen, über  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  getrocknet, filtriert, auf ca. 50 ml eingeeengt, mit 50 ml Diisopropylether versetzt und weiter unter verminderten Druck konzentriert, bis das Produkt auskristallisiert. Man läßt die Lösung etwas stehen und filtriert dann den auskristallisierten farblosen Feststoff ab, welcher im Vakuum getrocknet wird.

735 Ausbeute: 4.909 g (10.07 mmol, 96.6 % bezogen auf den eingesetzten Überschuß in der Immobilisierung)


HPLC:  $t_{\text{Ret}} = 13.9$  min, 99.8 % (Merck Purospher-Säule, 4.0 mm x 125 mm, RP-18e, 5  $\mu\text{m}$ , 285 nm, 1 ml/min, Acetonitril/ 20 mM  $\text{Cl}_3\text{CCO}_2\text{H}$  in  $\text{H}_2\text{O}$  (40/60 v/v, pH 10)

740

## Beispiel 192

### Schritt 1

#### N-(Adamantan-1-yl)-6-bromhexansäureamid



745

Adamantan-1-amin, Hydrochlorid (2.50 g, 13.3 mmol) und N-Ethyl-diisopropylamin (3.79 g, 29.3 mmol) werden in absolutem CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (50 mL) 15 Minuten bei Raumtemperatur gerührt. Danach tropft man bei 0 °C 6-Bromhexansäurechlorid (3.13 g, 14.7 mmol) in CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (10 mL) zu und rührt eine Stunde bei Raumtemperatur.

Man extrahiert mit 2 N HCl (2 x 50 mL), Wasser (1 x 50 mL), gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung (2 x 50 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 100 mL), trocknet (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und kristallisiert den nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltenen Rückstand aus Petrolether (25 mL)/Diisopropylether (25 mL) um, wodurch das Produkt in Form farbloser Kristalle vom Schmelzpunkt 73 – 75 °C erhalten wird (3.51 g, 80 %).


DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH = 9 : 1, R<sub>f</sub> = 0.9

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 5.43 (b, 1H), 3.33 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 2.21 – 1.15 (m, 23 H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 171.6 (s), 51.4 (s), 41.3 (t), 37.0 (t), 36.1 (t), 33.5 (t), 32.2 (t), 29.1 (d), 27.4 (t), 24.6 (t)


## Schritt 2

SPH-1517

N-(Adamantan-1-yl)-6-[(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-e][2]benzazepin-11-yl]-bromhexansäureamid, Fumarat



Norgalanthamin (1.00 g, 3.66 mmol), N-(Adamantan-1-yl)-6-bromhexansäureamid (1.20 g, 3.66 mmol) und Kaliumcarbonat (wasserfrei, frisch vermahlen, 1.52 g, 11.3 mmol) werden in absolutem Acetonitril (10 mL) 8 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird durch Säulenchromatographie (200 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt, wodurch das Produkt als hellgelber Schaum (1.73 g, 91 %) erhalten wird.



Die Umwandlung ins Fumarat erfolgte analog zur Herstellung von MT-311 und MT-407 und lieferte das Produkt in Form hellgelber Kristalle vom Schmelzpunkt 109 – 114 °C

780

DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH : NH<sub>3</sub> = 89 : 10 : 1, R<sub>f</sub> = 0.6

Mikroelementaranalyse (JOS 1763):

C<sub>37</sub>H<sub>42</sub>N<sub>2</sub>O<sub>9</sub>·H<sub>2</sub>O

785 Berechnet: C, 66.03; H, 7.70; N, 4.28

Gefunden: C, 66.27; H, 7.61; N, 4.22

<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 7.20 (b, 1H), 6.90 – 6.63 (m, 2H), 6.51 (s, 2H), 6.11 (d, J = 10.2 Hz, 1H), 5.82 (dd, J = 11.4 Hz, J = 4.7 Hz, 1H), 4.56 (s, 1H), 4.41 (d, J = 14.8 Hz, 1H), 4.22 – 3.86 (m, 2H), 3.76 (s, 3H), 3.62 – 3.12 (m, 3H), 2.81 – 2.47 (m, 3H), 2.44 – 1.04 (m, 26 H);

790


<sup>13</sup>C NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 171.6 (s), 167.4 (s), 146.3 (s), 144.1 (s), 134.7 (d), 132.9 (s), 129.0 (d), 126.3 (d), 124.6 (s), 122.0 (d), 111.7 (d), 86.7 (d), 59.8 (d), 55.5 (q), 50.7 (t), 50.5 (t), 47.3 (s), 41.1 (t), 36.1 (t), 36.0 (s), 32.0 (t), 31.0 (t), 28.9 (d), 26.0 (t), 25.2 (t), 24.9 (t)

795

### Beispiel 193

#### Schritt 1

#### 2-(5-Brompentyl)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion



800

Zu einer Suspension von Natriumhydrid (2.33 g, 55.8 mmol einer 55 %igen Disperion, durch Waschen mit absolutem Petrolether von Weißöl befreit) in absolutem DMF (50 mL) wird 1H-Benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion (10.0 g, 50.7 mmol) in DMF (50 mL) bei Raumtemperatur langsam zugetropft. Man rührt 30 Minuten, erhitzt auf 60 °C, setzt 1,5-Dibrompentan (46.64 g, 202.8 mmol) auf einmal zu und rührt 12 Stunden bei dieser Temperatur.

805

Man filtriert, und der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird zwischen Wasser (200 mL) und Ether (200 mL) verteilt. Die wäßrige Phase wird mit Ether extrahiert (3 x 50 mL), die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser (3 x 200 mL), 2 N NaOH (2 x 100 mL) und gesättigter Kochsalzlösung (1 x 200 mL) gewaschen, getrocknet

810

(Natriumsulfat) und am Rotationsverdampfer vom Lösungsmittel befreit. Überschüssiges Dibrompentan wird durch Destillation (100 °C/20 mbar) abgetrennt, der Rückstand wird aus Methanol (200 mL) umkristallisiert, wodurch man das Produkt in Form farbloser Kristalle (15.45 g, 88 %) vom Schmelzpunkt 114 - 116 °C erhält.

815

DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 4 : 1,  $R_f$  = 0.35

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  8.48 (dd,  $J$  = 7.0 Hz,  $J$  = 1.3 Hz, 2H), 8.13 (dd,  $J$  = 7.0 Hz,  $J$  = 1.3 Hz, 2H), 8.48 (t,  $J$  = 7.0 Hz, 2H), 4.21 (t,  $J$  = 7.6 Hz, 2H), 3.89 (t,  $J$  = 6.6 Hz, 2H), 1.89 (Quintett,  $J$  = 6.6 Hz, 2H), 1.79 - 1.43

820


(m, 4H);  
 $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  163.8 (s), 133.7 (d), 131.3 (s), 130.9 (d), 127.8 (s), 126.7 (d), 122.4 (d), 39.8 (t), 33.5 (t), 32.2 (t), 27.0 (t), 25.5 (t)

825

## Schritt 2

### SPH-1496

2-[5-[(4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11-yl]pentyl]-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion, Fumarat



Norgalanthamin (1.00 g, 3.66 mmol), 2-(5-Bromopentyl)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion (1.15 g, 3.33 mmol) und Kaliumcarbonat (wasserfrei, frisch vermahlen, 1.15 g, 10.0 mmol) werden in absolutem Acetonitril (10 mL) 12 Stunden bei Siedetemperatur gerührt.

835

Der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird durch Säulenchromatographie (100 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt, wodurch das Produkt als hellgelber Schaum (1.58 g, 88 %) erhalten wird. Die Umwandlung ins Fumarat erfolgte analog zur Herstellung von MT-311 und MT-407 und lieferte das Produkt in Form hellgelber Kristalle vom Schmelzpunkt 129 - 134 °C

840

DC:  $\text{CHCl}_3$  : MeOH :  $\text{NH}_3$  = 89 : 10 : 1,  $R_f$  = 0.5



Mikroelementaranalyse (JOS 1790):

$C_{37}H_{38}N_2O_9 \cdot 1.5H_2O$

845 Berechnet: C, 65.19; H, 6.06; N, 4.11

Gefunden: C, 65.02; H, 5.82; N, 3.98

$^1H$  NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  8.34 (d,  $J = 7.0$  Hz, 4H), 7.76 (d,  $J = 7.0$  Hz, 2H), 6.81 – 6.49 (m, 4H), 6.07 (d,  $J = 11.4$  Hz, 1H), 5.81 (dd,  $J = 11.4$  Hz,  $J = 4.7$  Hz, 1H), 4.49 (s, 1H), 4.29 (d,  $J = 14.0$  Hz, 1H), 4.16 – 3.74 (m, 4H), 3.70 (s, 3H), 3.43 – 3.01 (m, 2H), 2.50 (b, 2H), 2.27 (d,  $J = 14.8$  Hz, 1H), 2.12 – 1.88 (m, 2H), 1.78 – 1.12 (m, 8H);


850  $^{13}C$  NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  167.3 (s), 163.3 (s), 146.2 (s), 143.8 (s), 134.7 (d), 134.2 (d), 132.8 (s), 131.2 (s), 130.6 (d), 128.7 (d), 127.2 (d), 127.1 (s), 126.5 (d), 126.1 (s), 121.9 (s), 121.6 (d), 111.5 (d), 86.7 (d), 59.8 (d), 56.0 (t), 55.5 (q), 50.7 (t), 50.2 (t), 47.4 (s), 39.5 (t), 32.2 (t), 30.9 (t), 27.3 (t), 25.3 (t), 24.1 (t)

55

Beispiel 194

Schritt 1

6-Brom-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-hexanon



860

Zu einem Gemisch aus 1,2-Dimethoxybenzol (3.10 g, 22.7 mmol) und Aluminiumchlorid (3.0 g, 22.7 mmol) in absolutem Schwefelkohlenstoff (50 mL) wird bei einer Temperatur von 0 bis 5 °C 6-Bromhexansäurechlorid (4.9 g, 22.7 mmol) innerhalb von 10 Minuten zugetropft.

865 Man erhitzt innerhalb von 30 Minuten auf 40 °C und rührt eine Stunde bei dieser Temperatur.

Man hydrolysiert mit 2 N Salzsäure (20 mL), verteilt zwischen Benzol (30 mL) und 2 N Salzsäure (30 mL) und extrahiert die wäßrige Phase mit Benzol (2 x 15 mL), wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 2 N Salzsäure (3 x 50 mL), Wasser (1 x 50 mL), gesättigter

Natriumhydrogencarbonatlösung (3 x 50 mL), gesättigter Kochsalzlösung (1 x 50 mL), trocknet

870 (Natriumsulfat/Aktivkohle), filtriert und kristallisiert den nach Eindampfen am

Rotationsverdampfer erhaltenen Rückstand aus Pentan (35 mL) um, wodurch das Produkt in Form farbloser Kristalle vom Schmelzpunkt 44 – 45 °C erhalten wird (3.2 g, 44.7 %).

DC: Petrolether : Essigsäureethylester = 4 : 1;  $R_f = 0.85$


875

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.54 (dd, J = 1.9 Hz, J = 8.9 Hz, 1 H), 7.51 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 6.89 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 3.97 (s, 6H), 3.40 (t, J = 6.4 Hz, 2H), 2.92 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 1.90 (Quintett, J = 6.4 Hz, 2H), 1.73 (Quintett, J = 7.0 Hz, 2H), 1.63 – 1.48 (m, 2H);  
<sup>13</sup>C NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 198.6 (s), 153.2 (s), 149.0 (s), 130.2 (s), 122.6 (d), 110.1 (d), 110.0 (d), 56.0 (q), 55.9 (q), 37.7 (t), 33.6 (t), 32.6 (t), 27.9 (t), 23.6 (t)

## Schritt 2

### SPH-1497

1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-[[4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-6-hydroxy-3-methoxy-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-11-yl]hexan-1-on, Fumarat



Norgalanthamin (1.00 g, 3.66 mmol), 6-Brom-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-hexanon (1.15 g, 3.66 mmol) und Kaliumcarbonat (wasserfrei, frisch vermahlen, 1.15 g, 10.0 mmol) werden in absolutem Acetonitril (15 mL) 12 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Der nach Entfernen des Lösungsmittels am Rotationsverdampfer erhaltene Rückstand wird durch Säulenchromatographie (100 g Kieselgel, Chloroform : Methanol : Ammoniak = 96 : 3 : 1) gereinigt, wodurch das Produkt als hellgelber Schaum (1.70 g, 91 %) erhalten wird. Die Umwandlung zum Fumarat erfolgte nach der Standardvorschrift. Die Umwandlung ins Fumarat erfolgte analog zur Herstellung von MT-311 und MT-407 und lieferte das Produkt in Form hellgelber Kristalle vom Schmelzpunkt 88 – 94 °C

DC: CHCl<sub>3</sub> : MeOH : NH<sub>3</sub> = 89 : 10 : 1, R<sub>f</sub> = 0.5


### Mikroelementaranalyse (JOS 1782):

C<sub>35</sub>H<sub>43</sub>NO<sub>10</sub>·0.5 H<sub>2</sub>O

Berechnet: C, 65.00; H, 6.86; N, 2.17

Gefunden: C, 64.81; H, 6.64; N, 2.09

<sup>1</sup>H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 7.61 (d, J = 8.9 Hz, 1 H), 7.43 (s, 1H), 7.01 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 6.81 – 6.66 (m, 2H), 6.58 (s, 2H), 6.11 (d, J = 11 Hz, 1H), 5.82 (dd, J = 11 Hz, J = 5 Hz, 1H), 4.61 – 4.33 (m 2H), 4.20 –



- 265 -

3.92 (m 2H), 3.84 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.72 (s, 3H), 3.62 – 3.12 (m, 2H), 3.10 – 2.81 (m, 2H), 2.78 – 2.43 (m, 3H), 2.39 – 1.86 (m, 5H), 1.78 – 1.40 (m, 5H), 1.38 – 1.14 (m, 2H);  
910 <sup>13</sup>C NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 198.5 (s), 167.2 (s), 153.0 (s), 148.6 (s), 146.3 (s), 144.2 (s), 134.6 (d), 132.9 (s), 129.7 (s), 129.0 (s), 126.2 (d), 124.0 (d), 122.7 (d), 122.1 (d), 111.7 (d), 110.9 (d), 110.2 (d), 86.6 (d), 65.0 (d), 59.8 (q), 55.8 (q), 55.5 (q), 50.8 (t), 50.4 (t), 47.3 (s), 37.2 (t), 31.9 (t), 31.0 (t), 26.1 (t), 24.7 (t), 23.8 (t), 15.2 (t)

915

15. Feber 2001

Sanochemia Pharmazeutika  
Aktiengesellschaft

vertreten durch:

PATENTANWÄLTE  
DIPL.-ING. M. J. K. A. D. B. E. T. T.  
DIPL.-ING. RICHARD H. E. T. T. A. N. G. E. R.  
DIPL.-ING. R. E. I. N. H. A. R. D. H. E. I. D. E. N. B. E. R. G. E. R.  
durch:

A 238/2001


BEER & FÄHNLE  
PATENTANWÄLTE  
1010 WIEN, AUSTRIA

15. Februar 2001

W5-127000A-pAT  
Sanochemia Pharmazeutika  
Aktiengesellschaft  
in Wien, AT  
B/A

## Patentansprüche:

## 1. Neue Verbindungen der allgemeinen Formel I



(I)

worin die Substituenten die nachstehend erläuterten Bedeutungen haben:

$R_1$  und  $R_2$  sind gleich oder verschieden und bedeuten:

a) Wasserstoff, F, Cl, Br, J, CN, NC, OH, SH,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_3\text{H}$ ,  $\text{PO}_3\text{H}$ ,  $\text{NH}_2$ ,  $\text{CF}_3$ ,  $\text{OSO}_2(\text{CH}_2)_n\text{CF}_3$ ,

worin n gleich 0, 1 oder 2 ist, - $\text{OSO}_2$ -Aryl-, -Vinyl- oder -Ethynyl;

b) eine niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ ), gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl-,

(Ar)Alkoxy-, Cycloalkyl- oder Cycloalkoxygruppe,

c) eine Aminogruppe, die gegebenenfalls durch eine oder zwei gleiche oder verschiedene niedrige ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ ), gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl- oder (Ar)Alkylcarbonyl- oder (Ar)Alkoxy-carbonylgruppen oder durch eine Gruppe ausgewählt aus einem gegebenenfalls substituierten Pyrrolidin-, Piperidin-, Morpholin-, Thiomorpholin-, Piperazin- oder Homopiperazinrest substituiert ist;

d) eine - $\text{COOH}$ -, - $\text{COO}(\text{Ar})\text{Alkyl}$ -, - $\text{CO-Amino}$ -Gruppe, die gegebenenfalls wie oben unter c) angegeben, substituiert ist, oder eine  $\text{COH}(\text{Ar})\text{Alkyl}$ gruppe;

e) eine  $-(\text{CH}_2)_n\text{X}$  (worin X = Br, Cl, F oder J ist),  $-(\text{CH}_2)_n\text{OH}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{CHO}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{CN}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{NC}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{COAlkyl}$ - oder  $-(\text{CH}_2)_n\text{COAryl}$ -Gruppe, worin n 1-4 ist;

f) eine  $-(\text{CH}_2)_n\text{Vinyl}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{Ethynyl}$ -,  $-(\text{CH}_2)_n\text{Cycloalkyl}$ -Gruppe, worin n 0, 1 oder 2 ist, wobei Cycloalkyl ein aliphatischer Ring mit 3 bis 7 C-Atomen ist;

g) eine  $\text{C}_3\text{-C}_6$  substituierte Alkenylgruppe (gegebenenfalls substituiert mit H, F, Br, Cl, CN,  $\text{CO}_2\text{Alkyl}$ ,  $\text{COAlkyl}$ ,  $\text{COAryl}$ );

h) eine  $\text{C}_3\text{-C}_6$  substituierte Alkynylgruppe (gegebenenfalls substituiert mit H, F, Br, Cl, CN,  $\text{CO}_2\text{Alkyl}$ ,  $\text{COAlkyl}$ ,  $\text{COAryl}$ ); oder

i)  $R_1$  und  $R_2$  bedeuten gemeinsam  $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-$ ,  $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{O}-$  (n = 1 bis 3),  $-\text{CH}=\text{CHA}_1-$  ( $A_1$  ist NH, O oder S), oder  $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{A}_1-$  ( $A_1$  ist NH, O oder S);

$R_3$  dieselbe Bedeutung hat wie  $R_1$ , insbesondere OH und  $\text{OCH}_3$  ist, oder

$R_2$  und  $R_3$  gemeinsam  $-\text{A}_2(\text{CH}_2)_n\text{A}_2-$  bedeuten, worin n 1 bis 3 ist und die Substituenten  $A_2$  gleich oder verschieden sind und NH, O oder S bedeuten;

$R_4$  und  $R_5$  sind entweder

a) beide Wasserstoff,


oder

b) einer von  $R_4$  und  $R_5$  ist Wasserstoff, eine (Ar)Alkyl-, (Ar)Alkenyl- oder (Ar)Alkynyl-Gruppe und der andere von  $R_4$  und  $R_5$  ist


i)  $OR_6$ , worin  $R_6$  Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1$ - $C_{10}$ , gegebenenfalls verzweigte oder substituierte) Alkylgruppe, oder Cycloalkylgruppe, eine  $C_3$ - $C_{10}$  substituierte Silylgruppe (beispielsweise Triethylsilyl, Trimethylsilyl, t-Butyldimethylsilyl oder Dimethylphenylsilyl), eine  $C_2$ - $C_{10}$ -alpha-Alkoxyalkyl-Gruppe, beispielsweise Tetrahydropyranyl, Tetrahydrofuranyl, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, 2-Methoxypropyl, Ethoxyethyl, Phenoxyethyl oder 1-Phenoxyethyl;

ii)  $O-CS-NHR_6$  (Thiourethane), worin  $R_6$  die oben unter i) angegebene Bedeutungen hat;

iii)  $O-CO-NHR_7$  mit der nachstehenden Bedeutung:



iv)  $O-CO-HR_6$ , worin  $R_6$  die oben unter i) genannte Bedeutungen hat, insbesondere Ester mit den Substitutionsmuster von Aminosäuren (beide Enantiomeren), wie



v)  $NR_7R_7$ , worin die beiden Substituenten  $R_7$  gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1$ - $C_4$ ), gegebenenfalls verzweigte, Alkylgruppe oder Cycloalkylgruppe bedeuten, oder die Substituenten  $R_7$  sind gemeinsam  $-(CH_2)_n-$ , worin  $n$  3 bis 5 ist;

vi)  $NH-COR_6$  (Amid), worin  $R_6$  die oben unter i) genannte Bedeutungen hat;

vii)  $S-R_6$ , worin  $R_6$  die oben unter i) angegebene Bedeutung hat;

viii)  $SO_nR_6$ , worin  $n$  0, 1 oder 2 ist und worin  $R_6$  eine ( $C_1$ - $C_{10}$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkylgruppe ist;

$G_1$ :  $-(CH_2)_x-$ , worin  $x$  1 oder 2 ist;

$G_2$ :  $-(CH_2)_y-$ , worin  $y$  0 bis 2 ist;

$G_3$ :  $-(CH_2)_z-$ , worin  $z$  0 bis 3 ist, mit der Maßgabe, daß die Summe aus  $x+y+z$  wenigstens 2 und höchstens 4 ist, oder worin  $G_3$  Carbonyl oder Thiocarbonyl,  $-CH(OH)-$  oder  $-C(OH)=$  ist;


W ist:

a)  $CR_{13}R_{14}$ , worin  $R_{13}$  Wasserstoff und  $R_{14}$   $-(CH_2)_nNR_7R_7$ ,  $-CO-NR_7R_7$  oder  $-COOR_7$  bedeuten, worin  $n$  0 bis 2 ist und  $R_7$  die oben genannten Bedeutungen hat, oder  $R_7$  und  $R_7$  bilden über  $-(CH_2)_n-$ , worin  $n$  3 bis 5 ist, einen Ring, wobei die Substituenten  $R_{13}$  und  $R_{14}$  vertauscht sein können.




b) N-Phenyl (gegebenenfalls substituiert mit Fluor, Brom, Chlor, ( $C_1$ - $C_4$ )Alkyl,  $CO_2$ Alkyl, CN,  $CONH_2$ , oder Alkoxy), N-Thien- 2- oder 3-yl, oder N-Fur- 2- oder 3-yl, oder N-1,3,5-Triazinyl bedeutet, wobei der Triazinrest weiter mit Cl,  $OR_6$  oder  $NR_7R_7$  substituiert sein kann, und  $R_6$  bzw.  $R_7$  die oben angeführte

Bedeutung haben;

c) einer der nachstehend wiedergegebenen Substituenten



worin J keine Bindung oder  $-(\text{CH}_2)_n-$ , wobei  $n = 0$  bis 3 ist, Carbonyl, Thiocarbonyl, O, S -SO oder  $\text{SO}_2$  bedeutet,  $R_6$  die oben angegebenen Bedeutungen hat, und worin Q  $-(\text{CH}_2)_n - \text{M}^* - (\text{CH}_2)_m -$  ist, wobei  $n = 0$  bis 4 und  $m = 0$  bis 4 und  $\text{M}^*$  Alkynyl, Alkenyl, disubstituiertes Phenyl, disubstituiertes Thiophen, disubstituiertes Furan, disubstituiertes Pyrazin, disubstituiertes Pyridazin, einen Spacer einer der nachstehend wiedergegebenen Formeln, einen Peptidspacer L oder einen heterocyclischen Spacer HS der nachstehenden Formeln bedeutet,




$P = \text{CH oder N}$   
 $T = \text{CH oder N}$   
 $X = \text{NR}_6, \text{O oder S}$   
 $Z = \text{CH oder N}$

worin  $R_{15}$  die Seitenkette von D-, L-, D,L-Aminosäuren oder unnatürlichen Aminosäuren bedeutet, und für den Fall von  $n > 1$   $R_{15}$  in den einzelnen Resten jeweils eine gleiche oder verschiedene Seitenkette von D-, L-, D,L-Aminosäuren oder unnatürlichen Aminosäuren bedeutet, mit der Maßgabe, daß das Atom N neben Q jeweils mit der Gruppe  $G_2$  und  $G_3$  der Formel I verbunden ist;

d) ein, gegebenenfalls wenigstens einfach substituierter, tricyclischer Substituent (Tr) mit wenigstens einem heterocyclischen Ring als Ringbestandteil und einer Bindungsstelle an einem Kohlenstoffatom eines anellierten Benzolringes desselben, der über einen Spacer Q und das Q benachbarte Stickstoffatom jeweils mit  $G_2$  und  $G_3$  der Verbindung der Formel I verbunden ist, wobei Q die oben unter c) angegebene Bedeutung hat; oder


e)  $-NH-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO-$  oder  $-SO_2-$ .

2. Neue Verbindungen der allgemeinen Formel II




worin D N-H, N-Alkyl, N-Acyl, Sauerstoff oder Schwefel bedeutet und worin die Substituenten  $R_1$  bis  $R_5$ ,  $G_1$  bis  $G_3$  sowie W die in Patentanspruch 1 bei der allgemeinen Formel I angegebenen Bedeutungen haben.

3. Neue Verbindung der allgemeinen Formel III



worin  $X-R_{16}$  ein Substituent ist, in dem X Sauerstoff oder Schwefel und  $R_{16}$  Wasserstoff oder eine niedrige ( $C_1-C_{10}$ ), gegebenenfalls verzweigte, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl-Gruppe ist, und worin die Substituenten  $R_1$  bis  $R_5$ ,  $G_1$  bis  $G_3$  sowie W die in Patentanspruch 1 bei der allgemeinen Formel I angegebenen Bedeutungen haben.

4. Neue Verbindung der allgemeinen Formel IV



worin  $R_{18}$  und  $R_{19}$  Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder Aralkyl bedeuten und in der die die Substituenten  $R_{18}$  und  $R_{19}$  tragenden C-Atome miteinander über eine Einfach- oder eine Doppelbindung verknüpft sind, und worin die Substituenten  $R_1$  bis  $R_5$  und  $G_1$  bis  $G_3$  die in Patentanspruch 1 bei der allgemeinen Formel I angegebenen Bedeutungen haben, wobei W CH oder N bedeutet.

5. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin der Substituent  $R_6$  ein Triethylsilyl, Trimethylsilyl, t-Butyldimethylsilyl oder Dimethylphenylsilyl bedeutet.

6. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin der Substituent  $R_6$  Tetrahydropyranyl, Tetrahydrofuranyl, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, (2-Methoxypropyl), Ethoxyethyl, Phenoxyethyl oder (1-Phenoxyethyl) bedeutet.



7. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin  $R_4$  Wasserstoff ist und  $R_5$  OH, CN,  $CO_2$ -Alkyl,  $CONR_aR_b$ , worin  $R_a$  Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1 - C_6$ ), gegebenenfalls verzweigte, cyclische substituierte Alkylgruppe und  $R_b$  Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1 - C_6$ ), gegebenenfalls verzweigte, oder substituierte Alkylgruppe ist, oder  $R_a+R_b$  sind gemeinsam  $-(CH_2)_n-$ , worin n 2 bis 6 bedeutet, oder  $-(CH_2)_nE(CH_2)_n-$ , worin E gleich NH, N-Alkyl, O, oder S und n 0 bis 5 ist, Aryl (Phenyl oder Naphthyl), oder ein 6- $\pi$  Heterozyklus ist.

8. Verbindung nach Anspruch 7, worin der 6- $\pi$  Heterozyklus Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Triazolyl, Tetrazolyl, Oxadiazolyl, Thiadiazolyl, Pyridazinyl, Pyrimidinyl, Pyrazinyl und substituierte Varianten derselben, Imidazolinyll, Thiazolinyll oder Oxazolinyll ist.

9. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, worin  $R_5$  eine andere Bedeutung als Wasserstoff hat und  $R_4$  OH ist.

10. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, worin  $R_4$  und  $R_5$  gemeinsam Carbonyl ( $=O$ ), Hydrazone ( $=N-NH-R_9$ ,  $=N-NR_9R_{10}$ ) oder Oxim ( $=N-OR_{10}$ ) sind, worin  $R_9$  Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1 - C_6$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl- oder (Ar)Alkylcarbonyl- (Ar)Alkylcarbonyloxygruppe oder eine Sulfonsäuregruppe, wie Tosyl oder Mesyl ist, und  $R_{10}$  Wasserstoff, eine niedrige ( $C_1 - C_6$ ), gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl- oder (Ar)Alkylcarbonylgruppe, eine Sulfonsäuregruppe, wie eine Tosyl- oder Mesylgruppe ist.

11. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin  $R_4$  und  $R_5$  gemeinsam Substituenten der Art




sind, worin  $Y_1$ ,  $Y_2$  gleich oder verschieden sind und O, S, NH oder  $N-R_9$  (freie Valenzen sind in jedem Fall Wasserstoff), worin  $R_9$  die in Anspruch 10 genannten Bedeutungen hat.

12. Verbindung nach Anspruch 11, worin  $Y_1$  NH und  $Y_2$   $N-R_9$  ist und worin  $R_4$  und  $R_5$  durch  $-(CH_2)_n-$  ( $n = 2, 3$  oder  $4$ ) verbunden sind.


13. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, worin  $G_1$  und  $G_2$  gemeinsam oder getrennt bedeuten:

$-C(R_{11}R_{12})-$ , worin  $R_{11}$  und  $R_{12}$  Wasserstoff, OH, eine niedrige, gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl-, Aryl-, (Ar)Alkyloxy- oder Aryloxygruppe oder gemeinsam eine Alkylspirogruppe ( $C_3 - C_7$ -Spiroring).

14. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, worin  $G_1$  und  $G_2$  gemeinsam bedeuten









worin m 1 bis 7 ist.


15. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, worin der tricyclische Substituent Tr ein kondensierter Benzolring der allgemeinen Formel




oder



oder



oder



ist.

16. Verbindung nach Anspruch 15, worin der Ring A ein substituierter Benzolring ist.

17. Verbindung nach Anspruch 15 oder 16, worin einer der Ringe B und C ein gegebenenfalls substituierter heterocyclischer Ring ist und der andere ein substituierter Ring ist, der ein oder mehrere Heteroatome im Ring enthalten kann.

18. Verbindung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, worin der Benzolring wenigstens einfach substituiert, wobei diese Substituenten Halogene, wie Fluor und Chlor, Halogeno-C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkylgruppen, wie Trifluormethyl, C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkylgruppen, wie Methyl, C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-Alkoxygruppen, wie Methoxy, und die Hydroxygruppe, insbesondere ein Halogen, wie Fluor sind.

19. Verbindung nach einem der Ansprüche 15 bis 18, worin der gegebenenfalls substituierte heterocyclische Ring B oder C ein 4 bis 14-gliedriger Ring, vorzugsweise ein 5 bis 7-gliedriger Ring, insbesondere ein 5- bis 7-gliedriger, nichtaromatischer Ring, der ein oder zwei gleiche oder verschiedene Heteroatome enthält, ist.


20. Verbindung nach Anspruch 19, worin wenigstens ein Heteroatom des heterocyclischen Ringes (1 bis 3 Heteroatome sind möglich) Stickstoff, Sauerstoff, oder Schwefel sind.

21. Verbindung nach Anspruch 20, worin der heterocyclische Ring B oder C Pyridin, Pyrazin, Pyrimidin, Imidazol, Furan, Thiophen, Pyrrolidin, Piperidin, Hexamethylenimin, Tetrahydrofuran, Piperazin, Morphin oder Thiomorphen ist.


22. Verbindung nach einem der Ansprüche 15 bis 21, worin der 5 bis 8-gliedrige Ring B oder C ein 5 bis 8-gliedriger heterocyclischer oder alicyclischer Ring, oder ein Kohlenstoffring, der wenigstens einfach substituiert ist, ist.

23. Verbindung nach Anspruch 22, worin der 5 bis 8-gliedrige Kohlenstoff-Ring ein Benzolring oder ein gesättigter oder ungesättigter Ring, beispielsweise Benzol, Cyclopentan, Cyclopenten, Cyclohexan, Cyclohexen, Cyclohexadien, Cycloheptan, Cyclohepten und Cycloheptadien ist.

24. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, worin der trizyklische Substituent Tr eine Gruppe einer der nachstehend wiedergegebenen Formeln ist




25. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, worin der trizyklische Substituent Tr eine Gruppe einer der nachstehend wiedergegebenen Formeln ist



26. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, worin Tr ein cyclischer oder bicyclischer Kohlenwasserstoff ist.

27. Verbindung nach Anspruch 26, worin Tr eine der nachstehenden Formeln hat:



28. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 27, worin der Substituent Tr wenigstens einfach mit  $R_1$  substituiert ist und  $R_1$  die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen hat.

29. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 28, worin der Substituent W Stickstoff ist und/oder der Substituent  $G_1$   $-(CH_2)_x-$ , worin x gleich 1 oder 2 ist und  $G_2$   $-(CH_2)_y-$ , worin y gleich 0 bis 2 ist, mit der Maßgabe, daß  $x + y$  gemeinsam wenigstens 2 und höchstens 4 bedeuten.

30. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 29, worin die Substituenten  $G_1$  und  $G_2$  gemeinsam oder getrennt voneinander die Bedeutung  $-CR_{11}R_{12}-$  haben, worin  $R_{11}$  und  $R_{12}$  Wasserstoff, Hydroxy, eine niedrige, gegebenenfalls verzweigte oder cyclische, gegebenenfalls substituierte (Ar)Alkyl-, Aryl-, (Ar)Alkoxy-, oder Aryloxygruppe bedeuten.

31. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 30, worin  $G_1$  und  $G_2$  sind gemeinsam Alkylspirogruppe ( $C_3$ - $C_7$ -Spiroring) sind.

32. Verfahren zum Herstellen von Verbindungen der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß die kombinatorische oder Parallel-Synthesetechnologie angewendet wird, wobei das Grundmolekül durch eine funktionelle Gruppe (Linker) auf einer festen Phase immobilisiert, die Synthese der Zielverbindung ausgeführt und dann diese Zielverbindung von der festen Phase abgetrennt wird.

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daß das Grundmolekül an der festen Phase über ein Kohlenstoffzentrum, ein Stickstoffzentrum oder ein Sauerstoffzentrum immobilisiert wird.

34. Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, daß als funktionelle Gruppe (Linker)  $=X(CH_2)_nCO$  ( $X = CH_2, CO, O, S, NH$ ),  $-X(CH_2)_nOCO$  ( $X = CH_2, CO, O, S, NH$ ),  $-XC_6H_4CH_2-$  ( $= CH_2, CO, O, S, NH$ ), THP,  $-X(CH_2)_nSi(alkyl)_2-$  verwendet wird.

35. Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, daß als funktionelle Gruppe (Linker)  $=X(CH_2)_nCO$  ( $X = CH_2, O, NH, So_{0-2}$ ),  $-X(CH_2)_nCS$  ( $X = CH_2, O, NH, So_{0-2}$ ),  $X(CH_2)_nJCO$  ( $X = CH_2, O, NH, So_{0-2}$ ;  $J = NH, O, S$ ),  $XC_6H_4CH_2(X = CH_2, O, S)$  verwendet wird.

36. Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, daß als funktionelle Gruppe (Linker)  $=X(CH_2)_nSi(alkyl)_2-$ ,  $-C_6H_4Si(alkyl)_2-$ ,  $-(CH_2)_nSn(alkyl)_2-$ ,  $-C_6H_4Sn(alkyl)_2-$ ,  $-(CH_2)_nS-$ ,  $-C_6H_4S-$  verwendet wird.

37. Arzneimittel enthaltend wenigstens eine der Verbindungen der allgemeinen Formeln I, II, III oder IV, oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz derselben als Wirkstoff.

38. Verwendung wenigstens einer der Verbindungen der allgemeinen Formeln I, II, III oder IV, oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz derselben zum Herstellen von Arzneimitteln.

39. Verfahren zum Herstellen von Arzneimitteln, bei dem wenigstens eine der Verbindungen

- 9 -

der allgemeinen Formeln I, II, III oder IV mit einem pharmazeutisch annehmbaren Träger und/oder Formulierungshilfsmittel gemischt wird.

Sanochemia Pharmazeutika Aktiengesellschaft  
vertreten durch:

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**